


221



221F

F

نام:

نام خانوادگی:

محل امضا:

صبح جمعه
۱۳۹۵/۱۲/۶
دفترچه شماره (۱)



«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.
آقام خدمتی (ره)»

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی
دوره دکتری (نیمه‌تمترکز) داخل – سال ۱۳۹۶

رشته امتحانی ایمنی‌شناسی (کد ۲۷۱۸)

مدت پاسخگویی: ۱۲۰ دقیقه

تعداد سوال: ۹۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی (ایمنی‌شناسی و سرم‌شناسی – باکتری‌شناسی اختصاصی و بیماری‌ها – ویروس‌شناسی و بیماری‌ها – قارچ‌شناسی و بیماری‌ها)	۹۰	۹۰	۱

این آزمون نمره منفی دارد.
استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

اسفندماه – سال ۱۳۹۵

حق چاپ، تکثیر و انتشار سؤالات به هر روش (الکترونیکی و ...) پس از برگزاری آزمون، برای تعابی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار می‌شود.

ایمنی‌شناسی و سرم‌شناسی:

- ۱ کدام ویژگی یک پپتید بیشترین اثر را بر تمایل (Affinity) پادتن دارد؟
- (۱) آب‌دوستی (۲) آب‌گریزی (۳) شارژ منفی
- ۲ با استفاده از کدام روش می‌توان آنتی‌زن محلول را شناسایی کرد؟
- (۱) آگلوتیناسیون فعال (۲) آگلوتیناسیون غیرفعال (۳) هماگلوتیناسیون (۴) آزمایش رزینگال
- ۳ در یاخته فیبروبلاست، β -IL یک سیتوکاین وابسته به سلول محسوب می‌شود. این سیتوکاین از چه طریقی یاخته T را تحریک می‌کند؟
- (۱) Paracrine (۴) Juxtacrine (۳) Endocrine (۲) Autocrine (۱)
- ۴ وجود IgG بر ضد ویروس در سوم جنین گاو (Fetal calf serum) نشانه چیست؟
- (۱) انتقال پادتن از مادر به جنین در سه ماهه اول بارداری (۲) انتقال پادتن از مادر به جنین در سه ماهه آخر بارداری
- (۳) آسودگی جنین به ویروس در سه ماهه اول بارداری (۴) آسودگی جنین به ویروس در سه ماهه آخر بارداری
- ۵ پروتئین مقاومت ذاتی ماکروفاز (Nramp) در گاو چه اهمیتی دارد؟
- (۱) از رشد بروسل آبورتس در بدن جلوگیری می‌کند. (۲) از آپویتوز ماکروفاز جلوگیری می‌کند.
- (۳) باعث مقاومت نسبت به سالمونلا می‌شود. (۴) عرضه پادگن را تسهیل می‌کند.
- ۶ کدام پذیرنده‌ها سیتوپلاسمی هستند؟
- (۱) TLR 1 و TLR 2 (۴) TLR 6 و 5 (۳) TLR 4 و 5 (۲) TLR 1 و TLR 7 (۴) TLR 9 و TLR 7
- ۷ اساس آزمون تعیین عیار ویروس نیوکاسل کدام است؟
- (۱) آگلوتیناسیون ایمن (۲) هماگلوتیناسیون ایمن
- ۸ مهم‌ترین میانجی آنافیلاکسی در نشخوارکنندگان کدام است؟
- (۱) برادی کینین (۲) پروستاگلاندین (۳) سرینوین (۴) هیستامین
- ۹ نوع واکنش احتمالی در بیماری نفخ مقطع اسپ کدام است؟
- (۱) آرتوس (۲) آنافیلاکسی (۳) سیتو توکسیک
- ۱۰ ای توب یاخته T بر روی کدام بخش از لیپوپلی‌ساکارید قرار دارد؟
- (۱) پروتئین (۲) پلی‌ساکارید (۳) زنجیر جانبی پلی‌ساکارید (۴) لیپید A
- ۱۱ یاخته شجری و ماکروفاز چه تفاوتی دارند؟
- (۱) یاخته T بکر تنها توسط یاخته ماکروفاز حساس می‌شود. (۲) یاخته T بکر تنها توسط یاخته شجری حساس می‌شود.
- (۳) فقط ماکروفازها MHC کلاس دو را بیان می‌کنند. (۴) فقط یاخته‌های شجری MHC کلاس دو را بیان می‌کنند.
- ۱۲ کدام میکروارگانیسم گزینه مناسب‌تری جهت تولید واکسن‌های نوترکیب زنده (Live recombinant) است؟
- (۱) باکتری اشربیشاکلی (Escherichia coli) (۲) باکتری سالمونلا انتریتیدیس (Salmonella Enteritidis)
- (۳) ویروس واکسینیا (Vaccinia) (۴) مخمیر پیچیا پاستوریس (Pichia pastoris)

- ۱۳ در همه موارد زیر، تعداد لمفوسيت‌هاي T، کاهش جدي دارند، به‌جز:
- (۱) بروتون (۲) سندرم دي حرج (۳) موش‌هاي برنه
- ۱۴ کدام پذيرنده قابلیت اتصال به ليپوپلیساکارید را دارد؟
- TLR9 (۴) TLR7 (۳) TLR4 (۲) TLR2 (۱)
- ۱۵ کدام ياخته در دفاع عليه انگل‌هاي کرمي غالب است؟
- Th1 (۴) Th2 (۳) TC (۲) NK (۱)
- ۱۶ همه سيتوكاين‌هاي زير به وسيلة T کمکي که فعال شده ترشح می‌شوند، به‌جز:
- IFN γ (۴) IL4 (۳) IL2 (۲) IL1 (۱)
- ۱۷ کدام مورد نشان دهنده تشابه BCR با TCR است؟
- (۱) وجود فرم ترشحی (۲) بازارايي زن در نواحي متغير زنجيره (۳) بروز موتاسيون سوماتيك
- ۱۸ همه دوسين‌هاي زير در ساختمان مولکول MHC در جايگاه اتصال به پيتيid نقش دارند، به‌جز:
- (۱) MHCII α_1 در β_2 (۴) MHCII β_1 در α_2 (۳) MHCI α_1 در α_2 (۲) MHCI β_1
- ۱۹ موتاسيون در مولکول CD40L منجر به اختلال همه موارد می‌شود، به‌جز:
- (۱) ايزوتايب سوئيجينگ (۲) بلوغ ميل پيوندي (۳) بازارايي در زن‌هاي ايمونوگلوبولين (۴) توليد سلول‌هاي خاطره
- ۲۰ کدام آنزيم در نوتروفيل‌ها نیست، ولی در ماکروفازها وجود دارد؟
- (۱) لیزوژوم (۲) آلكالین فسفاتاز (۳) میلو پراکسیداز
- ۲۱ پروتئين‌هاي فاز حاد توسط کدام اندام بدن و تحت انگيزه چه ماده‌اي آزاد می‌شوند؟
- (۱) کبد - اينترلوكين ۱ (۲) مغز استخوان - اينترلوكين ۱ (۳) مغز استخوان - اينترلوكين ۲
- ۲۲ کدام مارکر در سطح لمفوسيت B یافت می‌شود؟
- CD154 (۴) CD28 (۳) CD21 (۲) CD3 (۱)
- ۲۳ رشد کدام بافت لمفاوي در نشخوار‌کنندگان به تحریک پادگني و ایسته است؟
- (۱) تیموس (۲) بورس فابریسیوس (۳) پلاک‌هاي پي بر (۴) مغز استخوان
- ۲۴ کدام مورد روزنه حساسیت يا شکاف ایمنی است؟
- (۱) فاصله بین ایمن‌سازی و دست‌یابی به توان پاسخ محافظت کننده (۲) زمانی کوتاه پس از بهبودی از بیماری که پادتن خشی‌کننده کاهش می‌یابد. (۳) زمانی که ایمنی مادر برای محافظت کافی نیست ولی به قدری است که اثر واکسن را مهار می‌کند. (۴) یک ماه پیش از زایش و دو هفته پس از زایش که نقصان موقت ایمنی در مادر رخ می‌دهد.
- ۲۵ کدام نوع جفت (پلاستنا) اجازه انتقال IgG از مادر به جنین را می‌دهد؟
- (۱) هموکوریال (۲) آندوتیلیوکوریال (۳) اپیتلیوکوریال (۴) سیندسموکوریال
- ۲۶ کدام ماده باعث القای آپوپتوز در یاخته هدف می‌شود؟
- (۱) پرفورین (۲) دیفنسین (۳) گرانزیم (۴) لیزوژیم
- ۲۷ پدیده Somatic mutation برای کدام پذيرنده مطرح است؟
- MHC (۴) TLR (۳) TCR (۲) BCR (۱)

- ۲۸- در دفاع مخاطی، کدام گروه از یاخته‌های T نقش مهمی دارند؟
- Th17 (۴) Th2 (۳) Th1 (۲) Tc (۱)
- ۲۹- در ساختار TCR، زنجیرهای بتا در چه بخشی با زنجیر آلفا تفاوت دارند؟
- V (۴) J (۳) D (۲) C (۱)
- ۳۰- نقش پادتن در اینمی گوساله‌ها به بیماری کلی باسیلوز کدام است؟
- (۱) آگلوتیناسیون و نوترالیزاسیون
 (۲) اپسونیزاسیون و ترشح دیفسنین
 (۳) اپسونیزاسیون و تسهیل بیگانه‌خواری
 (۴) تسهیل بیگانه‌خواری و واکنش Tc
- ۳۱- نیمه عمر IgY در سرم پرندگان چند روز است؟
- (۱) ۱ تا ۳ (۴) ۲ تا ۶ (۳) ۱۴ (۲) ۶ تا ۲۴ (۴) ۲۱ تا ۲۳
- ۳۲- مقاومت به لکوز گاوی با آل BoLA-DRB3.2*11 DRB3.2*11 مرتبط است. به چه معناست؟
- (۱) آل شماره 3.2 از MHC کلاس یک
 (۲) آل شماره 3.2 از MHC کلاس دو
 (۳) آل شماره 11 از MHC کلاس یک
 (۴) آل شماره 11 از MHC کلاس دو
- ۳۳- مولکول‌های MHC کلاس دو، در کجا تولید و در کجا با پیتید پادگنی متصل می‌شوند؟
- (۱) در اندوژم تولید و در همانجا به پیتید متصل می‌شوند.
 (۲) در سیتوزول تولید و در همانجا به پیتید متصل می‌شوند.
 (۳) در سیتوزول تولید و در اندوژم به پیتید متصل می‌شوند.
 (۴) در اندوژم تولید و در سیتوزول به پیتید متصل می‌شوند.
- ۳۴- مهم‌ترین سایتوکاین برای تحریک تکثیر امنوسیت T کدام است؟
- IL-7 (۴) IL-4 (۳) IL-3 (۲) IL-2 (۱)
- ۳۵- کدام سایتوکاین باعث مهار تعویض کلاس IgE در لمفوسیت‌های B می‌شود؟
- IFN-γ (۴) IL-5 (۳) IL-4 (۲) IL-2 (۱)
- ۳۶- کدام مولکول هم در مسیر اصلی کمپلمان و هم در مسیر لکتین نقش دارد؟
- C3bBb3b (۴) C3bBb (۳) C4b2b (۲) Factor H (۱)
- ۳۷- کدام مورد تفاوت T-cell و NK cell را به درستی بیان می‌کند؟
- (۱) T cell ها برای فعال شدن نیاز به دوره آموزش تیموسی دارند ولی NK cell ها چنین دوره‌ای را نیاز ندارند.
 (۲) NK cell ها مانند T cell ها برای فعال شدن به مولکول‌های MHC نیاز دارند.
 (۳) NK cell ها از اجزاء اینمی ذاتی بوده و از common myeloid stem cell ها منشاء می‌گیرند.
 (۴) CD3 از مارکرهای اصلی در سطح هر دو سلول است.
- ۳۸- کدام جمله در مورد عامل مکمل خون پستانداران صحیح است؟
- (۱) افزایش Factor H در خون باعث افزایش فعالیت C3-convertase می‌شود.
 (۲) کاهش غلظت C1Inh در خون باعث کاهش میزان C2 و C4 می‌شود.
 (۳) کاهش غلظت C1Inh در خون باعث افزایش میزان C9 می‌شود.
 (۴) کاهش غلظت properdin در خون باعث تشید تجزیه C3 می‌شود.
- ۳۹- کدام مکانیسم جزء فرایندهای تحمل مرکزی (Central tolerance) در لمفوسیت‌های B محسوب می‌شود؟
- (۱) اشغال گیرندهای کلون سلولی (Blockage of BCR)
 (۲) خستگی کلون سلولی (Clonal exhaustion)
 (۳) عدم پاسخ‌دهی کلون سلولی (Clonal anergy)
 (۴) مرگ کلون سلولی (Clonal abortion)

- ۴۰- همه سایتوکاین‌های زیر در تمایز لمفوسيت‌های Th17 به **Th17** نقش عمده‌ای دارند، به جز:
- | | | | |
|-------------|-------------|-------------|------------|
| IL - 27 (۴) | IL - 23 (۳) | IL - 21 (۲) | IL - 6 (۱) |
|-------------|-------------|-------------|------------|
- ۴۱- کدام گیرنده شبه **Toll**، بر سطح غشای اندوزومی بارز می‌شود؟
- | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TLR - 6 (۴) | TLR - 5 (۳) | TLR - 4 (۲) | TLR - 3 (۱) |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
- ۴۲- همه عبارات در مورد مسیر **Fas** پاسخ اینمی سلولی صحیح‌اند، به جز:
- باعث القای آپاپتوزیس در سلول هدف می‌شود.
 - توسط سلول‌های **Tc** و **NK** اعمال می‌شود.
 - مهم‌ترین مسیر اینمی سلولی در دفاع در برابر ویروس‌ها است.
 - نقش اصلی را در کنترل سلول‌های **T** خود واکنش‌گر دارد.
- ۴۳- کدام روش برای تزریق واکسن **DNA** مناسب‌تر است؟
- | | | | |
|----------------|-----------------|------------|--------------|
| (۴) داخل وریدی | (۳) داخل عضلانی | (۲) خوراکی | (۱) بین جلدی |
|----------------|-----------------|------------|--------------|
- ۴۴- کدام نوع پادتن هوموسیتوتروپیک بوده و محدودیت گونه‌ای دارد؟
- | | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| IgM (۴) | IgG (۳) | IgE (۲) | IgA (۱) |
|---------|---------|---------|---------|
- ۴۵- کدام پادگن‌ها ممکن است باعث تولید خودپادتن شوند؟
- اتولوگوس و هومولوگوس
 - هتروفیل و هاپتن
 - اتولوگوس و هترولوجوس
- ۴۶- کدام بروتین فاز حاد به **C1q** متصل شده و عامل مکمل را از مسیر کلاسیک فعال می‌کند؟
- | | | | |
|---------|---------|---------|--------|
| CRP (۴) | LBP (۳) | SAA (۲) | HP (۱) |
|---------|---------|---------|--------|
- ۴۷- کدام یاخته به عنوان بخشی از دستگاه عصبی-ایمنی (**neuroimmune**) محسوب می‌شود؟
- انوزیوفیل
 - ماتست سل
 - ماکروفاز
 - نوتروفیل
- ۴۸- به چه دلیل لنفوسيت‌های **B** که آنتیژن خود را عرضه می‌کنند قادر به ورود به فولیکول نیستند؟
- | | | | |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| (۱) کاهش بیان CCR5 | (۲) کاهش بیان CCR7 | (۳) عدم بیان CCR5 | (۴) عدم بیان CCR7 |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
- ۴۹- کدام از چه مسیری برای انتقال پیام استفاده می‌کند؟
- | | | | |
|----------|---------|--------------|---------------|
| TRAF (۴) | TIR (۳) | JAK STAT (۲) | G Protein (۱) |
|----------|---------|--------------|---------------|
- ۵۰- در الیزای غیرمستقیم پادتن کونژوگه به چه چیز متصل می‌شود؟
- | | | |
|----------------------|----------------|---------------------|
| (۱) کف گوده‌های پلیت | (۲) پادگن آزاد | (۳) پادتن سرم مشکوک |
|----------------------|----------------|---------------------|
- ۵۱- در مورد **Atopic dermatitis** کدام عبارت صحیح است؟
- در سگ بیشتر دیده می‌شود و یک ازدیاد حساسیت تیپ یک است.
 - در گربه بیشتر دیده می‌شود و یک ازدیاد حساسیت تیپ چهار است.
 - در سگ بیشتر دیده می‌شود و یک ازدیاد حساسیت تیپ چهار است.
 - در گربه بیشتر دیده می‌شود و یک ازدیاد حساسیت تیپ یک است.
- ۵۲- کدام عامل جزء سدهای شیمیایی اینمی ذاتی دستگاه گوارش محسوب می‌گردد؟
- | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|----------------------|
| lysolipids (۴) | Fatty acids (۳) | Cryptidins (۲) | β defensin (۱) |
|----------------|-----------------|----------------|----------------------|
- ۵۳- سایتوکاین‌های لازم برای ادامه حیات لمفوسيت‌های **T** خاطره‌ای کدام‌اند؟
- | | |
|----------------------|----------------------|
| IL - 4 & IL - 33 (۲) | IL - 2 & IL - 12 (۱) |
|----------------------|----------------------|
- | | |
|----------------------|----------------------------|
| IL - 7 & IL - 15 (۴) | IFN γ & IL - 25 (۳) |
|----------------------|----------------------------|

- ۵۴- کدام فاکتور رونوشتبرداری باعث تمایز سلول‌های Th2 به زیر رده لمفوسيت‌های Th2 می‌شود؟
 GATA3&STAT6 (۲) GATA3&STAT - ۴ (۱)
 T – bet & STAT - ۶ (۴) T – bet & STAT - ۴ (۳)
- ۵۵- برای لانه‌گزینی لمفوسيت‌ها در پوست کدام مولکول‌ها با یکدیگر وارد واکنش می‌شوند؟
 SLE , E selectin (۲) SLE , P selectin (۱)
 VLA-1 , ICAM - ۱ (۴) ICAM-1 , LFA-1 (۳)
- ۵۶- سایتوکاین مؤثر بر بلوغ لمفوسيت‌های B و T که از معز استخوان و سلول‌های استرومال تیموس ترشح می‌شود، کدام است؟
 GM – CSF (۴) IL - 7 (۳) IL - 3 (۲) IL - 1 (۱)
- ۵۷- Ficolin چه مولکولی را شناسایی می‌کند؟
 (۴) مانان (۲) ان استیل گلوكوزآمین (۳) گالاكتوزآمین (۱) LPS
- ۵۸- کدام FCR به طور فعال در ADCC شرکت می‌کند؟
 FcγIIB (۴) FcγIIA (۳) FcαRII (۲) FCεRII (۱)
- ۵۹- شاخص لمفوسيت‌های B خاطره‌ای در انسان در مورد آنتی‌ژن‌های مستقل از T کدام است؟
 CD27 (۴) CD21 (۳) CD20 (۲) CD19 (۱)
- ۶۰- واکنش بین CXCL13 و CXCR5 در کمotaکسی کدام سلول نقش دارد؟
 (۴) نوتروفیل (۳) انوزینوفیل (۲) سلول T (۱) سلول B

باکتری‌شناسی اختصاصی و بیماری‌ها:

- ۶۱- در واکسن تزریقی سیاه‌زخم از کدام جزء باکتری استفاده می‌شود؟
 (۴) آنتی‌ژن LT (۲) آنتی‌ژن PA (۳) آنتی‌ژن EF (۱) آنتی‌ژن K
- ۶۲- کدام باکتری در دمای آزمایشگاه حرکت چتری دارد؟
 (۲) اریزی پلوتربیکس روزبیوپاتیه (۱) استافیلوکوکوس اورئوس
 (۳) باسیلوس آنتراسیس (۴) لستریا مونوسیتوئنز
- ۶۳- تخمیر شیر طوفانی از مشخصات کدام باکتری است؟
 (۱) کلستریدیوم تنانی (۲) کلستریدیوم شوئی (۳) کلستریدیوم نوئی (۴) سالمونلاها غالباً چگونه باکتری‌هایی هستند؟
- ۶۴- (۱) گرم منفی، لاکتوز مثبت، H₂S منفی، LD مثبت و PD منفی
 (۲) گرم منفی، لاکتوز منفی، H₂S مثبت، LD مثبت و PD منفی
 (۳) گرم مثبت، لاکتوز منفی، H₂S مثبت، LD منفی و PD مثبت
 (۴) گرم مثبت، MR منفی، VP مثبت، اوره منفی و لاکتوز مثبت
- ۶۵- همه گزینه‌های زیر در تشخیص آنتروتوکسمی کمک کننده‌اند، به جز:
 (۱) جداسازی عامل از روده باریک (۲) تشخیص گلوكز اوری
 (۳) تشخیص حضور توکسین در سرم (۴) تشخیص وجود تعداد زیاد کلستریدیوم پرفینجنس در محتویات روده باریک در گسترش مستقیم

- | |
|---|
| <p>۶۶- از زخم‌های ناشی از گاز‌گرفتگی سگ، جداسازی کدام استافیلوكوکوس محتمل‌تر است؟</p> <p>(۱) ارتوس (۲) آپیدرمیدیس (۳) اینترمیدیوس (۴) هایکوس</p> |
| <p>۶۷- همه بیماری‌های زیر در گوسفند با درگیری چشم همراه‌اند، به غیر از:</p> <p>(۱) آگالاکسی (۲) افتالالمیا مسری (۳) بروسلوز (۴) لیستریوز</p> |
| <p>۶۸- کدام واکسن در گوساله‌ها، عیار آگلوتینان بعد از بلوغ ایجاد نمی‌کند؟</p> <p>(۱) ReV₁ (۲) RB51 (۳) RdS19 (۴) S19</p> |
| <p>۶۹- اساس آزمایش توبرکولین کدام است؟</p> <p>(۱) اندازه‌گیری انترفررون گاما است. (۲) پاسخ ازدیاد حساسیت تأخیری است. (۳) پاسخ ازدیاد حساسیت فوری است.</p> |
| <p>۷۰- همه موارد زیر صحیح‌اند، به جز:</p> <p>(۱) گاو نسبت به بیماری مشمشه حساس می‌باشد. (۲) باکتری جنس بروسلا با باکتری بارتونلا قربات رئیتیکی دارد. (۳) نکروز اندام‌های تحتانی در بیماری سالمونلوز ممکن است در دام مشاهده گردد. (۴) عامل اصلی بیماری هپاتیت نکروتیک عفونی (Black Disease) کلستریدیوم نووای تیپ B است.</p> |

ویروس‌شناسی و بیماری‌ها:

- ۷۱ کدام یک از موارد زیر در مورد اعضای خانواده توگا ویربده صحیح است؟

 - (۱) فاقد پوشش هستند.
 - (۲) فاقد هماگلوتینین هستند.
 - (۳) گنجیدگی داخل سلولی تشکیل می‌دهند.
 - (۴) هماگلوتینین دارند و گنجیدگی داخل سلولی تشکیل نمی‌دهند.

- ۷۲ کدام عبارت در مورد لیگاند عامل سرماخوردگی صحیح است؟

 - (۱) فرو رفته است.
 - (۲) برجستگی میله مانند است.
 - (۳) برجستگی تاج مانند است.
 - (۴) برجستگی‌های میله مانند و تاج مانند است.

- ۷۳ کدام ویروس موجب ناقص‌الخلقه‌زایی در گوسفند می‌گردد؟

 - (۱) Blue tongue (۴)
 - (۲) MCF
 - (۳) IBR
 - (۴) orf

- ۷۴ عامل همه بیماری‌های زیر در جنس پاراپاکس ویروس قرار دارد، به جز:

 - (۱) ارف
 - (۲) لمبی اسکین
 - (۳) آبله گاوی کاذب
 - (۴) استوماتیت پاپولار گاو

- ۷۵ عتمده‌ترین علامت قابل مشاهده در دام مبتلا به تب کریمه - کنگو کدام است؟

 - (۱) به جز تب، فاقد علائم بالینی در دام است.
 - (۲) میوکاردیت
 - (۳) منزبرت
 - (۴) هپاتیت

- ۷۶ داروی آmantادین چگونه از تکثیر ویروس آنفلوانزا جلوگیری می‌کند؟

 - (۱) RNA
 - (۲) جلوگیری از عمل ترجمه
 - (۳) جلوگیری از برهمه‌شدن ویروس
 - (۴) جلوگیری از چسبیدن ویروس

- ۷۷ وجود آنزیم رونوشت برداری معکوس و ژنوم dsDNA ناقص از ویزگی‌های کدام ویروس است؟

 - (۱) ایدز
 - (۲) هماتیت B
 - (۳) های
 - (۴) تبدیل فکه

- ۷۸- واکسن‌های رایج تب برفکی در کشور از چه نوعی هستند؟
- (۱) زنده تخفیف حدت یافته مونووالان
 - (۲) زنده تخفیف حدت یافته پلیوالان
 - (۳) کشته پلیوالان
 - (۴) کشته مونووالان
- ۷۹- ویروس آبله از کدام غشاء سلولی جوانه می‌زند؟
- (۱) هسته
 - (۲) دستگاه گلزاری
 - (۳) غشای پلاسمایی
 - (۴) رتیکولوم آندوبلاسمیک
- ۸۰- در بیماری کم خونی عفونی اسب، گلبول‌های قرمز با چه مکانیسمی تغیرپ می‌شوند؟
- (۱) تقلید مولکولی
 - (۲) تکثیر مستقیم ویروس در RBC
 - (۳) ازدیاد حساسیت نوع دوم
 - (۴) ازدیاد حساسیت نوع سوم

قارچ‌شناسی و بیماری‌ها:

- ۸۱- برای تشخیص کربیتوکوکوس در بررسی مستقیم، کدام‌یک از موارد زیر کاربرد دارد؟
- (۱) پتانس
 - (۲) گرم
 - (۳) لاکتوفنل
 - (۴) مرکب چین
- ۸۲- همه ترکیبات زیر از اجزای اصلی دیواره سلولی قارچ‌ها می‌باشند، به جز:
- (۱) ارگوسترون
 - (۲) پتاگلوكان
 - (۳) کیتین
 - (۴) مانان
- ۸۳- محیط کورن میل آگار حاوی تئین NO_2 ، برای شناسایی کدام گونه کاندیدا توصیه می‌شود؟
- (۱) آلبیکنس
 - (۲) تروپیکالیس
 - (۳) کروزنس
 - (۴) گلابرانا
- ۸۴- بهترین تست سرولوزی جهت تشخیص اسپوروتربیکوزیس جلدی - لنفاوی کدام است؟
- (۱) ایمونوپراکسیداز
 - (۲) ایمونو‌فلورسانس غیرمستقیم
 - (۳) ثبوت عناصر مکمل
 - (۴) لاتکس آگلوتیناسیون
- ۸۵- آنزیم لاکاز توسط کدام قارچ ترشح می‌گردد؟
- (۱) رینوسپوریدیوم
 - (۲) کاندیدا
 - (۳) کربیتوکوکوس
 - (۴) لویوا
- ۸۶- واکنش کریون در کدام نوع از کچلی بیشتر مشاهده می‌شود؟
- (۱) دست
 - (۲) سر
 - (۳) کشاله ران
 - (۴) ناخن
- ۸۷- نیستاتین با کدام مکانیسم، خاصیت ضد قارچی را اعمال می‌کند؟
- (۱) ایجاد سوراخ در غشای سیتوپلاسمی
 - (۲) جلوگیری از سنتز ارگوسترون
 - (۳) جلوگیری از سنتز اسید نوکلئیک
 - (۴) مهار تشکیل دوک تقسیم
- ۸۸- کدام گزینه، از فاکتورهای حدت کربیتوکوکوس نتوفورمنس می‌باشد؟
- (۱) آنزیم همولیزین
 - (۲) کربیتوکسین
 - (۳) کپسول پلی پپتیدی
 - (۴) فنل اکسیداز
- ۸۹- کدام ایمونوگلوبولین جهت ایجاد وازنیت کاندیدایی عود کننده نقش دارد؟
- (۱) IgM
 - (۲) IgA
 - (۳) IgE
 - (۴) sIgA
- ۹۰- کدام‌یک از سایتوکاین‌های زیر در آسپرژیلوزیس آرژیک اهمیت بیشتری دارد؟
- (۱) IL-2
 - (۲) IL-10
 - (۳) IL-13
 - (۴) IL-17