



128F

F

نام :

نام خانوادگی :

محل امضاء :

صبح جمعه

۹۲/۱۲/۱۶

دفترچه شماره (۱)



اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.

امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی دورهای دکتری (نیمه متاخر) داخل سال ۱۳۹۳

مجموعه زمین‌شناسی
زیست‌محیطی (کد ۲۰۶)

مدت پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۱۰۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی (زمین‌شناسی ایران + سنگ‌شناسی - زمین‌شیمی زیست محیطی + زمین‌شناسی پزشکی)	۱۰۰	۱	۱۰۰

اسفندماه سال ۱۳۹۲

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی‌باشد.

- ۱ در پلاتفرم پالئوزوئیک ایران شواهد حداقل فاز کششی وجود دارد.
- (۱) یک (۲) دو (۳) سه (۴) چهار
- ۲ رخداد میلائین در البرز، در چه زمانی رخ داده است و در بین کدام سازندها و به چه صورت قابل اثبات است؟
- (۱) در کامبرین پیشین، بین زاگون و لالون، وجود کنگلومرای قاعده‌ای
 (۲) در کامبرین پیشین، بین باروت و زاگون، وجود ریپل مارک
 (۳) در کامبرین پسین، بین لالون و زاگون، وجود لاتریت
- ۳ (۴) در مرز کامبرین پیشین - میانی، بین لالون و میلا، وجود کوارتزیت قاعده‌ای در سازند میلا
 ماقماقایسم زون ارومیه - دختر در چه زمانی گستردگرتر بوده است و متعلق به کدام محیط تکتونیکی است؟
- (۱) سنتوزوئیک - حاشیه قاره (۲) سنتوزوئیک - جزیره قوسی (۳) کواترنری - حاشیه قاره (۴) کواترنری - داخل قاره
- ۴ حرکات ساب هرسی نین در زاگرس در حد تماس کدام سازندهای زیر اثر نموده است؟
- (۱) ایلام - گورپی (۲) داریان - کژدمی (۳) سروک - ایلام (۴) کژدمی - سروک
- ۵ اشتراق دور کوچک قاره ایران مرکزی در زمان به وجود آمده و در زمان بسته شد.
- (۱) پالئوزویک پسین، کرتاسه پسین (قبل از مائستریشن) (۲) ژوراسیک - سنتوزن، کرتاسه پسین (بعد از مائستریشن)
 (۳) تریاس پسین، نئوژن، تریاس پسین
- ۶ عمده ترین گسلی که بر ژئودینامیک ایران اثر داشته چه نام دارد؟
- (۱) گسل البرز شمالی (۲) گسل میتاب (۳) گسل شمال تبریز - زفره (۴) گسل راندگی اصلی زاگرس
- ۷ سن عمده میدان های نفتی سواحل جنوبی و حوضه خزر جنوبی چیست؟
- (۱) الیگومن (۲) الیگو - میوسن (۳) از ژوراسیک به بعد (۴) پلیوسن
- ۸ دریای پاراقیتس چه قسمتی از ایران را زیر پوشش داشته و در چه زمانی؟
- (۱) جنوب و حاشیه جنوبی دریای خزر، از میوسن میانی به بعد
 (۲) باختر و جنوب باختر ایران، از تریاس پسین به بعد
 (۳) خاور ایران، از ژوراسیک تا کرتاسه
 (۴) پهنه مکران، از پالئوزن به بعد
- ۹ سازند آب حاجی به سن دارای رخساره می باشد.
- (۱) اوخر لیاس - اوایل دوگر، دریای باز کم ژرفای گرم (۲) لیاس، دریاچه‌ای و مردابی
 (۳) لیاس، تبخیری و کولابی (۴) اوخر لیاس - اوایل دوگر، سدی
- ۱۰ علت تنوع سازندها در ناحیه زاگرس در طی پالئوسن و اتوسن کدام است؟
- (۱) تغییرات آب و هوایی (۲) تشکیل حوضه فورلند پس از کرتاسه
 (۳) ورود رسوبات تخریبی به حوزه (۴) جدا شدن حوضه‌های متفاوت در ناحیه زاگرس طی این زمان
- ۱۱ در کدام یک از پهنه‌های ساختاری - رسوبی ایران سنگ‌های پرکامبرین رخنمون شده، دگرگونی چندگانه دارند؟
- (۱) ایران مرکزی (۲) البرز شمالی (۳) محل برخورد البرز - آذربایجان و سندج - سیرجان
- ۱۲ در ایران، از چه زمانی به بعد رسوبات عمدتاً در محیط‌های پسروندی بر جای گذاشته شدند؟
- (۱) پرکامبرین پسین (۲) مرز ژوراسیک - کرتاسه (۳) تریاس پسین - ژوراسیک میانی
- ۱۳ لیتلولوژی و نام سنگ‌های آتش‌فشاری کافت‌های نابالغ پرکامبرین پسین ایران چیست؟
- (۱) رویولیت‌های مجموعه هرمز (۲) رویولیت‌ها و توفهای وابسته موجود در سری‌های ریزو و دسو
 (۳) رویولیت و توفهای رویولیتی، رویولیت‌های قره داش و سازند مهاباد
 (۴) رویولیت‌ها و توفهای وابسته، موسوم به سازند غیر رسمی اسفورودی
 کدام یک از ویژگی‌های فرو افتادگی دزفول به شمار می‌رود؟
- ۱۴ (۱) در برگیرنده بیشتر میدان‌های نفتی ایران است.
 (۲) پدیده ساختاری است که در شمال غرب زون راندگی‌ها قرار دارد.
 (۳) سازند آسماری در آن بیشترین ضخامت را دارد.
 (۴) روند کلی ساختمان‌های این منطقه از روند عمومی زاگرس تبعیت می‌کند.

-۱۵

کدام گزینه صحیح است؟

- ۱) فازهای مختلف آلپی در ایران مرکزی تأثیر قابل توجهی نداشته‌اند.
- ۲) در توالی رسوبات پلا تفرمی پر کامبرین - تریاس میانی ایران دگر شیبی‌های متعدد وجود دارند.
- ۳) نهشته‌های پر کامبرین ایران علیرغم متحمل شدن دگرگونی و دگر شکلی قابل توجه، عمدها رسوبات آواری تشکیل شده در محیط‌های کم عمق می‌باشند.
- ۴) توالی‌های تریاس بالایی - ژوراسیک میانی در همه مناطق نهشته‌های ذغال‌دار معرف محیط‌های دلتایی - مردابی می‌باشند.

-۱۶

در کدام سنگها کوردیریت ماکل دار دیده نمی‌شود؟

- ۱) شیستها
- ۲) گنیس‌ها
- ۳) میلیونیت‌ها
- ۴) هورنفلس‌ها

-۱۷

در کدام سنگ دگرگونی دوباره سازی شیمیابی اندکی دیده می‌شود؟

- ۱) الترا میلیونیت
- ۲) برش تکتونیکی
- ۳) فیلونیت
- ۴) میلیونیت

-۱۸

مسکویت تا کدام رخساره پایدار است؟ و سپس به کدام کانی‌ها تبدیل می‌شود؟

- ۱) انتهای رخساره آمفیولیت - سیلیمانیت و اورتوکلاز
- ۲) ابتدای رخساره آمفیولیت - لابرادوریت و هیپرستن

-۱۹

۳) انتهای رخساره گرانولیت - سیلیمانیت و اورتوکلاز

در نمودار ACF کدام دو کانی قابل نمایش نیست؟

-۲۰

۱) بیوتیت - آندالوزیت

۲) فلدسپار پتاسیم - آپیدوت

۳) موسکوویت - دیبوپسید

کدام یک از موارد زیر نشان دهنده عدم تعادل بافتی در یک سنگ دگرگونی است؟

- ۱) عدم وجود حاشیه‌های واکنشی
- ۲) عدم وجود کانی‌های با زونینگ شیمیابی
- ۳) وجود کوارتز در سنگ

-۲۱

کدام سنگ‌های ملاتوکرات تامزوکرات عمده‌ای دایکی و بیش از $\frac{1}{3}$ آنرا کانی‌های تیره تشکیل می‌دهد؟

- ۱) پیکریت بازالت‌ها
- ۲) لامپروفیرها
- ۳) کراتوفیرها
- ۴) گرانوفیرها

-۲۲

مقدار FeO (آهن دو ظرفیتی) در کدام سنگ آذرین بیشتر است؟

- ۱) بازالت تولئیتی
- ۲) بازالت قلایی
- ۳) بازالت کالکو آلالان
- ۴) گرانیت کالکو آلالان

-۲۳

ترونجمیت چه سنگی است؟

- ۱) معادل خروجی پلومازیت (نوعی دیبوریت)

-۲۴

۲) دیبوریت سرشار از کرندوم

سنگی مشکل از کوارتز (۲۰ درصد)، پلازیوکلاز (۴۰ درصد)، هورنبلند (۲۰ درصد) و بیوتیت (۲۰ درصد) و دارای بافت گرانولار، چه نامیده می‌شود؟

-۲۵

۱) کوارتز گابریو

۲) کوارتز دیبوریت

۳) تونالیت

سنگ آذرین درونی با کانی شناسی مودال الیوین = ۳۰٪، ارتوپیروکسن = ۲۰٪، کلینو پیروکسن = ۴۵٪ و پلازیوکلاز = ۵٪ چه نام دارد؟

-۲۶

۱) الیوین وبستریت

۲) پلازیوکلاز لرزولیت

۳) پلازیو کلاز ورلیت

مقدار اکسید آلومنیوم در کدامیک از ماسه سنگها بیشتر است؟

-۲۷

۱) چرت آرنایت

۲) کالک لیتايت

۳) گری وک

در شرایط تکتونیکی ناپایدار کدامیک از ماسه سنگ‌های زیر تشکیل می‌شوند؟

-۲۸

۱) آرکوز

۲) ساب آرکوز

۳) لیت آرنایت

کدام گزینه تعریف دقیقتری از ماتریکس در ماسه سنگها را ارائه می‌نماید؟

-۲۹

۱) ذرات آواری (اولیه) کوچکتر از ذرات اصلی

۲) ذرات آواری (اولیه) با اندازه کوچکتر از ۳۰ میکرون

۳) ذراتی که لابلای ذرات اصلی را پر کرده‌اند و قطر کمتر از ۳۰ میکرون دارند.

۴) ذراتی که زمینه سنگ را می‌سازند و قطر کمتر از ۳۰ میکرون دارند.

میکریت فسیل دار چه خصوصیاتی دارد؟

۱) کمتر از ۱ درصد خرده اسکلتی دارد.

۲) ۱۰ تا ۱۵ درصد خرده اسکلتی دارد.

۳) بیش از ۵۰ درصد خرده اسکلتی دارد.

-۳۰

- ۳۰ کدام ماسه‌سنگ در توالی کلاسیک بوما تشکیل می‌شود؟
 ۱) ساب آرکوز ۲) ساب لیت آرنایت
 ۳) کوارتز آرنایت ۴) گری وک
- ۳۱ کدام گزینه در ارتباط با خواص آب نادرست است؟
 ۱) گرانزوی نسبتاً پایین دارد.
 ۲) ترکیبات دارای پیوند کووالانسی در آب نسبتاً انحلال ناپذیرند.
 ۳) بالاترین گرمای نهان تبخیر در میان همه مواد را دارد. ۴) دمای چگالی بیشینه آن پایین‌تر از نقطه انجماد است.
- ۳۲ در ترمودینامیک شیمیایی انرژی آزاد هلمهولتز (Helmholtz) در چه شرایطی اندازه‌گیری می‌شود؟
 ۱) دما و فشار ثابت ۲) دما و حجم ثابت ۳) دمای متغیر و حجم ثابت ۴) دمای متغیر و فشار ثابت
- ۳۳ کدام گزینه در ارتباط با تعادل جرمی زمین شیمیایی عناصر نادرست است؟
 ۱) برای عناصری که نقش زیست‌شناسی ندارند تعادل جرمی کمتر از یک خطر زیست محیطی جدی به شمار می‌آید.
 ۲) به طور کلی هرچه تعادل جرمی عناصر به یک نزدیکتر باشد، اثرات زیست محیطی آنها کمتر است.
 ۳) داده‌های زمین شیمیایی با صحت و دقت کم می‌تواند سبب ناتعادلی جرمی شود.
 ۴) ویژگی‌های زمین شیمیایی عناصر بر تعادل جرمی آنها تأثیرگذار است.
- ۳۴ در سامانه‌های تجربی با قدرت یونی بالا، با افزایش قدرت یونی:
 ۱) ضریب فعالیت تغییر نمی‌کند.
 ۲) ضریب فعالیت به یک نزدیک می‌شود.
 ۳) انحلال‌پذیری ترکیب‌های یونی افزایش می‌یابد.
 ۴) انحلال‌پذیری ترکیب‌های غیر یونی افزایش می‌یابد.
- ۳۵ در کدام یک از مواد زیر فعالیت آب به یک نزدیکتر است?
 ۱) آب باران ۲) آب دریا ۳) آب رودخانه ۴) آب دریاچه‌های لب شور
- ۳۶ واکنش تعادل آب کانی در کدام یک از مواد زیر به تعادل نمی‌رسد?
 ۱) آب زیرزمینی ۲) آب اقیانوس ۳) بارش ۴) دریاچه
- ۳۷ کدام واکنش از نظر سینیتیکی مرتبه صفرم می‌باشد؟
 ۱) اکسایش پیریت ۲) انحلال ژپس
- ۳۸ واکنش‌پذیری کدام کانی در $pH = 5$ بیشتر است?
 ۱) الیوین ۲) بروسیت
- ۳۹ با افزایش pH آب‌های اسیدی:
 ۱) انحلال‌پذیری مولیبدن کاهش می‌یابد.
 ۲) ماندگاری سرب و روی در محلول افزایش می‌یابد.
 ۳) ورود فلزات سنگین به رسوبات کاهش می‌یابد.
 ۴) تشکیل اکسی‌هیدروکسیدهای آهن افزایش می‌یابد.
- ۴۰ در چه محدوده‌ای از pH ظرفیت بافری آب به صفر می‌رسد?
 ۱) $pH = 0$ ۲) $pH < 2$ ۳) $pH = 7$ ۴) $pH > 12$
- ۴۱ با افزایش مقدار اکسیژن کدام یک از فرآیندهای اکسایشی زیر زودتر رخ می‌دهد?
 ۱) اکسایش منگنز ۲) $N_2 \rightarrow NO_3^-$ ۳) $SO_4^{2-} \rightarrow$ سولفید
- ۴۲ باکتری دی‌سولفووپرودی سولفوریکانس در چه محدوده‌ای از pH رشد می‌کند?
 ۱) $pH > 5/5$ ۲) $pH < 3/5$ ۳) $pH < 2/5$
- ۴۳ با توجه به نمودار $Eh - pH$ سامانه نیتروژن، میدان پایداری گونه نیمه پایدار NO_2^- در درون میدان پایداری کدام یک قرار می‌گیرد؟
 ۱) N_2 ۲) NO_3^- ۳) NH_4^+ ۴) NH_3
- ۴۴ کدام گزینه در ارتباط با نسبت H/C در مواد هومیک درست است?
 ۱) با افزایش ترکیب‌های آروماتیک افزایش می‌یابد.
 ۲) با افزایش ترکیب‌های آلیفاتیک کاهش می‌یابد.
- ۴۵ نسبت H/C در مواد هومیک خاک کمتر از هومیک دریایی است.
 ۱) نسبت H/C در مواد هومیک آب شیرین با مواد هومیک دریایی برابر است.
- ۴۶ کدام گزینه در مورد آفت‌کش‌های فرم درست است?
 ۱) ترکیب‌های آلی کلرداری هستند که زمان ماندگاری و سمناکی پایینی دارند.
 ۲) ترکیب‌های آلی کلرداری هستند که زمان ماندگاری پایین ولی سمناکی بالایی دارند.
 ۳) ترکیب‌های آلی فسفرداری هستند که زمان ماندگاری پایین ولی سمناکی بالایی دارند.
 ۴) ترکیب‌های آلی فسفرداری هستند که زمان ماندگاری و سمناکی پایینی دارند.

- کدام یک از LNAPL‌های زیر انحلال‌پذیری بیشتری در آب شیرین دارد؟
 ۱) اتیل بنزن ۲) بنزن ۳) تولوئن ۴) زایلن -۴۶
- کدام گزینه بیشترین کارایی نسبی زیست شناختی (RBE) را دارد؟
 ۱) پرتوهای ایکس و گاما ۲) نوترون‌های گرمایی ۳) نوترون‌های پر سرعت -۴۷
- از نظر ایزوتوپی متان حاصل از کدام یک از منابع زیر سبک‌تر است؟
 ۱) تخمیر استات ۲) نفت ۳) زمین گرمایی ۴) یون‌های سنگین -۴۸
- بار سطحی کاتولینیت‌ها عمدتاً به وسیله کدام گزینه کنترل می‌شود؟
 ۱) تعداد پیوندهای شکسته ۲) جانشینی در لایه‌های چهاروجهی ۳) نقص یا کاستی‌های ساختار بلورین ۴) کدام گزینه در ارتباط با توزیع گونه‌ها بین فاز آبگین و ماده جذب کننده نادرست است؟ -۴۹
- کدام گزینه در ارتباط با افزایش غلظت گونه‌ها، رفتار توزیع به حالت ایده‌آل نزدیک می‌شود.
 ۱) با غلظت‌های بسیار پایین، توزیع از یک رابطه خطی پیروی می‌کند.
 ۲) در غلظت‌های بسیار پایین، سامانه به شکل ایده‌آل رفتار می‌کند.
 ۳) در غلظت‌های کاملاً بالا، گونه‌ها ممکن است از راه تهنشینی خارج شوند. -۵۰
- کدام گزینه در ارتباط با کریزوتیل درست است؟
 ۱) در گستره وسیعی از pH pTansil رتای کریزوتیل منفی است.
 ۲) کریزوتیل برای تولید لباس عایق بکار نمی‌رود.
 ۳) کریزوتیل نقش مهمی در مژوتیوما دارد.
 ۴) در ساختار کریزوتیل حاشیه ایاف لوله‌ای می‌تواند آهن فرو داشته باشد. -۵۱
- دلیل اولویت Ba در سری گزینش‌پذیری کاتیون‌های دو ظرفیتی Ca, Sr, Ba و Mg توسط زئولیت‌ها چیست؟
 ۱) الکترونگاتیویته کمتری دارد.
 ۲) شاعع یون هیدراته کمتری دارد.
 ۳) شاعع اتمی کمتری دارد.
 ۴) اندازه ذرات غبار سیلیس برای ورود به ریه چقدر در نظر گرفته می‌شود؟ -۵۲
- کدام گزینه عمدۀ ترین مصرفگاه متان را نشان می‌دهد؟
 ۱) ۱۰ میکرون و کوچکتر ۲) ۲۰ میکرون و بوجختر ۳) ۳۰ میکرون و کوچکتر ۴) ۴۰ میکرون و کوچکتر -۵۳
- کدام گزینه در ارتباط با اکسید کربن در ورد سپهر
 ۱) اقیانوس ۲) تبدیل به دی‌اکسید کربن در سرمه
 ۳) خاک ۴) بیخ‌های قطبی -۵۴
- همراهی SO_4^- , NH_4^+ , NO_3^- و K در آب باران نشان دهنده کدام منشأ است؟
 ۱) خاک ۲) زیست‌شناختی ۳) سوزاندن زیست‌توده ۴) کود شیمیایی -۵۵
- بیشینه طول موج یک فوتون برای شکستن مولکول اکسیژن چند نانومتر می‌باشد؟
 ۱) ۱۴۰ (۴) ۲) ۲۴۰ (۳) ۳) ۳۴۰ (۲) -۵۶
- دلیل رخداد وارونگی‌های نیمه حاره کدام است؟
 ۱) حرکت نسبی هوای گرم در بالای هوای سرد
 ۲) سرد شدن تابشی سطح زمین
 ۳) فرود آمدن هوا در یک مرکز پرسشار -۵۷
- کدام گزینه در ارتباط با محیط جو نادرست است؟
 ۱) اوزون نزدیک به سطح در حال کاهش است.
 ۲) با فرض دمای کنونی جو، هلیم و متان می‌توانند به دمای گریز برسند.
 ۳) بسیاری از آلودگی‌های جوی عمدتاً به ورد سپهر محدود می‌شوند.
 ۴) دمای گرما سپهر بالاست ولی انرژی گرمایی آن بسیار کم است. -۵۸
- کدام گزینه غالباً بازتاب کننده ورود فلزها از هوا کره می‌باشد؟
 ۱) افق O خاک ۲) گل سنگ ۳) گیاهان خشکی ۴) رسوبات یخچالی -۵۹
- همه‌ی فرایندهای زیر نقش مهمی در کنترل pH آب‌های سطحی و زیرزمینی دارند بجز؟
 ۱) اگزالات پتاسیم ۲) اگزالات سدیم ۳) اگزالات لیتیم ۴) اگزالات کلسیم -۶۰
- کدام گزینه انحلال‌پذیری کمتری دارد؟
 ۱) برهم کنش آب و سنگ
 ۲) واکنش‌های اسیدی
 ۳) بارش‌های اسیدی -۶۱
- در H⁺های نسبتاً بالا و شرایط کاهنده، گونه غالب نیتروژن در آب‌های سطحی و زیرزمینی کدام گزینه است؟
 ۱) NH₄⁺ (۴) ۲) NH₃ (۳) ۳) NO₃⁻ (۲) ۴) NO₂⁻ (۱) -۶۲

- ۶۳ از ژرفای اقیانوس اطلس به سمت ژرفای اقیانوس آرام، قلیائینگی کربنات (CA) و کربن غیرآلی حل شده (DIC) چگونه تغییر می‌کند؟
- DIC کاهش و CA افزایش می‌یابد.
 - هر دو کاهش می‌یابد.
 - کدام گزینه در شمار گروه عناصر زیست محدود کننده است؟
- Si (۴) Ca (۳) C (۲) Ba (۱)
- ۶۴ کدام گزینه در ارتباط با هیدرات‌های متان درست است؟
- فقط در رسوبات دریایی یافت می‌شوند.
 - بیشتر منشأ زیست‌زاد دارند.
- ۶۵ انحلال پذیری گاز رادون در کدام گزینه بیشتر است؟
- آب
 - اتیلیک الکل
- ۶۶ در حذف آلودگی‌های نفتی خاک کدام روش مؤثر است؟
- افزایش درصد رس
 - فیلتر اسیون
- ۶۷ کدام گزینه صحیح است؟
- پیوند ضعیف میان کادمیم و مواد آلی موجب تجزیه کند کادمیوم در محیط می‌شود.
 - پیوند ضعیف میان کادمیم و مواد آلی موجب تجزیه سریع کادمیم می‌شود.
 - پیوند قوی میان کادمیم و مواد آلی موجب تجزیه سریع کادمیم در محیط می‌شود.
 - پیوند قوی میان کادمیم و مواد آلی موجب تجزیه کند کادمیم در محیط می‌شود.
- ۶۸ کدام گزینه اندام هدف اصلی Xenobiotics های خون برد (bloodborne) است؟
- ریه
 - قلب
 - کبد
 - کلیه‌ها
- ۶۹ کدام یک از گونه‌های عنصر سلنیم در pH قلیایی و شرایط اکسایشی محلول و متحرک است؟
- SeO_4^{2-} (سلنات)
 - HSe^- (منوهیدروژن سلنید)
 - SeO_3^{2-} (سلنیت)
- ۷۰ حذف ترکیبات آلی و غیرآلی فلزات سنگین در کودکان زیر شش ماه و افراد بالغ چه تفاوتی دارد؟
- در کودکان زیر شش ماه کندتر است.
 - در کودکان زیر شش ماه سریع‌تر است.
 - در کودکان و افراد بالغ تفاوتی نمی‌کند.
 - با افزایش سن کندتر می‌شود.
- ۷۱ کدام یک از عناصر زیر را نمی‌توان با استفاده از روش «ریز خاکستر سازی» (microincineration) در بافت‌های بدن انسان اندازه‌گیری کرد؟
- آهن
 - سیلیسیم
 - فسفر
 - کلسیم
- ۷۲ بی‌اشتهاای، استفراغ، افسردگی و ریزش موهای بدن نشان دهنده مسمومیت حاد یا مزمن به کدام است؟
- تالیم
 - سلنیم
 - منگنز
 - مس
- ۷۳ مسمومیت حاد عنصر سلنیم بیش از همه به کدام اندام آسیب می‌رساند؟
- ریه
 - سیستم اعصاب
 - کبد
 - کلیه
- ۷۴ کدام یک از گونه‌های شیمیایی مس می‌تواند باعث کاتالیز شدن واکنش‌هایی شود که به تشکیل اکسی رادیکال‌ها منجر می‌شوند؟
- Cu⁺⁺ (۴) CuCl⁻ (۳) Cu⁺ (۲) CuS⁻ (۱)
- ۷۵ بیماری‌های Calciurea و proteinuria نشانه سمناکی کدام یک از عناصر سنگین زیر است؟
- کروم
 - کادمیم
 - منگنز
 - نیکل
- ۷۶ مصرف روزانه کدام یک در بدن انسان بالغ بیشتر است؟
- کلسیم
 - پتاسیم
 - فسفر
 - کلر
- ۷۷ احتمال ابتلا به کدام بیماری در اثر پدیده خاک خواری (geophagia) بیشتر است؟
- hyperkalimia
 - terrasigillata
 - neumoconiosis
 - hypozincemia
- ۷۸ کدام گزینه علت ابتلا به بیماری کبدی hepatoportal sclerosis است؟
- سمناکی حاد مولیبدن
 - سمناکی حاد منگنز
 - سمناکی مزمن مس
 - سمناکی مزمن آرسنیک
- ۷۹

- ۸۰ بیماری **dilated cardiomyopathy** نتیجه غلظت بالای کدام عنصر در خون است؟
 ۱) سلنیوم ۲) کربالت ۳) جیوه ۴) نیکل
- ۸۱ با در نظر گرفتن تقسیم بندی قابلیت انتقال عناصر از خاک به گیاه که بر اساس نسبت تجمع زیستی (غلظت فلز در خاک/غلظت فلز در گیاه = BR) تعیین می‌شود. کدام یک از مجموعه عناصر زیر با ترتیب ذکر شده بیشترین تجمع را در گیاهان دارد (BR: ۱۰-۱).
 Ba > Ti > Sc > Zr > Bi (۲)
 Rb > Cs > Br > B > Cd (۴)
- ۸۲ کدام گزینه مشخصه میکروسکوپی بیماری پارکینسون منگنز القا است?
 ۱) افزایش چشمگیر آهن ۲) پاسخ مثبت بیمار به درمان با levopoda
 ۳) آسیب دیدن سلول‌های دوبامین‌زا (dopaminergic Lewy bodies) در بافت مغز
- ۸۳ کدام گزینه در مورد ترکیبات آلی قلع درست است?
 ۱) آبدوست هستند و بر روی کبد اثر نامطلوب به جای می‌گذارند.
 ۲) آبدوست هستند و بر روی ریه تأثیر می‌گذارند.
 ۳) آب گریز هستند و باعث مسمومیت شدید کبدی می‌شوند.
 ۴) چربی دوست هستند و بر روی سیستم اعصاب تأثیر می‌گذارند.
- ۸۴ تفاوت سوخت و ساز (metabolism) ترکیبات آلی و معدنی سرب چگونه است?
 ۱) بسیار متفاوت است.
 ۲) تفاوتی نمی‌کند.
 ۳) به ترکیب آلی یا معدنی سرب بستگی دارد.
 ۴) بدن انسان تنها قادر به سوخت و ساز ترکیبات آلی سرب است.
- ۸۵ زیست آپاتیت (bioapatite) به کدام یک از آپاتیتهای معدنی زیر شباهت بیشتری دارد?
 ۱) کلرآپاتیت ۲) فلور آپاتیت ۳) هیدروکسی آپاتیت ۴) هیدروکسی فلور آپاتیت
- ۸۶ حضور فیبرهای خوراکی (dietary fibers) در رژیم غذایی چه تأثیری بر روی زیست دسترس پذیری عنصر روی (Zn) می‌گذارد؟
 ۱) تأثیری بر زیست دسترس پذیری آن ندارد.
 ۲) زیست دسترس پذیری آن را افزایش می‌دهد.
 ۳) افتادگی مج دست و پا در بزرگ سالان نشانه مسمومیت از کدام عنصر است?
 ۴) منگنز (۴) کادمیم (۳) سرب (۲) جیوه
- ۸۷ کدام یک در روده کوچک بهتر جذب می‌شود?
 ۱) ترکیبات اسیدی ۲) ترکیبات قلیایی ۳) ترکیبات یونیده
- ۸۸ بیشترین مقدار منیزیم بدن انسان در کدام اندام قرار دارد?
 ۱) استخوان ۲) پلاسمای خون ۳) دستگاه گوارش
- ۸۹ مهم‌ترین عارضه ناشی از تنفس گاز NO_2 در فوران‌های آتشفسانی چیست?
 ۱) ابتلاء به بیماری آسم ۲) بی‌نظمی شدید ضربان قلب
 ۳) بسته شدن مجرای تنفسی ۴) تشکیل اسید نیتریک در بخش‌های یابین لوله تنفسی
- ۹۰ پرتوزائی مواد غذایی بیش از همه از کدام عنصر پرتوزا ناشی می‌شود?
 ۱) $\text{Rn}_{۲۲}$ ۲) $\text{Bi}_{۲۱}$ ۳) $\text{K}_{۴۰}$
- ۹۱ احتمال جذب سطحی آرسنیک بر روی کدام یک از ترکیبات زیر بیشتر است?
 ۱) رسهای اسماکتیتی ۲) کربناتهای آهن و منیزیم ۳) مواد آلی
- ۹۲ کدام یک از ترکیبات زیر در دفاع سلول در مقابل گونه‌های واکنشگر مهم‌تر است?
 ۱) ایودوتیرونین دی ایودیناز (Iodothyronine Deiodinase)
 ۲) تیوردوکسین ریداکتاز (Thioredoxin Reductase)
 ۳) گلوتاتیون پراکسیداز (Glutathione peroxidase)
 ۴) سوپر اکسید دیسموتاز (Superoxide dismutase)
- ۹۳ کدام گزینه نشان دهنده پیامد زیستی ناشی از افزایش بیش از حد مجاز نیترات در بدن است?
 ۱) کاهش ظرفیت انتقال خونی ۲) اسهال و تهوع
 ۳) سرطان معده ۴) عوارض پوستی
- ۹۴ عامل بروز بیماری متهموگلوبینا (Methemoglobin) افزایش بیش از حد مجاز کدام گزینه در بدن انسان است?
 ۱) فسفات ۲) کلر ۳) سولفات ۴) نیترات

- ۹۶ کدام گزینه پیامد زیستی سیلیس (SiO_2) نیست؟
 ۱) تصلب شراین ۲) سیلیکوس ۳) مسمومیت شدید ۴) کاهش کارکرد ریهها
- ۹۷ ظرفیت تبادل کاتیونی (CEC) ریشه گیاهان به کدام یک از گروههای عاملی زیر بستگی دارد؟
 ۱) استرها ۲) کربوکسیلها ۳) کتونها ۴) هیدروکسیلها
- ۹۸ مسیر اصلی سوخت و سازی (متابولیکی) آرسنیک غیرآلی در بدن کدام است؟
 ۱) متیلی شدن زیستی ۲) اکسایش اسیدهای چرب ۳) برهمکنش با گروههای سولفیدریلی ۴) فسفریلی شدن اکسایشی
- ۹۹ ترکیبات غیرآلی کدام یک از عنصر زیر سمناکی کمتری دارد؟
 ۱) آرسنیک ۲) جیوه ۳) سلنیم ۴) مولیبدن
- ۱۰۰ رایج‌ترین پروتئین در کسر آلی بافت استخوان چه نام دارد؟
 ۱) انامel (enamel) ۲) دنتین (dentine) ۳) کولاژن (collagen) ۴) سمنتوم (cemntum)

نحوه ایجاد
کسر از
استخوان