



132F

132

F

نام :

نام خانوادگی :

محل امضاء :

صبح جمعه

۹۲/۱۲/۱۶

دفترچه شماره (۱)



اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.

امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی دورهای دکتری (نیمه متاخر) داخل سال ۱۳۹۲

زیست‌شناسی فیزیولوژی گیاهی (کد ۲۲۲۰)

مدت پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۱۰۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی (فیزیولوژی - سیستماتیک و تکوین گیاهی شامل ریخت‌شناسی - تشریح - ریخت‌زایی و اندام‌زایی - جذب و انتقال در گیاهان - متابولیسم گیاهی)	۱۰۰	۱	۱۰۰

اسفندماه سال ۱۳۹۲

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی‌باشد.

- ۱) افزایش شیب منحنی پتانسیل فشار $\frac{\Delta \Psi_p}{\Delta V} = \epsilon$ نشان دهنده چیست؟
- (۱) افزایش پتانسیل آب سلول
 (۳) سخت و چوبی شدن دیواره
- ۲) میزان جریان آب از خلال یک غشا به وسیله کدام عامل بیشتر تعیین می شود؟
- (۱) اختلاف پتانسیل آب
 (۳) شیب غلظت
- ۳) سازوکار ورود نیترات به درون سلول و درون واکوئل های گیاهان کدام است؟
- (۱) هر دو همبry است.
 (۳) هر دو پادری است.
- ۴) در سلسله فرایندهای تثبیت یک مولکول نیتروژن مولکولی و احیای آن به سطح ۲ مولکول آمونیاک است
- (۱) نیازی به انرژی خارجی نیست
 (۳) نیاز به ۱۶ پروتون و ۸ مولکول ATP است
- ۵) کدام عناصر در واکنش های اکسایش و کاهش دخالت دارند؟
- B , Si , P , S , N (۲)
 Mo , Ni , Cu , Zn , Fe (۴)
 Cl , Mg , Ca , K , B (۱)
 Cl , Mg , Cl , Mg (۳)
- ۶) تعادل بین دو چرخه کالوین و چرخه اکسایش کرین فتوسنتزی C_6 در برگ گیاهان به چه عواملی وابسته است؟
- (۱) ویژگی های سینتیکی رو بیسکو، نسبت غلظت O_2 / CO_2 ، دما
 (۲) غلظت ریبولوز ۱ و ۵ فسفات، نسبت غلظت O_2 / CO_2 ، نور
 (۳) دما، نور، نسبت غلظت CO_2 / O_2
 (۴) میل ترکیبی رو بیسکو به گهرمایه ، میزان حلالیت CO_2 / O_2 ، نور
- ۷) کدام گزینه در مورد تنظیم فتوسنتز C_6 درست است؟
- (۱) فسفریلی شدن پیرووات ارتو فسفات دی کیناز در سلول های غلاف آوندی
 (۲) تنظیم NADP مالات دهیدروژنаз در سلول های مزو فیل توسط تیوردو کسین
 (۳) فسفریلی شدن PEPCK توسط و غیرفعال شدن آن به دلیل افزایش حساسیت به مالات
 (۴) فعال سازی مستقیم PEPC در سلول های مزو فیل توسط تغییرات pH و Ca
- ۸) تنظیم کدام آنزیم توسط سیستم تیوردو کسین انجام نمی شود؟
- (۱) ATP سنتاز
 (۲) فسفو ریبولوز کیناز
 (۳) فسفو فروکتو کیناز
- ۹) واکنش کاتالیز شده توسط کدام یک از آنزیم ها در مسیر گلیکولیز یک طرفه است؟
- (۱) انولاز
 (۲) پیرووات کیناز
 (۳) فسفو گلیسرات موتاز
- ۱۰) آمونیاک آزاد شده در نتیجه کربوکسیلاسیون و آمیناسیون گلیسین در متابولیسم تنفس نوری :
- (۱) به محیط پیرامونی وارد می شود و به تدریج غلظت آن افزایش می یابد.
 (۲) مجددا به صورت نیترات تثبیت می شود.
 (۳) تجزیه شده و به مولکول دی نیتروژن یا نیتروژن مولکولی تبدیل می شود.
 (۴) می تواند وارد کلروپلاست شده و در سیکل GS/GOGAT مصرف شود.

جهش یافته نانا (nana) و le در نخود بترتیب در کدام مرحله از بیوسنتر ژیرلین معیوب شده است؟

-11

- ۱) کانوروتیک اسید اکسیداز و GA₃OX (GA₃O_X-۳-اکسیداز)
- ۲) GA₂O_X, GA₃OX (GA₂O_X-۲-اکسیداز)
- ۳) GA₂O_X, GA₃OX (GA₂O_X-۲-اکسیداز)
- ۴) کانورون اکسیداز و GA (GA₃O_X-۳-اکسیداز)

در مسیر ترارسانی علامت سیتوکینین کدام گزینه صحیح است؟

-12

- ۱) با غیر فعال شدن بخش هیستیدین کینازی گیرندهای سیتوکینینی رونویسی ARR فعال می‌گردد.
- ۲) تعدادی از هیستیدین فسفوترانسفرازها قادر ناحیه دریافت کننده حسگر کینازی هستند.
- ۳) گیرنده سیتوکینین در غشاء پلاسمایی یک هیستیدین فسفوترانسفراز دایمی است.
- ۴) هیستیدین فسفوترانسفراز رابط بین سیتوسل و هسته دارای یک باقیمانده حفاظت شده آسپارتات است.

زنده زائی مربوط به چه فرآیندی است؟

-13

- ۲) مقدار کم آبسزیک اسید در پوسته دانه
- ۴) مقدار بالای جیبرلین در پوسته دانه
- ۱) مقدار کم آبسزیک اسید در جنین
- ۳) مقدار بالای جیبرلین در جنین

در رابطه با مکانیسم عمل اتیلن کدام جمله صحیح است؟

-14

- ۱) اتصال اتیلن به دایمرهای ETR1 موجب فعال‌سازی آبشار MAP کینازی می‌شود.
- ۲) گیرندهای اتیلن، در غیاب هورمون فعالیت کینازی CTR1 را فعال و اثر هورمون را سرکوب می‌کند.
- ۳) غیر فعال‌سازی CTR1 سبب غیر فعال شدن گیرنده ELN2 در غشاء هسته می‌شود.
- ۴) غیر فعال شدن ELN2 موجب القای بیان فاکتورهای رونویسی می‌شود.

تحریک تشکیل تارهای کشنده مربوط به عمل کدام تنظیم کننده رشد است؟

-15

- ۲) براسینولید
- ۴) ژامونونیک اسید
- ۱) اکسین
- ۳) اتیلن

تیپ کیسه رویانی نوع پیاز (*Allium*) از چه لحاظ متفاوت از تیپ علف هفت بند (*Polygonum*) است؟

-16

- ۱) اندازه بزرگتر
- ۳) دارا بودن ۱۶ هسته به جای ۸ هسته
- ۲) آندوسپرم هسته‌ای به جای یاخته‌ای
- ۴) تحلیل دو هسته به جای ۳ هسته پس از میوز

کدام گیاه دارای کامبیوم آوندی متعدد است؟

-17

- ۱) آلاله
- ۳) چغندر
- ۲) بلوط
- ۴) کاج

طی مراحل رویانی در گیاه کیسه کشیش، فعالیت سوسپانسور در چه زمانی به پایان می‌رسد؟

-18

- ۱) شروع سبز شدن دانه
- ۳) پایان مرحله کروی
- ۲) مرحله تشکیل ریشه اولیه
- ۴) پایان مرحله قلبی شکل

تک ساقه‌ای بودن یک درخت (در مقابل درختچه) به واسطه چه نوع رشدی است؟

-19

- ۱) آکروتون
- ۳) اپی‌تون
- ۲) بازیتون
- ۴) هیپوتون

پارانشیم هوایی با یاخته‌های ستاره‌ای شکل، در ساقه کدام یک وجود دارد؟

-20

- ۱) *Atriplex*
- ۳) *Juncus*
- ۲) *Dactylis*
- ۴) *Hippuris*

- یدیوبلاست (idioblast)** یعنی:

 - ۱) نوعی خاص از بافت ترشحی.
 - ۲) سلول خاصی که از سایر سلول‌های بافتی که در آن قرار دارد از نظر اندازه، ساختار و یا محتوی تفاوت داشته باشد.
 - ۳) فقط به اسکلریدهایی گفته می‌شود که ممکن است در هر جای بافت حضور داشته باشند.
 - ۴) سلول‌های اسکرانشیمی که دارای اندازه ضخیم و چوبی بوده و معمولاً مرده‌اند.

-11

کدام گیاهان جزء فلور ماسه دوست (psamophytes) ایران محسوب می‌شوند؟
Cakile maritima . *Convolvulus persicus* . *Haloxylon persicum* (۱)
Eremurus persicus . *Onosma sericea* . *Scrophularia striata* (۲)
Edelitzia rosmarinus . *Malcolmia africana* . *Atriplex canescens* (۳)
Ammodium scabrum . *Hyoscyamus senecionis* . *Campanula rapunculus* (۴)

-11-

کلاله پیکانی شکل کدام دوسرده را به یکدیگر مرتبط می‌سازد؟	<i>Glaucium Mattiola</i> (۲)	<i>Echium Mattiola</i> (۱)
<i>Glaucium Ranunculus</i> (۴)	<i>Ranunculus Geranium</i> (۳)	

- 7 -

کدام گیاه نهان دانه از نظر اندازه از بقیه کوچکتر است؟

- 14 -

Filicophyta , Gnetophyta (۲)
Ginkgophyta , Magnoliophyta (۴)

Cycadophyta , Coniferophyta (۱)
Ginkgophyta , Cycadophyta (۳)

-18-

کدام بازدانه خودرو در فلور ایران وسیعترین پراکنش را دارد؟
Juniperus excelsa (۲) *Cupressus sempervirens* (۱)
Thuja orientalis (۴) *Pinus eldarica* (۳)

-29

بیشترین تعداد پرچم در یک گل در کدام سرده (جنس) دیده می شود؟	Berberis (۲)	Acer (۱)
Mentha (۴)		Nymphaea (۳)

- 2 -

Scrophulariaceae (۲	Asteraceae (۱)
Caryophyllaceae (۴	Plumbaginaceae (۳)

- 18 -

کدام سرده (جنس) از تیره Oleaceae و میوه از نوع سته است؟	
Ligustrum (۲)	Fraxinus (۱)
Jasminum (۴)	Olea (۳)

-२७

ویگه‌های زیر به ترتیب مربوط به کدام سرده‌ها است؟

a) epicalyx, b) cauliflory, c) cupuliflory, d) aril

- a) *Dianthus* . b) *Cercis* . c) *Quercus* . d) *Taxus* (1)
a) *Dianthus* . b) *Quercus* . c) *Cercis* . d) *Taxus* (1)
a) *Taxus* . b) *Quercus* . c) *Cercis* . d) *Dianthus* (1)
a) *Cercis* . b) *Quercus* . c) *Dianthus* . d) *Quercus* (1)

- ۳۱- تحرک کدام عنصر در pH پایین خاک کمتر است؟
- (۱) پتاسیم
 - (۲) سولفات
 - (۳) فسفات
 - (۴) مولبیدات
- ۳۲- آزادسازی اکسیژن در ریزوسفر گیاه برنج غرقابی چه نتیجه‌های دارد؟
- (۱) افزایش دنیتریفیکاسیون
 - (۲) تخفیف سمیت آهن
 - (۳) تخفیف سمیت آلومینیوم
 - (۴) رشد میکروب‌های هوایی در ریزوسفر
- ۳۳- شکل انتقال ازت ثبت شده در لگوم‌های با گرهک معین به صورت و در انواع باگرهک نامعین به صورت می‌باشد.
- (۱) آسپاراژین - گلوتامین
 - (۲) اورئید - آسپاراژین
 - (۳) گلوتامین - اورئید
 - (۴) گلوتامین
- ۳۴- سلولی با پتانسیل اسمزی ۵۹۸ - مگاپاسکال و در حالت پلاسمولیز در محیط حاوی ۵٪ مولار کلرید کلسیم با ضریب تفکیک ۲/۵ در دمای ۲۵°C قرار می‌گیرد. پتانسیل آب و فشار تورمی سلول بعد از تعادل چند مگاپاسکال است؟
- $$(R = 0.0083)$$
- (۱) صفر و +۰/۵۹۸
 - (۲) +۰/۲۸۹ و -۰/۳۰۹
 - (۳) +۰/۹۰۷ و صفر
 - (۴) -۰/۵۹۸ و صفر
- ۳۵- کدام جمله در مورد مکانیسم فعالیت ناحیه کاتالیزوری آنزیم $H^+ - ATPase$ صحیح است؟
- (۱) فسفریلی شدن باقیمانده Asp در نواحی پل زننده سطح سیتوسلی غشا
 - (۲) فسفریلی شدن باقیمانده Asp در ناحیه N انتهایی در سطح سیتوسلی غشا
 - (۳) فسفریلی شدن باقیمانده Ser در ناحیه C انتهایی منطقه خود بازدارندگی در سطح سیتوسلی غشا
 - (۴) فسفریلی شدن باقیمانده Ser در ناحیه درون سیتوسلی بین پل‌های ۴ و ۵ تراوغناشی
- ۳۶- کدام گزینه درباره تنظیم فعالیت پمپ $H^+ - ATPase$ پلاسمالمائی صحیح است؟
- (۱) پایانه C آنزیم به عنوان خود بازدارنده آنزیم عمل می‌کند.
 - (۲) حذف آنزیم پایانه C منجر به کاهش فعالیت آن می‌شود.
 - (۳) آنزیم فسفاتاز برای اتصال پروتئین ۳-۱۴ به آنزیم ضروری است.
 - (۴) برای اتصال پروتئین ۳-۱۴ به آنزیم در حضور فوزیکوگسین فسفریلیاسیون آنزیم ضروری است.
- ۳۷- کدام گزینه در مورد پتانسیل نرنست (معادله نرنست) درست است؟
- (۱) توجیه کننده ضرورت ورود آنیون‌ها با کانال هاست.
 - (۲) توجیه کننده ضرورت اخراج آنیون‌ها از سلول با کانال هاست.
 - (۳) توجیه کننده خروج آنیون‌ها از سلول با کانال هاست.
- ۳۸- کدام جمله در مورد حرکت پروتون و سنتز ATP در فرآیند میچل درست است؟
- (۱) ورود پروتون از استروم به روزن همراه با سنتز ATP در استروم است.
 - (۲) ورود پروتون به ماتریس همراه با سنتز ATP در ماتریس است.
 - (۳) خروج پروتون از روزن به استروم همراه با سنتز ATP در استروم است.
 - (۴) ورود پروتون به فضای بین غشایی همراه با سنتز ATP در ماتریس است.
- ۳۹- کدام گروه از کانال‌های زیر به کانال‌های غیر انتخابی کاتیونی (NSCCs) متعلق است؟
- (۱) کانال‌های شیکر
 - (۲) کانال‌های KCO
 - (۳) FV و SV ها
 - (۴) R-type و S-type
- ۴۰- آنیون‌ها / کاتیون‌ها برای ورود به سلول و واکوتل به ترتیب از چه مکانیسمی استفاده می‌کنند؟
- (۱) پادر / همبر و پادر / کانال
 - (۲) همبر / همبر و همبر / پادر
 - (۳) کانال / همبر و پادر / کانال

-۴۱

فرق بین کانال‌های شیکر (shaker) و KCO چیست؟

- ۱) کانال‌های شیکر حساس به ولتاژ غشائی بوده ولی به KCO غیرحساس می‌باشند.
- ۲) کانال‌های شیکر انتقال کاتیون‌ها ولی KCO انتقال آنیون‌ها را بر عهده دارند.
- ۳) کانال‌های شیکر انتقال K ولی KCO انتقال K و Na را بر عهده دارند.
- ۴) کانال‌های شیکر خروج K ولی KCO انتقال ورود K را بر عهده دارند.

-۴۲

ناقل نیترات NRT1 و NRT2 به ترتیب مسئول انتقال نیترات به شیوه‌های هستند.
 LATS/HATS و HATS (۲)
 HATS و LATS/HATS (۴)

-۴۳

چنانچه اختلاف پتانسیل الکتریکی غشاء منفی‌تر از میزان پیش‌بینی شده توسط پتانسیل نرنست (Nernst) باشد، ورود یک کاتیون به داخل سلول گیاهی به چه صورت انجام می‌شود؟
 ۱) فعال
 ۲) غیرفعال
 ۳) انتشار ساده
 ۴) ممانعت از ورود

-۴۴

سیستم‌های انتقال با تمایل بالا (HATS) برای جذب یک ماده دارای کدام ویژگی هستند؟
 ۱) پایین km (۲) بالا km
 ۳) ظرفیت بالای انتقال V_{max} (۴) پایین

-۴۵

ناقلین ABC:

- ۱) انتقال یون‌های H⁺ را از سیتوسول به فضای داخل اندامک‌ها تسهیل می‌کند.
- ۲) در غشای داخلی میتوکندری و کلرپلاست گیاهان عالی جای گرفته‌اند.
- ۳) باعث ورود اکسیgen و ترکیبات فنلی به واکوئل می‌شوند.
- ۴) در گیاهان و قارچ‌ها باعث انتقال ثانویه مواد از خارج به داخل سلول می‌شوند.

-۴۶

در مورد پمپ‌های Ca²⁺ - ATPase، گزینه صحیح، کدام است؟

- ۱) برخلاف پمپ‌های P-type وجود یک حد واسط فسفریله در آن‌ها هنوز اثبات نشده است.
- ۲) با حذف یک قطعه ۵۰ آمینو اسیدی در ناحیه N-ترمینال پمپ‌های نوع IIB فعالیت آن‌ها تا ۷۰٪ کاهش می‌یابد.
- ۳) کاربرد ارتووانادات از فعالیت هر دو نوع پمپ IIA و IIB ممانعت می‌کند.
- ۴) پمپ‌های نوع ER-type IIA حساس به کالmodولین بوده و انعطاف‌پذیری آن طی فعالیت تغییر می‌کند.

-۴۷

در غشاء پلاسمایی سلول‌های روزنه نقش کدام یک مهم است؟

- ۱) کانال‌های S-type واکوئلی که قادر به تشخیص کاتیون‌های تک ظرفیتی نیستند.
- ۲) کانال‌های R-type کاتیونی که در تمام مدت تحریک باز می‌مانند.
- ۳) کانال‌های R-type آنیونی که به سرعت باز و بسته می‌شوند.
- ۴) کانال‌های S-type آنیونی که وابسته به تغییرات ولتاژ هستند.

-۴۸

در ساختمان مولکولی آکواپورین‌ها:

- ۱) تراالف حفاظت شده NPA در بین حلقه ۵-۴ و ۳-۲ قرار دارد.
- ۲) سرین در دو جایگاه ۱۱۵ و ۲۷۴ محل تنظیم دفسفریلاسیون است.
- ۳) عمل تنظیم فعالیت به وسیله یک پروتئین کیناز سیتوسلی وابسته به Ca²⁺ انجام می‌شود.
- ۴) گلوتامات در رشته‌های ۱ و ۴ جایگاه اثر مهاری جیوه است.

-۴۹

ناقل Nramp3 در:

- ۱) غشاء سلول است و موجب ورود آهن به سلول می‌شود.
- ۲) تونوپلاست است و موجب ورود آهن از سیتوپلاسم به واکوئل می‌شود.
- ۳) تونوپلاست است و موجب خروج آهن از سیتوپلاسم به آپوپلاست می‌شود.
- ۴) تونوپلاست است و موجب خروج آهن از واکوئل به سیتوپلاسم می‌شود.

- ورود کلسیم به سیتوسول و خروج آن از سیتوسول به ترتیب:
- ۱) از طریق پمپ‌ها و از طریق کانال‌ها می‌باشد.
 - ۲) از طریق کانال‌ها و فقط از طریق پمپ‌ها می‌باشد.
 - ۳) از طریق کانال‌ها و پمپ کلسیم و پادبرها است.
 - ۴) از طریق پادبرها و از طریق پمپ‌ها است.

-۵۰

فعالیت پمپ $H^+ - ATPase$ موجود در وابسته است.

- ۱) غشاء سلول به کوفاکتورهای Mg و K
- ۲) غشاء واکوئل به کوفاکتورهای Na و Mg
- ۳) غشاء واکوئل به کوفاکتورهای Ca و K

-۵۱

کدام عبارت درباره منطقه تخلیه در اطراف ریشه صحیح است؟

- ۱) منطقه تخلیه یون‌های غیرمتحرک بزرگ‌تر از منطقه تخلیه یون‌های متحرک است.
- ۲) منطقه تخلیه یون‌های متحرک کوچک‌تر از منطقه تخلیه یون‌های غیرمتحرک است.
- ۳) منطقه تخلیه یون نیترات بزرگ‌تر از منطقه تخلیه یون فسفات است.
- ۴) منطقه تخلیه یون فسفات بزرگ‌تر از منطقه تخلیه یون نیترات است.

-۵۲

باربرداری پتانسیم از آوند چوبی توسط کدام یک از کانال‌ها انجام می‌شود؟

- ۱) KORC (۴)
- ۲) NORC (۳)
- ۳) KIRC (۲)
- ۴) NIRC (۱)

-۵۳

کدام گزینه در مورد نقش اینورتاز در بافت‌های مصرف‌کننده (sink) صادق است؟

- ۱) فعالیت آن در بارگیری تاثیری ندارد.
- ۲) pH اسیدی باعث کاهش فعالیت آن می‌شود.
- ۳) افزایش فعالیت آن مانع از بازگشت سوکروز به لوله غربالی می‌شود.
- ۴) باعث بازگشت هگزوزهای حاصل از تجزیه سوکروز به لوله غربالی می‌شود.

-۵۴

کدام ترکیب از بازدارنده‌های اختصاصی V-ATPase است؟

- ۱) اولیگومایسین (۱)
- ۲) سدیم آزید (۲)
- ۳) مولیبدات (۳)
- ۴) نیترات (۴)

-۵۵

بخش ankyrin در C ترمینال کانال‌های پتانسیم AKT

- ۱) در شرایط کاهش پتانسیم فسفریله می‌شود.
- ۲) در شرایط افزایش پتانسیم فسفریله می‌شود.
- ۳) در شرایط کاهش پتانسیم تغییری نمی‌کند.
- ۴) در شرایط افزایش پتانسیم دفسفریله می‌شود.

-۵۶

کدام گزینه در مورد چگونگی فعال شدن و ساختار آکواپورین‌ها صحیح است؟

- ۱) فسفریلاسیون اسید آمینه پرولین و هموترامری
- ۲) فسفریلاسیون اسید آمینه سرین و هموترامری
- ۳) فسفریلاسیون اسید آمینه سرین و هتروترامری
- ۴) فسفریلاسیون اسید آمینه سرین و هتروترامری

-۵۷

بخش‌های حفاظت شده موجود در C ترمینال کانال‌های خروجی پتانسیم، کدام است؟

- ۱) بخش EF1 در C ترمینال کانال
- ۲) بخش EF1 در N ترمینال کانال
- ۳) بخش‌های EF1 و EF2 در C ترمینال کانال
- ۴) بخش‌های EF1 و EF2 در N ترمینال کانال

-۵۸

برهم کنش بین زیر واحدهای کانال‌های ورودی پتانسیم (K_{in}) از طریق بخش ترمینال کانال است.

- ۱) در بخش C (۲)
- ۲) در بخش N (۳)
- ۳) در بخش cNBD (۴)
- ۴) در بخش K_{HA} (۱)

-۵۹

جایگاه حساس به pH آپوپلاستی در کانال‌های ورودی پتانسیم

- ۱) باقیمانده آلانین است.
- ۲) باقیمانده پرولین است.
- ۳) باقیمانده آسپارتات است.
- ۴) باقیمانده هیستیدین است.

-۶۰

رابطه بین پتانسیل فشار و کشش سطحی، کدام است؟

$$\Psi_p = 2 \frac{T}{r} \quad (4) \qquad \Psi_p = \frac{T}{r} \quad (3) \qquad \Psi_p = -\frac{T}{r} \quad (2) \qquad \Psi_p = -2 \frac{T}{r} \quad (1)$$

-۶۱

-۶۲

در مورد فعال سازی آنزیم ها توسط نور آبی کدام مورد صحیح است؟

- ۱) پروتئین فسفاتازها موجب فسفریله شدن پمپ پروتونی تیپ P در سلول های محافظ روزنه می شود.
- ۲) پروتئین کینازها موجب فسفریله شدن پمپ پروتونی تیپ P در سلول های محافظ روزنه می شود.
- ۳) پروتئین کینازها موجب فسفریله شدن پمپ پروتونی تیپ V در سلول های محافظ روزنه می شود.
- ۴) پروتئین فسفاتازها موجب فسفریله شدن پمپ پروتونی تیپ V در سلول های محافظ روزنه می شود.

-۶۳

در دیواره سلول های مزو فیلی برگ در شرایط هوای خشک با کاهش شعاع احناء سطح آب فشار هیدرواستاتیک چه تغییری می کند؟

- ۱) منفی تر می شود.
- ۲) بیشتر می شود.
- ۳) ثابت تر می شود.
- ۴) تغییری نمی کند.

-۶۴

پمپ های عناصر سنگین (heavy metal ATPase):

- ۱) در سلول های گیاهی وجود ندارند.
- ۲) موجب ورود عناصر سنگین به اندامک های درون سلولی می شوند.
- ۳) موجب خروج عناصر سنگین از اندامک های درون سلولی می شوند.
- ۴) موجب انتقال عناصر سنگین همراه با انتقال پروتون می شوند.

-۶۵

ناقل (CDF) موجب کدام مورد می شود؟

- ۱) خروج کاتیون های روی، کبالت و کادمیوم از واکوئل
- ۲) ورود کاتیون های روی، کبالت و آهن به گلری
- ۳) ورود کاتیون های روی، کبالت، آهن، کادمیوم، نیکل و منگنز به سیتوزول
- ۴) خروج کاتیون های روی، کبالت، آهن، کادمیوم، نیکل و منگنز از سیتوزول

-۶۶

سولفیت ردوکتاژ برای فعالیت به کدام ترکیب نیاز دارد؟

- ۱) NADPH
- ۲) فردوكسین
- ۳) کوازنیم A
- ۴) گلوتاتیون

-۶۷

مهمنترین جزء نیروی محرك پروتون در کلروپلاست و در میتوکندری کدام است؟

- ۱) در کلروپلاست $\Delta p\text{H}$ و در میتوکندری ΔE
- ۲) در کلروپلاست ΔE و در میتوکندری $\Delta p\text{H}$
- ۳) در هر دو $\Delta p\text{H}$ و ΔE

-۶۸

آنژیم استیل سرین لیاز در متابولیسم کدام عنصر شرکت می کند و گروه پروستتیک آن چیست؟

- ۱) نیتروژن - تیامین پیروفسفات
- ۲) COA
- ۳) گوگرد - تیامین پیروفسفات
- ۴) نیتروژن - COA

-۶۹

کدام گزینه صحیح است؟

- ۱) آنزیم نیتروژن اثر کاتالیزوری بر روی نیتروژن مولکولی ندارد.
- ۲) استیل، آزید و اکسید نیترو تو سط نیتروژن احیا می شوند.
- ۳) در بین ترکیبات دارای پیوند سه گانه منحصرآ نیتروژن مولکولی تو سط نیتروژن احیا می شود.
- ۴) اکسید گوگرد، هیدروژن سیانید و نیتروژن مولکولی تو سط نیتروژن احیا می شود.

-۷۰

مسیر موالونات - استات:

- ۱) تنها مسیر بیوسنتزی ایزوپرن در سلول گیاهی نیست.
- ۲) تنها مسیر بیوسنتزی تولید ایزوپرن در سلول گیاهی است.
- ۳) یکی از مسیرهای متعدد تولید ایزوپرن در سیتوزول سلول گیاهی است.
- ۴) یکی از مسیرهای متعدد تولید ایزوپرن در کلروپلاست سلول های برگی است.

-۷۱

کدام یک از آنزیم های گلیکولیز و اکنیش های برگشت پذیر را کاتالیز می کند؟

- ۱) پیرووات کیناز
- ۲) فسفوفروکتوکیناز
- ۳) فسفو گلیسرات موتاز
- ۴) هگزو کیناز

- | | |
|---|------------|
| <p>تبدیل ریبیولوز -۵ فسفات به گزیلولوز -۵ فسفات در چرخه کالوین توسط چه نوع آنزیمی کاتالیز می‌شود؟</p> <p>(۱) اپی مراز (۲) ایزومراز (۳) ترانس کتولاز (۴) موتاز</p> | <p>-۷۲</p> |
| <p>کدام یک از ترکیبات زیر به عنوان کوفاکتور آنزیمهای کربوکسیل مشارکت دارند، عمل می‌کنند؟</p> <p>(۱) کوانزیم A (۲) تراهیدروفولات (۳) بیوسیتین (کمپلکس بیوتین - لیزین) (۴) کربوکسی آدنوزیل کوبالامین</p> | <p>-۷۳</p> |
| <p>مسئول اصلی ماهیت آناپلروتیک چرخه کربس کدام آنزیم است؟</p> <p>(۱) سوکسینات سنتاز (۲) PEP کربوکسیلاز (۳) ملات دهیدروژنаз (۴) ملات سنتاز</p> | <p>-۷۴</p> |
| <p>کدام آنزیم شکستن سوکروز را در بافت‌های فتوسنتزی کاتالیز می‌کند؟</p> <p>(۱) سوکروز سنتاز (۲) سوکروز فسفاتاز (۳) سوکروز فسفات سنتاز (۴) UDP- گلوکز پیروفسفریلاز</p> | <p>-۷۵</p> |
| <p>ورود کربن به چرخه سیتریک اسید توسط کدام آنزیم کاتالیز می‌شود؟</p> <p>(۱) ایزوسیترات دهیدروژناز (۲) پیرووات دهیدروژناز (۳) ملات دهیدروژناز (۴) NAD - مالیک آنزیم</p> | <p>-۷۶</p> |
| <p>کدام واکنش <u>نمی‌تواند</u> در کاربoplast انجام شود؟</p> <p>(۱) سنتز اسیدهای چرب (۲) بیوسنتز آمینو اسیدها (۳) سنتز ساکاروز (۴) همانندسازی نیترات</p> | <p>-۷۷</p> |
| <p>کدام یک از کمپلکس‌های زنجیره تراپری الکترون میتوکندریائی در ترابری پروتون‌ها از ماتریکس به فضای بین غشائی میتوکندری شرکت <u>نمی‌کند</u>؟</p> <p>(۱) IV (۲) III (۳) II (۴) I</p> | <p>-۷۸</p> |
| <p>کدام عبارت درباره گریز راه گلی اکسالات صحیح نیست؟</p> <p>(۱) استیل کوانزیم A حاصل از β-اکسیداسیون اسیدهای حرب باعث به راه افتادن این مسیر می‌شود.</p> <p>(۲) در حضور آنزیم ملات سنتاز، گلی اکسالات با استیل کوانزیم A ترکیب می‌شود.</p> <p>(۳) سوکسینات حاصل از این چرخه از پراکسی زوم خارج وارد میتوکندری می‌شود.</p> <p>(۴) گلی اکسالات حاصل از این چرخه می‌تواند وارد میتوکندری شود.</p> | <p>-۷۹</p> |
| <p>در رابطه با واکنش مرتبه اول (First order) یک منحنی اشباع گهراهای میکائیل - مانتن کدام مورد صحیح است؟</p> <p>(۱) $V = V_{max}$ و $[s] \gg K_M$ (۲) $V = \frac{V_{max}}{2}$ و $[s] = K_M$ (۳) $V = \frac{[s] \cdot V_{max}}{K_M}$ و $[s] \ll K_M$ (۴) $V = V_{max}$ و $[s] \ll K_M$</p> | <p>-۸۰</p> |
| <p>کدام یک از ترکیبات زیر نوعی ویتامین K در گیاهان می‌باشد و در چه فرایندی نقش دارد؟</p> <p>(۱) K_1 - فتوسنتز (۲) متاکوئینون - کربوکسیلاسیون آمینو اسیدها (۳) K_3 - کربوکسیلاسیون آمینو اسیدها (۴) فیلوكوئینون - تغییرات پس ترجمه‌ای پروتئین‌ها</p> | <p>-۸۱</p> |
| <p>ترانس آمینازها برای فعالیت به کدام یک از کوفاکتورهای زیر نیاز دارند؟</p> <p>(۱) FAD (۲) FMN (۳) پیریدوکسال فسفات (۴) تیامین پیروفسفات</p> | <p>-۸۲</p> |
| <p>تشکیل بازشیف در جایگاه فعال کدام آنزیم در کاتالیز واکنش نقش دارد؟</p> <p>(۱) اکسیدوردوکتازاها (۲) ترانس آمینازها (۳) لیازها (۴) لیگازها</p> | <p>-۸۳</p> |
| <p>کدام یک از پروتئین‌های زیر به عنوان حسگر تغییرات غلظت کلسیم سیتوسولی در سلول‌های گیاهی عمل می‌کنند؟</p> <p>(۱) کاینزن A (۲) کلسی نورین (۳) پروتئین‌های مشابه کلسی نورین B (۴) کلسیم - کالمودولین کینازها</p> | <p>-۸۴</p> |

- ۸۵ اتصال یک اثرکننده مثبت و منفی به یک آنزیم آلستریک به ترتیب شکل منحنی سینتیک اشباع گهرمایه‌ای آن را به چه شکلی تغییر می‌دهد؟
- ۱) خطی - هذلولی
 - ۲) سیگموئیدی‌تر - هذلولی
 - ۳) هذلولی - خطی
 - ۴) هذلولی - سیگموئیدی‌تر
- ۸۶ تنظیم درشت در شبکه‌های متابولیسمی چگونه انجام می‌شود؟
- ۱) تنظیم بیوسنتر آنزیم‌ها در مراحل بیان ژن
 - ۲) کدهبندی فعالیت آنزیم‌ها
 - ۳) کنترل سینتیکی فعالیت آنزیم‌ها
- ۸۷ آنزیم ساکارز فسفات سنتاز چگونه تنظیم می‌شود؟
- ۱) گلوکز ۶ فسفات بازدارنده پروتئین فسفاتاز و P_i بازدارنده پروتئین کیناز است.
 - ۲) فروکتوز ۱ و ۶ - بیس فسفاتاز سیتوسالی توسط سیستم تیوردوکسین تنظیم می‌شود، ولی تحت تأثیر فروکتوز ۲ و ۶ - بیس فسفات و AMP تنظیم نمی‌شود.
 - ۳) این آنزیم در نور توسط پروتئین کیناز در باقیمانده سرین اختصاصی فسفریلی و فعال و در تاریکی با پروتئین فسفاتاز غیرفعال می‌گردد.
 - ۴) این آنزیم در تاریکی توسط پروتئین کیناز در باقیمانده سرین اختصاصی فسفریلی و فعال و در نور با پروتئین فسفاتاز غیرفعال می‌گردد.
- ۸۸ کدام یک از تعاریف زیر برای تنظیم آلستریک جورگرا (هموتروپیک) یک آنزیم چند زیر واحدی صحیح است؟
- ۱) اتصال یک مولکول به یک آنزیم چند زیر واحدی سبب تسهیل اتصال همان مولکول به زیر واحدهای دیگر آنزیم می‌شود.
 - ۲) اتصال یک اثرکننده مثبت به یک آنزیم چند زیر واحدی سبب تسهیل اتصال گهرمایه به زیر واحدهای دیگر می‌شود.
 - ۳) اتصال یک اثرکننده منفی به یک آنزیم چند زیر واحدی سبب تسهیل اتصال گهرمایه به زیر واحدهای دیگر می‌شود.
 - ۴) اتصال یک مولکول به یک آنزیم چند زیر واحدی سبب تسهیل اتصال مولکول دیگری به زیر واحدهای دیگر آنزیم می‌شود.
- ۸۹ در یک آنزیم رابطه بین تغییرات غلظت گهرمایه و سرعت واکنش سیگموئیدی است بنابراین:
- ۱) در ارزیابی سینتیک اشباع جایگاه‌های اتصال ضریب هیل برابر صفر است.
 - ۲) اتصال گهرمایه به جایگاه اتصال مستقل از اثرکننده می‌باشد.
 - ۳) جایگاه‌های اتصال گهرمایه متعدد و اتصال به طور مستقل با سرعت متفاوت صورت می‌گیرد.
 - ۴) جایگاه‌های اتصال گهرمایه متعدد و رابطه بین آن‌ها تعاونی است.
- ۹۰ در رابطه با کنترل آلستریکی فعالیت آنزیمی کدام گزینه درست است؟
- ۱) اغلب اثرکننده‌های آلستریک با تغییر K_m ، مقدار V_{max} را نیز متأثر می‌سازند.
 - ۲) رقابت بین گهرمایه و بازدارنده روی میزان تجزیه کمپلکس ES به فراورده بی تأثیر است.
 - ۳) بازدارنده آنزیم‌های آلستریک میل ترکیبی جایگاه اتصال گهرمایه را برای گهرمایه تغییر می‌دهند.
 - ۴) مکانیسم اثر یک بازدارنده آلستریک نوع K شبیه بازدارنده‌های غیررقابتی است.
- ۹۱ مکانیسم واکنش ترانس آمینازی:
- ۱) از نوع کاتورهای است، توالی اتصال گهرمایه و جدا شدن فراورده تصادفی است.
 - ۲) از نوع پینگ پونگ است و کوآنزیم B_6 موجب تسهیل جدا شدن گروه آمینو و آزادسازی کتواسید می‌گردد.
 - ۳) از نوع ترتیبی است ابتدا آمینو اسید و سپس مشتق کتواسید به جایگاه فعال متصل می‌شوند.
 - ۴) از نوع کاتورهای $Bi-Bi$ است و در طول واکنش دو بار بازشیف ساخته می‌شود.
- ۹۲ کدام یک از آنزیم‌های زیر توسط سیستم تیوردوکسین تنظیم نمی‌شوند؟
- ۱) روپیسکواکتیواز
 - ۲) NADP مالات دهیدروژناز
 - ۳) فروکتوز ۶ فسفات کیناز
 - ۴) فنیل آلانین آمونیا لیاز (PAL)
- ۹۳ کدام آنزیم توسط پردازش پروتئولیتیک فعال می‌شود؟
- ۱) تریپسینوژن
 - ۲) روپیسکواکتیواز
 - ۳) فسفوگلیسرات کیناز
 - ۴) NAD(P) گلیسرآلدئید ۳ فسفات دهیدروژناز

-۹۴

به طور طبیعی غلظت کلسیم در سیتوسول چقدر است و چگونه افزایش می‌یابد؟

- (۱) در حد میکرومولار است و در نتیجه باز شدن کانال‌های کلسیمی واکوئلی افزایش می‌یابد.
- (۲) در حد نانومولار است و باز شدن کانال‌های کلسیمی غشاء پلاسمایی از آپولاسم وارد سیتوسول می‌شود.
- (۳) در حد میکرومولار است و عمدتاً توسط همبیری با پروتون از واکوئل خارج می‌شود.
- (۴) در حد نانومولار است و افزایش آن از طریق شبکه آندوپلاسمی تأمین می‌شود.

-۹۵

کدام گزینه در مورد فیتوکروم (Pfr) و فعالیت بیولوژیکی آن صحیح نیست؟

- (۱) فسفریلی شدن فیتوکروم فعالیت بیولوژیکی آن را کم می‌کند.
- (۲) Pfr با تأثیر بر کانال‌های کلسیمی غشاء پلاسمایی میزان Ca سیتوسولی را افزایش می‌دهد.
- (۳) Pfr دارای فعالیت پروتئین کینازی است و موجب فسفریلی شدن پروتئین‌های هسته‌ای می‌شود.
- (۴) یک مکانیسم پس خوردی منفی در تنظیم فعالیت فیتوکروم توسط Ca وجود دارد.

-۹۶

کدام نوع از پروتئین کینازهای زیر منحصر به گیاهان هستند؟

- (۲) پروتئین کینازهای وابسته به cAMP
- (۴) پروتئین کینازهای وابسته به کلسیم
- (۳) پروتئین کینازهای وابسته به فسفولیپید

-۹۷

گلوتامین سنتاز باکتریایی در کدام یک از سطوح زیر تنظیم نمی‌شود؟

- (۱) در سطح رونویسی
- (۲) از طریق واژگردی اکسیداتیو mRNA
- (۴) در سطح پایداری
- (۳) بازدارندگی ته فراورده‌ای جمع شونده

-۹۸

در متابولیسم گلیکوژن آنزیم فسفریلаз (ا) کیناز چگونه فعال می‌شود؟

- (۱) توسط G پروتئین‌ها
- (۲) فسفریلی شدن توسط یک کیناز وابسته به cAMP
- (۳) بی فسفریلی شدن توسط یک فسفاتاز اختصاصی
- (۴) فسفریلی شدن زیر واحدهای α و β توسط یک کیناز وابسته به Ca

-۹۹

تنظیم ردوکس آنزیم ATP سنتاز کلروپلاستی، بر روی کدام زیرواحدهای آن انجام می‌شود؟

- (۱) زیرواحدهای بتا (β)
- (۲) زیرواحدهای متحرک گاما (γ)
- (۳) زیرواحدهای متحرک موجود در پایه آنزیم
- (۴) زیرواحدهای متحرک اپسیلون (ϵ)

-۱۰۰

کدام گزینه در مورد آنزیم فسفوفروکتوکیناز وابسته به پیروفسفات درست نیست؟

- (۱) پیروفسفات‌های القاکننده فرم دیمری آنزیم و افزایش فعالیت آن در مسیر گلوکونوکوتوز است.
- (۲) این آنزیم واکنش دو طرفه تبدیل فروکوتوز ۶ فسفات به فروکوتوز ۱ و ۶ بیس فسفات را کاتالیز می‌کند.
- (۳) فروکوتوز ۲ و ۶ بیس فسفات‌های القاکننده فرم دیمری آنزیم و افزایش فعالیت آن در مسیر گلیکولیز است.
- (۴) فعالیت فرم تترامری آنزیم بیشتر از فرم دیمری آن است.