

259

F

نام:

نام خانوادگی:

محل امضا:

259F

صبح جمعه
۱۳۹۵/۱۲/۶
دفترچه شماره (۱)



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.
(ام خمینی (ره))

آزمون ورودی
دوره دکتری (نیمه‌تمیز) داخل - سال ۱۳۹۶

رشته امتحانی علوم جانوری - فیزیولوژی جانوری (کد ۲۲۲۳)

مدت پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سوال: ۱۰۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی (فیزیولوژی جانوری - بیوشیمی - زیست‌شناسی سلولی و مولکولی - فیزیولوژی سیستم عصبی مرکزی - فیزیولوژی غشاء سلولی)	۱۰۰	۱۰۰

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

اسقندماه - سال ۱۳۹۵

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تماشی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با متخلفین برای مقررات رفتار می‌شود.

فیزیولوژی جانوری:

- ۱ مؤثرترین عامل ایجاد اثر هالدان در سطح ریه کدام است؟
- (۱) فشار اکسیژن آلوئولی
 - (۲) فشار اکسیژن سطح بافت
 - (۳) فشار نیتروژن هوای حبابچه
 - (۴) فشار CO_2 سطح بافت
- ۲ به کدام علت به دنبال تحریک عصب واگ، ضربان قلب کاهش می‌یابد؟
- (۱) افزایش نفوذپذیری سلول‌های گره سینوسی - دهلیزی به سدیم
 - (۲) افزایش نفوذپذیری سلول‌های گره سینوسی - دهلیزی به کلسیم
 - (۳) کاهش نفوذپذیری سلول‌های گره سینوسی - دهلیزی به سدیم
 - (۴) کاهش نفوذپذیری سلول‌های گره سینوسی - دهلیزی به کلسیم
- ۳ کدام عبارت در مورد MSH صحیح است؟
- (۱) از هورمون‌های بخش میانی هیپوتالاموس بوده و در تغییر رنگ ماهی نقش دارد.
 - (۲) از هورمون‌های بخش میانی آدنوهیپوفیز بوده و در انتشار ملانوفورها نقش دارد.
 - (۳) از هورمون‌های بخش قدرامی هیپوفیز بوده و تحریک کننده بلوغ می‌باشد.
 - (۴) از نوروهورمون‌های بخش قدرامی هیپوفیز بوده و در تجمع ملانوفورها نقش دارد.
- ۴ در صورت کمبود شدید فسفات در بدن، سطح کدام مورد افزایش می‌یابد؟
- (۱) فسفات ادرار
 - (۲) PTH
 - (۳) دی‌هیدروکسی پرگنولون
 - (۴) ۱ و ۲۵ - دی‌هیدروکسی - و بتامین D
- ۵ در مورد رفلکس‌های عضلانی کدام مورد صحیح است؟
- (۱) رفلکس کششی از نوع رفلکس‌های چند سیناپسی است.
 - (۲) پایانه‌های حسی اولیه در رشته‌های عضلانی بیرون و درون دوکی قرار دارند.
 - (۳) تحریک گیرنده‌های تاندونی موجب رفلکس کششی معکوس می‌شود.
 - (۴) تحریک نورون‌های حرکتی گاما موجب انقباض رشته‌های خارج دوکی می‌شود.
- ۶ موج QRS در الکتروکاردیوگرام مربوط به کدام است؟
- (۱) انقباض بطن‌ها و انبساط دهلیزها
 - (۲) انقباض دهلیزها و انبساط بطن‌ها
 - (۳) دپلاریزاسیون دهلیزها و رپلاریزاسیون بطن‌ها
 - (۴) رپلاریزاسیون دهلیزها و دپلاریزاسیون بطن‌ها
- ۷ مسئول تحریک ترشح کورتیزول از غدد فوق‌کلیوی کدام است؟
- (۱) GnRH و MCH
 - (۲) CRH و ACTH
 - (۳) TGF و TSH
 - (۴) FSH و MSH
- ۸ عملکرد معیوب از کدام قسمت باعث آشالازی «Achalasia» می‌شود؟
- (۱) اتساع دریچه پیلوو
 - (۲) انسداد مجرای کلدوك
 - (۳) افزایش تonus اس芬کتر اووی
 - (۴) تonus شدید اس芬کتر مرموی - معدی
- ۹ کدام ناحیه بر روی رفلکس‌های کششی عضلات اسکلتی اثر تحریکی دارد؟
- (۱) هسته‌های قاعده‌ای
 - (۲) هسته دهلیزی
 - (۳) هسته فوق کیاسماپی
 - (۴) دوبرجستگی تحتانی از برجستگی‌های چهارگانه

- ۱۰- گاز **NO** (Nitric Oxide) از طریق، موجب کاهش عروق خونی می‌شود.
- (۱) فعال کردن آندوتیلیوم - مقاومت
 - (۲) فعال کردن گوانیلیل سیکلаз - مقاومت
 - (۳) شل کردن عضلات صاف - نفوذپذیری
 - (۴) مهار آنزیم آدنیلیل سیکلаз - مقاومت
- ۱۱- در اثر تحریک شبکه عصبی زیر مخاطی، کدام عامل تقویت می‌شود؟
- (۱) حركات معدی
 - (۲) ترشحات روده
 - (۳) ترشحات روده
- ۱۲- کدام ترکیب باعث تولید بالاترین مقدار ترشح بیکربنات لوز المعده می‌شود؟
- (۱) سکرتین و واگ
 - (۲) سکرتین و هیستامین
 - (۳) کوله سیستوکینین و استیل کولین
 - (۴) گاسترین و واگ
- ۱۳- در شب میزان هورمون‌های ملاتونین و سرتونین به ترتیب و می‌رود.
- (۱) بالا و بالا
 - (۲) پایین و پایین
 - (۳) بالا و پایین
 - (۴) پایین و بالا
- ۱۴- پیام‌های کدام حس پیکری از طریق ستون‌های پشتی نخاع به مغز می‌رود؟
- (۱) درد
 - (۲) سرما
 - (۳) گرما
 - (۴) لامسه دقیق
- ۱۵- عامل افزایش گنادوتروپین‌ها (LH و FSH) در روزهای آخر سیکل جنسی ماده کدام است؟
- (۱) افزایش میزان استروژن و پروژترون
 - (۲) کاهش میزان استروژن و پروژترون
 - (۳) فیدبک منفی پروژترون

پیشیمی:

- ۱۶- از یک اسید چرب با تعداد کرین زوج (۲n) در طی واکنش‌های اکسیداسیون، چند مولکول استیل کوآ تولید می‌گردد؟
- $$n \xrightarrow{\text{O}_2} \frac{n}{2} \text{ (۳)} \quad n-2 \text{ (۲)} \quad n-1 \text{ (۱)}$$
- ۱۷- کدام ایزوآنزیم هگزوکیناز (HK)، تحت تأثیر هورمون انسولین می‌باشد؟
- (۱) نوع I (HK_I)
 - (۲) نوع II (HK_{II})
 - (۳) نوع III (HK_{III})
 - (۴) نوع IV موسوم به گلوکوکیناز (GK)
- ۱۸- کدام مورد، پروتئین شاخص HDL می‌باشد؟
- (۱) ApoB₄₈
 - (۲) ApoD
 - (۳) ApoC₁
 - (۴) ApoE
- ۱۹- هورمون ملاتونین مشتقی از کدام آمینو اسید است؟
- (۱) تیروزین
 - (۲) تریپتوفان
 - (۳) گلوتامات
 - (۴) هیستیدین
- ۲۰- در ساختمان کدام کوآنزیم مشتق قند پنج کربنی ریبوز به نام ریبیتول (ribitol) به کار رفته است؟
- (۱) NADPH
 - (۲) FMN
 - (۳) کوازنیم آ
 - (۴) پیریدوکسال (pyridoxal)
- ۲۱- باز خالص فسفاتیدیل کولین، کدام است؟
- (۱) خنثی
 - (۲) دارای ۱ بار مثبت
 - (۳) دارای ۲ بار منفی

- ۲۲- کدام جمله در مورد پوکرینگ قندها در DNA صحیح می‌باشد؟
 ۱) در A-DNA پوکرینگ قند C^{2'}-endo است. ۲) در B-DNA پوکرینگ قند C^{2'}-endo است.
 ۳) در A-DNA پوکرینگ قند C^{3'}-exo است. ۴) در B-DNA پوکرینگ قند C^{3'}-endo است.
- ۲۳- کدام اسید آمینه، تمایل کمتری برای حضور در مارپیچ آلفا دارد؟
 ۱) آلانین ۲) گلوتامین
 ۳) میتوئین ۴) گلیسین
- زیست‌شناسی سلولی و مولکولی:
- ۲۴- انتظار می‌رود که سلول‌های سازنده عدد برازقی، محتوى مقدار نسبتاً زیادی از کدام بخش باشند؟
 ۱) میتوکندری ۲) پراکسی‌زوم
 ۳) شبکه اندوبلاسمی زیر (rER) ۴) لیزوژوم
- ۲۵- ترانسلوکاز نام انزیمی کدام فاکتور پروتئینی در فرآیند ترجمه است?
 Tu (۱) G (۱)
 II_r (۴) Ts (۳)
- ۲۶- در مورد **(Bip) Binding protein** کدام مورد صحیح است؟
 ۱) از اجزای گیرنده SRP است.
 ۲) به ترادفهای سیگنال پروتئین‌ها متصل می‌شود.
 ۳) موجب تسهیل بسته‌بندی پروتئین‌ها در لومن ER می‌گردد.
 ۴) چاپرونی از دسته Hdp60 می‌باشد.
- ۲۷- در مرگ برنامه‌ریزی شده سلول، کدام پروکاسپار با خروج سیتوفرم C از میتوکندری آسیب دیده و تشکیل Apoptosome نموده است؟
 ۱) پروکاسپار ۲ ۲) پروکاسپار ۶
 ۳) پروکاسپار ۸ ۴) پروکاسپار ۹
- ۲۸- نقش آنزیم **DNA پلیمراز III** کدام است؟
 ۱) در یوکاریوت‌ها آسیب واردہ به DNA را تصحیح و ترمیم می‌کند.
 ۲) در پروکاریوت‌ها هر دو زنجیره رهبر و پیرو را همانندسازی می‌کند.
 ۳) در پروکاریوت‌ها و یوکاریوت‌ها فقط رشته رهبر را همانندسازی می‌کند.
 ۴) در پروکاریوت‌ها و یوکاریوت‌ها پرایمر را حذف می‌کند.
- ۲۹- rRNA های ۲۳S و ۵S به ترتیب در کدام زیر واحدهای ریبوزومی شرکت دارند?
 ۱) ۵۰S و ۳۰S ۲) ۴۰S و ۶۰S
 ۳) ۶۰S و ۵۰S ۴) ۵۰S و ۶۰S
- ۳۰- کدام اندمک غشاء‌دار سیتوپلاسمی در سلول‌های کبدی دارای آنزیم‌های کاتالاز، آنزیم‌های بتاکسیداسیون چربی‌ها و اوریکاز است؟
 ۱) پراکسی‌زوم ۲) گلی‌اکسیزوم
 ۳) میتوکندری ۴) لیزوژوم

فیزیولوژی سیستم عصبی مرکزی:

- ۳۱- از ویزگی‌های مخچه دهلیزی یا لوب فلوکولوندولر کدام است؟
- (۱) همکاری با قشر مخ در حفظ تعادل
 - (۲) کنترل تعادل حرکات اکتسابی
 - (۳) جدیدترین بخش مخچه
 - (۴) قدیمی‌ترین بخش مخچه
- ۳۲- کدام مورد از نتایج آسیب نورون حرکتی فوقانی در مسیر راه‌های پiramidal (هرمی) است؟
- (۱) تشدید رفلکس کششی عضلات
 - (۲) فلچ ریزید - فاسیکولاپسیون
 - (۳) فلچ شل - آتروفی عضلانی
 - (۴) هیپرتونی و بروز علامت بابینسکی
- ۳۳- کدام لوب مغزی در عمق شیار سیلویوس قرار دارد؟
- (۱) آهیانهای Insula Lobe
 - (۲) گزیرهای Temporal Lobe
 - (۳) سینگولی Cingulate Lobe
 - (۴) گیجگاهی
- ۳۴- کدام میانجی عصبی در تقویت درازمدت عصبی (LTP) دخالت بیشتری دارد؟
- (۱) استیل کولین (Ach)
 - (۲) گلایسین (Glycin)
 - (۳) نوراپی‌نفرین (NE)
 - (۴) نیتریک اکسید (NO)
- ۳۵- آتنوز، همی بالیسم و بیماری کره، به ترتیب ناشی از آسیب کدام عقده‌های قاعده‌ای مغز هستند؟
- (۱) پوتامن - ساب تalamوس - گلوبوس پالیدوس
 - (۲) ساب تalamوس - گلوبوس پالیدوس - پوتامن
 - (۳) گلوبوس پالیدوس - پوتامن - ساب تalamوس
 - (۴) گلوبوس پالیدوس - ساب تalamوس - پوتامن
- ۳۶- قنات سیلویوس در کدام قسمت مغز قرار گرفته است؟
- (۱) در بین بطن سوم و چهارم
 - (۲) در بین مخ و مخچه
 - (۳) در داخل و مرکز بطن‌های جانبی و بطن سوم
 - (۴) در بین بطن‌های جانبی و بطن سوم
- ۳۷- آفازی حسی (Sensory Aphasia) کدام است و ناشی از اختلال در چه ناحیه‌ای از مغز می‌باشد؟
- (۱) تکلم روان یاسلیس - بروکا
 - (۲) تکلم روان یاسلیس - ورنیکه
 - (۳) تکلم غیرروان - بروکا
 - (۴) تکلم غیرروان - ورنیکه
- ۳۸- کدام بخش، در ارتباط با عقده‌های قاعده‌ای، دارای نورون‌های دوپامینزئیک می‌باشد؟
- (۱) جسم مخطط
 - (۲) هسته ساب Talamous
 - (۳) بخش متراکم هسته جسم سیاه
 - (۴) گلوبوس پالیدوس
- ۳۹- کدام ریتم EEG از فعالیت ذاتی نورون‌های قشری منشأ می‌گیرد؟
- (۱) دلتا
 - (۲) بتا
 - (۳) تتا
 - (۴) آلفا
- ۴۰- کدام نوروترانسمیترها از اعصاب خودمختار ترشح می‌شوند؟
- (۱) استیل کولین - نوراپی‌نفرین
 - (۲) نیتریک اکساید - نوروپپتید Y
 - (۳) نوروپپتید Y - استیل کولین
 - (۴) استیل کولین - سوماتواستاتین

- ۴۱- کدام ناحیه هیپوپotalamus، در تنظیم دمای بدن نقش دارد؟
- (۲) هسته سوبرا اپتیک
 - (۴) هسته پری اپتیک
 - (۱) هسته قوسی
 - (۳) هسته پاراونتیکولار
- ۴۲- جسم سلولی نورون پس گرهی سمپاتیک چشم در کجا قرار دارد؟
- (۲) عقدة گردانی فوقانی
 - (۴) شاخ طرفی قطعه اول سینهای نخاع
 - (۱) عقدة مرجانی
 - (۳) هسته ادینگروستفال
- ۴۳- کدام یک از مواد میانجی زیر در کمپلکس مهارکننده درد در شاخ خلفی نخاع بیشتر است؟
- (۱) انکفالین
 - (۲) بتا اندورفین
 - (۳) دینورفین
 - (۴) دوپامین
- ۴۴- در آسپ لوب فلوکولوندولر مخچه کدام اختلال بارزتر است؟
- (۱) آناکسی
 - (۲) دیسمتری
 - (۳) دیسارتی (Dysarthria)
 - (۴) نیستاگموس مخچه‌ای
- ۴۵- فعالیت بیش از حدی که در برخی از نواحی مغز در طی خواب REM ایجاد می‌شود ناشی از فعالیت کدام فیبرها است؟
- (۱) استیل کولینی
 - (۲) دوپامینی
 - (۳) سروتونینی
 - (۴) نور اپی‌نفرینی
- ۴۶- کدام مورد درباره فیبرهای عصبی نوع B صحیح است؟
- (۱) مربوط به انتقال حس درد و فشار می‌باشد.
 - (۲) مربوط به رشته‌های عصبی پس‌عقده‌ای سمپاتیکی می‌باشد.
 - (۳) مربوط به رشته‌های عصبی پیش‌عقده‌ای سمپاتیکی می‌باشد.
 - (۴) سرعت هدایت پیام عصبی در آنها بیشتر از فیبرهای A_δ می‌باشد.
- ۴۷- کدام عبارت در مورد هسته‌های قاعده‌ای صحیح است؟
- (۱) تخریب جسم سیاه موجب کاهش استیل کولین هسته دمدار می‌شود.
 - (۲) فیبرهای ورودی از جسم سیاه به پوتامن گابا ارژیک است.
 - (۳) فیبرهای از جسم سیاه به جسم مخطط دوپامین‌زیک است.
 - (۴) فیبرهای ورودی از جسم سیاه به هسته دمدار گابا ارژیک است.
- ۴۸- اختلال در کدام مسیر هسته‌های قاعده‌ای سبب بیماری پارکینسون می‌شود؟
- (۱) بخش مشبكی جسم سیاه به استریاتوم
 - (۲) بخش مشبكی جسم سیاه به گلبیوس پالیدوس
 - (۳) بخش متراکم جسم سیاه به گلبیوس پالیدوس
 - (۴) بخش متراکم جسم سیاه به جسم مخطط
- ۴۹- به دنبال برخورد نور به شبکیه چه تغییری در سلول‌های استوانه‌ای به وجود می‌آید؟
- (۱) سلول‌های استوانه‌ای دپولاریزه می‌شوند.
 - (۲) سلول‌های استوانه‌ای هپرپولاریزه می‌شوند.
 - (۳) غلظت رودو پسین در داخل سلول زیاد می‌شود.
 - (۴) ورود سدیم به قطعه خارجی افزایش می‌یابد.
- ۵۰- کدام حس از مسیر ستون خلفی - نوار میانی منتقل می‌شود؟
- (۱) ارتعاش و حس‌های جنسی
 - (۲) حرارت و تماس خام
 - (۴) وضعی و ارتعاش
 - (۳) قلق‌لک و خارش

- ۵۱- کدام گیرنده حسی بسیار سریع تطابق می‌کند؟
 ۱) پاچینی و رافینی ۲) مایسنر و پاچینی
 ۳) مرکل و پاچینی ۴) مرکل و رافینی
- ۵۲- کدام هسته مستقیماً توسط خروجی‌های مخچه تحت کنترل قرار می‌گیرد؟
 ۱) زیتونی تحتانی ۲) دهیزی
 ۳) دسته منزوی ۴) قرمز
- ۵۳- تنظیم اعمال هموستانیک بدن به کدام قسمت مغز مربوط است؟
 ۱) مخچه ۲) تalamos
 ۳) هیپوتalamos ۴) هیپوکامپ
- ۵۴- در کجا نورون‌های تک قطبی کاذب دیده می‌شود؟
 ۱) شاخ پشتی نخاع
 ۲) شاخ شکمی نخاع
 ۳) گالکلیون ریشه پشتی نخاع
 ۴) ماده خاکستری اطراف قنات
- ۵۵- هسته زانویی جانبی در چه بخشی قرار دارد و در امتداد کدام مسیر حسی است؟
 ۱) تalamos پیشین، حسی پیکری
 ۲) تalamos خلفی، بینایی
 ۳) قشر گیجگاهی، شناوبی
 ۴) قشر جزیره، چشایی
- ۵۶- مشخصه خواب REM، کدام است؟
 ۱) افزایش تonus عضلانی بدن و ثبت امواج دلتا
 ۲) افزایش متابولیسم مغز و نامنظم شدن ضربان قلب و تنفس
 ۳) کاهش فشار خون شربانی و کاهش سرعت متابولیسم پایه
 ۴) ثبت منحنی‌های K کمپلکس و امواج کم فرکانس
- ۵۷- کدام بخش مخچه مسئول کنترل حرکات عضلات محوری بدن، حرکات گردن و شانه است؟
 ۱) کرمینه ۲) لوب فولکولوس
 ۳) نواحی بینایی ۴) نواحی پیشین
- ۵۸- میانجی کدام فیبرهای عصبی سمپاتیک، استیل کولین است?
 ۱) عضله مژگانی چشم ۲) غدد اشکی
 ۳) عروق خونی ۴) غدد برازی
- ۵۹- کدام گیرنده میزان چرخش مفاصل را به مغز اطلاع رسانی می‌کند؟
 ۱) رافینی ۲) پاچینی
 ۳) مایسنر ۴) مرکل
- ۶۰- کدام مورد تحریک پذیری نورون عصبی را افزایش می‌دهد؟
 ۱) هیپوکلسمی - اسیدوز
 ۲) هیپرکلسمی - اسیدوز
 ۳) هیپرکلسمی - آلkaloz
 ۴) هیپوکلسمی - آلkaloz
- ۶۱- کدام ریتم EEG در زمان خواب REM از نورون‌های مغز ثبت می‌شود?
 ۱) آلفا ۲) بتا
 ۳) تتا ۴) دلتا
- ۶۲- کدام سلول در ایجاد سدخونی مغزی نقش دارد?
 ۱) آسترسیت‌ها ۲) شوان
 ۳) میکروگلی‌ها ۴) الیگوڈندروسیت‌ها
- ۶۳- منشأ پیام‌های خروجی قشر مخچه از کدام نورون‌ها است?
 ۱) پورکرژ ۲) ستاره‌ای
 ۳) گرانولی ۴) گلزی
- ۶۴- افزایش فعالیت کدام سیستم نوروترانسمیتری در تغییر الگوی خواب از REM به NON-REM نقش دارد?
 ۱) اورکسینرژیک ۲) سروتونرژیک
 ۳) کولینرژیک ۴) نورادرنرژیک
- ۶۵- در ساختار بافتی قشر مخ کدام لایه در بین دو لایه پیرامیدال (هرمی) قرار گرفته است?
 ۱) ملکولی ۲) مولتی فرم
 ۳) دانه‌دار خارجی ۴) دانه‌دار داخلی

- ۶۶- انقباض عضلات صماخی (چکشی) و رکابی در گوش میانی باعث کدام می‌شود؟
 ۱) تشدید ارتعاش دریچه بیضی
 ۲) کاهش انتقال صدا به گوش داخلی
 ۳) کشیده شدن استخوان چکشی به طرف خارج
 ۴) کشیده شدن استخوان رکابی به طرف داخل
- ۶۷- کدام مورد بیان کننده چگونگی اثر بی حس‌گننده‌های موضعی است؟
 ۱) انسداد کانال‌های سدیم ولتاژی
 ۲) از کار انداختن پمپ سدیم - پتانسیم
 ۳) تحریک سیناپس‌های مهار کننده
 ۴) غیرفعال کردن رسپتورهای حس‌های پیکری
- ۶۸- حس‌تاسیست به لرژش و ارتعاش به وسیله کدام گیرنده تأمین می‌شود؟
 ۱) پایانه‌های آزاد عصبی
 ۲) پاچینی
 ۳) دوک عضلانی
 ۴) رافینی
- ۶۹- آکسون کدام سلول، راه عصبی بوبایی **Olfactory tract** را به وجود می‌آورد؟
 ۱) سلول دور گامورولی
 ۲) سلول دوقطبی بوبایی
 ۳) سلول میترال
 ۴) سلول گانگلیونی
- ۷۰- کری روانی در اثر آسیب کدام ناحیه شنوایی ایجاد می‌شود؟
 ۱) استخوانچه‌های شنوایی
 ۲) پرده صماخ
 ۳) قشر ارتباطی شنوایی
 ۴) مرکز اولیه شنوایی
- ۷۱- کدام ناحیه از مخچه در حفظ تعادل حرکات سکونی نقش دارد و با کدام نوع از گیرنده‌های تعادلی گوش داخلی در ارتباط می‌باشد؟
 ۱) آرکوسربلوم - ماکولاها
 ۲) پالوسربلوم - ماکولاها
 ۳) کرمینه - کاپولاها
- ۷۲- علامت بابینسکی (**Babinski sign**) در افراد بالغ در چه موقعی پدیدار می‌شود؟
 ۱) قطع راه شبکه‌ای - نخاعی
 ۲) قطع راه دهلیزی - نخاعی
 ۳) قطع راه قرمزی - نخاعی
 ۴) قطع راه قشری - نخاعی
- ۷۳- حس‌های لمس دقیق و درد به ترتیب از طریق کدام مسیر به فشر مغز منتقل می‌شود؟
 ۱) ستون پشتی - ستون پشتی
 ۲) قدمای جانبی - ستون پشتی
 ۳) ستون پشتی - قدمای جانبی
 ۴) قدمای جانبی - قدمای جانبی
- ۷۴- کدام میانجی عصبی در سیناپس، بین نورون پیش‌گانگلیونی و سلول‌های بخش مرکزی غده فوق کلیه آزاد می‌شود؟
 ۱) اپی‌نفرین
 ۲) استیل کولین
 ۳) دوپامین
 ۴) نوراپی‌نفرین
- ۷۵- تحریک نورون‌های حرکتی گاما موجب بروز کدام مورد می‌شود؟
 ۱) مهار فیبرهای عضلانی داخل دوکی
 ۲) مهار فیبرهای عضلانی خارج دوکی
 ۳) انقباض فیبرهای عضلانی خارج دوکی عضله آنتagonist است
 ۴) انقباض فیبرهای عضلانی داخل دوکی

فیزیولوژی غشاء سلولی:

- ۷۶- در رابطه با تأثیر هورمون بر سلول هدف، کدام اتفاق پس از فعال شدن پروتئین کینازها رخ می‌دهد؟
 ۱) تولید cAMP
 ۲) فعال شدن آدنیلات سیکلаз
 ۳) فعال شدن پروتئین G
 ۴) واکنش‌های فسفریله پروتئین‌ها
- ۷۷- مهم‌ترین لیپیدهای سازندهٔ غشاء به ترتیب اولویت کدام‌اند؟
 ۱) اسفنگوکلیپیدها، گلیسروفسفولیپیدها، کلسترول
 ۲) کلسترول، اسفنگوکلیپیدها، گلیسروفسفولیپیدها
 ۳) گلیسروفسفولیپیدها، اسفنگوکلیپیدها، کلسترول
 ۴) گلیسروفسفولیپیدها، کلسترول، اسفنگوکلیپیدها
- ۷۸- در پدیده سمیت ایجاد شده در انحرافات بیش از اندازه گلوتامات (Glutamate excitotoxicity) بر روی گیرنده‌های گلوتامات، کدام مورد اتفاق می‌افتد؟
 ۱) افزایش اتصال یون‌های منیزیم با گیرنده‌های گلوتامات
 ۲) تجمع یون‌های کلسیم داخل سلول
 ۳) خروج بیش از اندازه یون‌های سدیم
 ۴) مهار تبادل یون‌های کلر
- ۷۹- انتقال گلوكز به درون گلبول‌های قره‌زبان انسان به کدام صورت است؟
 ۱) Cl^- با Antiport
 ۲) H^+ با Symport
 ۳) Na^+ با Antiport
 ۴) Na^+ با Symport
- ۸۰- کدام مورد از ویژگی‌های کانال/گیرنده‌های گلوتامات نوع NMDA می‌باشد؟
 ۱) نسبت به کلر نفوذپذیر هستند.
 ۲) از طریق پروتئین G عمل می‌کنند.
 ۳) در حالت استراحت توسط یون منیزیم مسدود می‌باشند.
 ۴) در ایجاد پتانسیل پس‌سیناپسی مهاری نقش دارند.
- ۸۱- کدام عامل موجب بسته شدن اتصالات شکافدار Gap Junctions می‌شود؟
 ۱) افزایش pH
 ۲) افزایش کلسیم
 ۳) کاهش cAMP
 ۴) کاهش دما
- ۸۲- انتقال یون‌های سدیم و هیدروژن در غشاء سلول، چه نوع انتقالی از غشاء محسوب می‌شود؟
 ۱) انتقال در دو جهت مخالف
 ۲) انتشار تسهیل شده
 ۳) حرکت دسته جمعی
 ۴) هم انتقالی
- ۸۳- کانال یونی حساس به رایانودین (Ryanodin) در کدام قسمت سلول قرار دارد و چه یونی را عبور می‌دهد؟
 ۱) غشای سلول - سدیم
 ۲) غشای شبکه گلزی - پتانسیم
 ۳) غشای شبکه سارکوپلاسمی - کلسیم
- ۸۴- در مورد نواحی لیپید رفت (Lipid Raft) کدام صحیح است؟
 ۱) دارای فسفولیپیدهای با زنجیره کوتاه هستند.
 ۲) نواحی آتنی‌زنی غشای سلول را تشکیل می‌دهند.
 ۳) کلسترول کمی در این نواحی از غشاء وجود دارد.
 ۴) نفوذپذیری غشا را زیاد می‌کنند.

- ۸۵ - کدام گیرنده سیتوپلاسمی در حالت عدم اتصال به هورمون، به پروتئین‌های شوک حرارتی (HSP) متصل است؟
- (۱) تیروئیدی
 - (۲) کاتکول آمینی
 - (۳) گلوكورونیکوتینیدی
 - (۴) مینرالوکورتیکوتینیدی
- ۸۶ - کدام مورد در خصوص پمپ سدیم - پتانسیم صحیح است؟
- (۱) محل اتصال پتانسیم و اوایلین در بخش خارجی زیر واحد آلفا قرار دارد.
 - (۲) محل اتصال سدیم و اوایلین در بخش خارجی زیر واحد بتا قرار دارد.
 - (۳) هیدرولیز ATP مربوط به بخش داخلی زیر واحد آلفا است.
 - (۴) هیدرولیز ATP مربوط به بخش خارجی زیر واحد آلفا است.
- ۸۷ - کدام هورمون از سیستم پیک ثانویه فسفولیپیدهای غشاء سلول، استفاده می‌کند؟
- (۱) آلدوسترون
 - (۲) ای نفرین
 - (۳) انسولین
 - (۴) تیروکسین
- ۸۸ - DAG و IP_3 به ترتیب موجب فعالیت کدام ملکول می‌شوند؟
- (۱) Ca^{2+} - پروتئین کیاز C
 - (۲) Na^+ - پروتئین کیاز A
 - (۳) Mg^{2+} - پروتئین کیاز B
 - (۴) پروتئین کیاز B
- ۸۹ - گیرنده‌ای هیدرولیپیریدینی چه نقشی داشته و در کدام قسمت از سلول قرار دارد؟
- (۱) انتقال پتانسیم - در غشاء سلول
 - (۲) انتقال پتانسیم - در غشاء شبکه اندوبلاسمیک
 - (۳) انتقال کلسیم - در غشاء شبکه اندوبلاسمیک
 - (۴) انتقال کلسیم - سارکولما
- ۹۰ - رسپتور α_1 آدرنرژیکی نورابی‌نفرین از کدام طریق اثرات خود را در سلول انجام می‌دهد؟
- (۱) افزایش cAMP
 - (۲) کاهش cAMP
 - (۳) افزایش IP_3 و DAG
 - (۴) کاهش IP_3 و DAG
- ۹۱ - پروتئین کیازهای وابسته به کالمودولین از چه طریق سبب اثرات فیزیولوژیک خود می‌شوند؟
- (۱) فسفودی‌استراز
 - (۲) فسفوریلاسیون گروههای سرین / ترنوین
 - (۳) فسفوریلاسیون گروههای تیروزین
 - (۴) فسفوریلاسیون گروههای سرین / ترنوین
- ۹۲ - افزایش غلظت cAMP در سلول از طریق فعال‌سازی کدام مسیر سیگنالینگ باعث رونویسی از زن‌ها می‌شود؟
- (۱) فسفوریلاسیون CREB
 - (۲) افزایش تولید پروتئین کیاز C
 - (۳) فعال‌سازی فسفولیپاز C و افزایش غلظت کلسیم
 - (۴) فعال‌سازی فسفودی‌استراز و تولید کلسی نورین
- ۹۳ - کدام آنزیم در غشای سلول وجود دارد؟
- (۱) MAP - کیاز
 - (۲) آدنیلات‌سیکلаз
 - (۳) پروتئین کیاز A
 - (۴) پروتئین کیاز
- ۹۴ - پیام رسانی نیتریک اکساید از کدام مسیر انجام می‌شود؟
- (۱) تولید فراوان cAMP
 - (۲) تشکیل دی‌اسیل‌گلیسرول و IP_3
 - (۳) فعال‌سازی آنزیم گوانیلات‌سیکلاز
 - (۴) مهار آنزیم‌های فسفودی‌استراز
- ۹۵ - رسپتور α_2 آدرنرژیکی نورابی‌نفرین از کدام طریق اثرات خود را در سلول اعمال می‌کند؟
- (۱) افزایش cAMP
 - (۲) کاهش cAMP
 - (۳) افزایش IP_3 و DAG
 - (۴) کاهش IP_3 و DAG

- ۹۶- پلی‌پیتید گوارشی گوانیلین از طریق کدام مورد سیگنالینگ داخل سلولی خود را انجام می‌دهد؟
- (۱) آدنیلیل سیکلاز غشایی
 - (۲) فسفولیپاز C غشایی
 - (۳) گوانیلیل سیکلاز محلول
 - (۴) گوانیلیل سیکلاز غشایی
- ۹۷- انتقال پتاسیم - هیدروژن (H^+ - K^+) و سدیم - کلر (Na^+ - Cl^-) به ترتیب چه نوع انتقال‌هایی از غشاء سلول محسوب می‌شوند؟
- (۱) انتقال در دو جهت مخالف - هماننتقالی
 - (۲) هماننتقالی - هماننتقالی
 - (۳) انتقال در دو جهت مخالف - انتقال در دو جهت مخالف (۴) هماننتقالی - انتقال در دو جهت مخالف
- ۹۸- کدام مورد عملکرد مبادله‌گر سدیم - کلسیم ($\text{Na}^+ / \text{Ca}^{2+}$ exchanger) در غشاء پلاسمایی است؟
- (۱) در حالت پاتولوژیک موجب خروج کلسیم می‌شود.
 - (۲) در حالت پاتولوژیک موجب ورود سدیم و خروج کلسیم از سلول می‌شود.
 - (۳) در حالت فیزیولوژیک موجب ورود کلسیم و خروج سدیم از سلول می‌شود.
 - (۴) در حالت فیزیولوژیک موجب ورود سدیم و خروج کلسیم از سلول می‌شود.
- ۹۹- هورمون ضد ادراری ADH کدام عامل را به غشاء سلول‌های مجاری جمع‌کننده کلیوی فراخوانی می‌کند؟
- (۱) آکوآپورین ۲
 - (۲) پمپ سدیم / پتاسیم
 - (۳) ناقل سدیم / گلوکز
 - (۴) عامل انتشار تسهیل شده کلوگز
- ۱۰۰- گیرنده GABA-A در غشاء سلول از طریق کدام کانال سیگنالینگ داخل سلولی خود را انجام می‌دهد؟
- (۱) باز کردن کانال‌های کلری
 - (۲) باز کردن کانال‌های پتاسیمی
 - (۳) باز کردن کانال‌های سدیمی
 - (۴) بستن کانال‌های کلسیمی

سایه تحقیقاتی ازمان