

163

A

نام:

نام خانوادگی:

محل امضا:



163A

دفترچه شماره (۱)

صبح جمعه  
۱۳۹۴/۱۲/۱۴



«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.»  
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
سازمان سنجش آموزش کشور

## آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمترکز) – سال ۱۳۹۵

### مجموعه شیلات (کد ۲۴۱۲)

مدت پاسخگویی: ۱۲۰ دقیقه

تعداد سوال: ۹۰

عنوان دروس اختصاصی، تعداد و شماره سوال‌ها

ردیف	دروس اختصاصی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	ریاضیات عمومی، هیدرولیک و بیولوژی عمومی، آمار حیاتی	۹۰	۱	۹۰

این آزمون نمره منفی دارد.  
استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و ...) پس از برگزاری آزمون، برای تعلیم اشخاص خلیلی و خلوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز نیاشد و یا متخلفین برای مغایرات رفتار می‌شود.

ریاضیات عمومی:

-۱ دامنه تابع با ضابطه  $f(x) = \sqrt{2 - \log(x^2 - 15x)}$  کدام است؟

(۱)  $(5, 20]$

(۲)  $(15, 20]$

(۳)  $[-5, 0] \cup (15, 20]$

(۴)  $(-\infty, 0] \cup (15, +\infty)$

-۲ اگر  $x \geq \frac{1}{2}$  و  $f(x) = x^2 - x - 3$  باشد، نمودارهای دو تابع  $f$  و  $f^{-1}$  با کدام طول متقاطع هستند؟

(۱) ۱

(۲)  $\frac{3}{2}$

(۳) ۲

(۴) ۳

-۳ اگر  $f(x) = \ln \frac{x + \sqrt{x^2 + 8}}{2}$  باشد،  $f^{-1}(\ln 2)$  برابر کدام است؟

(۱)  $\sqrt{2}$

(۲)  $\frac{1}{2}$

(۳) ۱

(۴) ۲

-۴ حد عبارت  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} (1 + \cos x)^{\sqrt{\tan x}}$  کدام است؟

(۱) صفر

(۲) ۱

(۳)  $\frac{1}{e}$

(۴) e

-۵ از نقطه A واقع بر محور y‌ها دو خط مماس و عمود بر هم نسبت به منحنی  $y = -x^2 + x + 3$  رسم شده است، عرض

نقطه A کدام است؟

(۱)  $\frac{1}{2}$

(۲)  $\frac{1}{4}$

(۳) ۱

(۴)  $\frac{3}{4}$

-۶- فاصله نقطه تلاقی منحنی قطبی  $r = \sin 2\theta$  با خط  $\theta = \frac{\pi}{3}$  از محور قطبی کدام است؟

(۱)

$$\frac{\sqrt{3}}{2}$$

(۲)

$$\frac{1}{2}$$

(۳)

$$\frac{3}{4}$$

(۴)

-۷- اگر  $f(x) = x^n$  باشد، مجموع  $f(0) + \frac{f'(0)}{1!} + \frac{f''(0)}{2!} + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$  برابر کدام است؟

(۱)

$$x^{n-2}$$

(۲)

$$x^{n-1}$$

(۳)

$$x^n$$

(۴)

-۸- در تابع پارامتری ( $x = te^t$ ,  $y = (t+2)e^t$ )، مقدار  $\frac{dy}{dx}$  به ازای  $t = 1$  کدام است؟

$$-\frac{1}{4}e^{-1}$$

(۱)

$$-\frac{1}{2}e$$

(۲)

$$\frac{1}{4}e$$

(۳)

$$\frac{1}{8}e^{-1}$$

(۴)

-۹- به ازای کدام مقدار  $b$ ، تابع  $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}; & x \leq b \\ 1 - \frac{x}{4}; & x > b \end{cases}$  مشتق پذیر است؟

(۱)

(۲)

(۳)

(۴) هیچ مقدار  $b$

-۱۰- در داخل یک کره به قطر ۸ واحد، استوانه قائمی با بیشترین سطح جانبی ممکن، محاط شده است. سطح جانبی این استوانه کدام است؟

(۱)

(۲)

(۳)

(۴)

-۱۱ اگر  $y = x + \ln x$  باشد، مقدار  $\frac{dy}{dx}$  به ازای  $x = 2$  کدام است؟

$$-\frac{4}{9} \quad (1)$$

$$-\frac{4}{27} \quad (2)$$

$$\frac{1}{9} \quad (3)$$

$$\frac{2}{27} \quad (4)$$

-۱۲ معادله خط مماس بر منحنی  $y = x^{\frac{1}{x}}$  در نقطه  $x = 1$  واقع بر آن کدام است؟

$$y = \frac{1}{2}(x+1) \quad (1)$$

$$y = \frac{1}{2}x - 1 \quad (2)$$

$$y = x \quad (3)$$

$$y = 1 \quad (4)$$

-۱۳ اگر  $x^3 + y^3 = 1$  باشد، آنگاه  $y''$  برابر کدام است؟

$$\frac{-2x}{y^5} \quad (1)$$

$$\frac{-2x}{y^2} \quad (2)$$

$$\frac{x^2}{y^5} \quad (3)$$

$$\frac{x^2}{y^2} \quad (4)$$

-۱۴ در بسط تابع  $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}}$  به صورت توان‌های صعودی  $x$ ، ضریب  $x^3$  برابر کدام است؟

$$-\frac{3}{16} \quad (1)$$

$$-\frac{5}{16} \quad (2)$$

$$\frac{3}{16} \quad (3)$$

$$\frac{5}{16} \quad (4)$$

- ۱۵ - نمودار تابع  $y = (2x+1)\sqrt[3]{x}$ ، در کدام بازه صعودی و تقریباً آن را به پایین است؟

$$(-\frac{1}{4}, \infty) \quad (1)$$

$$(-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}) \quad (2)$$

$$(\infty, \frac{1}{4}) \quad (3)$$

$$(\frac{1}{4}, +\infty) \quad (4)$$

- ۱۶ - تابع با ضابطه  $f(x) = \frac{ax+b}{x^2 - 5x + 4}$  در نقطه  $(1, -2)$ ، ماکسیمم نسبی است.  $a+b$  کدام است؟

$$-4 \quad (1)$$

$$1 \quad (2)$$

$$-1 \quad (3)$$

$$2 \quad (4)$$

- ۱۷ - جواب معادله  $\tanh(\frac{1}{2} \ln x) = \frac{1}{3}$  کدام است؟

$$-2 \quad (1)$$

$$-1 \quad (2)$$

$$1 \quad (3)$$

$$2 \quad (4)$$

- ۱۸ -  $\frac{dy}{dx} = \int_0^{\sin t} \text{Arcsin } z \, dz$ ،  $y = \int_1^{\sqrt{t}} \frac{\sin z^2}{z} dz$  حاصل کدام است؟

$$\frac{\tan t}{\sqrt{t}} \quad (1)$$

$$\frac{\sin t}{\sqrt{t}} \quad (2)$$

$$\frac{\tan t}{\sqrt{t}^2} \quad (3)$$

$$\frac{\sin t}{\sqrt{t}^2} \quad (4)$$

- ۱۹ - حاصل  $\int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt{x+1} + \sqrt{(x+1)^3}}$  کدام است؟

$$\frac{\pi}{12} \quad (1)$$

$$\frac{\pi}{6} \quad (2)$$

$$\frac{\pi}{3} \quad (3)$$

$$\frac{\pi}{4} \quad (4)$$

- ۲۰ - حجم دور حاصل از دوران سطح محدود به منحنی‌های  $y^2 = x^2$  و  $y = 8x$  حول محور  $y$ ها، چند برابر  $\frac{\pi}{5}$  است؟

- ۱۲ (۱)  
۱۶ (۲)  
۲۱ (۳)  
۲۴ (۴)

- ۲۱ - طول قوس منحنی به معادله  $(x = \sqrt{3}t^2, y = t - t^3)$  از  $t=1$  تا  $t=0$  کدام است؟

- ۱ (۱)  
۱/۵ (۲)  
۲ (۳)  
۲ (۴)

- ۲۲ - مساحت ناحیه محدود به منحنی قطبی  $r = 1 + \cos\theta$  کدام است؟

- $\frac{3\pi}{4}$  (۱)  
π (۲)  
 $\frac{3\pi}{2}$  (۳)  
 $2\pi$  (۴)

- ۲۳ - مشتق سویی تابع  $f(x,y) = \frac{x^2}{y} - \frac{2y}{x}$  در نقطه  $(-1, 2)$  در امتداد بردار  $3j - 4i$  برابر کدام است؟

- $-\frac{3}{5}$  (۱)  
 $-\frac{2}{5}$  (۲)  
 $-\frac{2}{5}$  (۳)  
 $\frac{1}{5}$  (۴)

- ۲۴ - اگر  $r = \sqrt{2}$  و  $\theta = \frac{\pi}{4}$  و  $\frac{\partial z}{\partial \theta}$  به ازای  $y = r \sin \theta$  و  $x = r \cos \theta$ ،  $z = x^2 + y^2 + xy - 2y$  باشد، مقدار است؟

- ۲ (۱)  
-۱ (۲)  
۰ (۳) صفر  
۱ (۴)

- ۲۵- دیفرانسیل کامل تابع دو متغیری  $z = \tan^{-1} \frac{x+y}{x}$ , در نقطه  $(2, -1)$  کدام است؟

$$\frac{1}{5}(dx - 2dy) \quad (1)$$

$$\frac{1}{5}(dx + 2dy) \quad (2)$$

$$\frac{2}{5}(dx - dy) \quad (3)$$

$$\frac{1}{5}(2dx + dy) \quad (4)$$

- ۲۶- نقطه  $A(1, -2, 5)$  مرکز مکعبی است که یک وجه آن منطبق بر صفحه به معادله  $2x + y - 2z = 2$  می‌باشد، حجم این مکعب کدام است؟

$$64 \quad (1)$$

$$125 \quad (2)$$

$$216 \quad (3)$$

$$512 \quad (4)$$

- ۲۷- مجموع سری نامتناهی با جمله عمومی  $a_n = \frac{1}{n(n+1)}$  کدام است؟

$$1 \quad (1)$$

$$\frac{3}{4} \quad (2)$$

$$\frac{1}{2} \quad (3)$$

$$\frac{3}{2} \quad (4)$$

- ۲۸- به ازای کدام مقدار  $a$ ، دستگاه معادلات سازگار است؟

$$\begin{cases} ax + 3y + 5 = 0 \\ 3x + 2ay + 8 = 0 \\ x + ay + 2 = 0 \end{cases}$$

$$2 \text{ و } -\frac{3}{2} \quad (1)$$

$$2 \text{ و } -\frac{3}{4} \quad (2)$$

$$-1 \text{ و } \frac{3}{4} \quad (3)$$

$$-1 \text{ و } -\frac{3}{4} \quad (4)$$

- ۲۹- اگر  $A = \begin{bmatrix} 7 & 3 \\ 8 & 9 \end{bmatrix}$  و ماتریس ستونی  $X$  و عدد حقیقی  $\lambda$  در رابطه  $AX = \lambda X$  صدق کند، آنگاه  $\lambda$  کدام است؟

- (۱) -۵ و ۱۳  
(۲) -۴ و ۱۱  
(۳) ۳ و ۱۱  
(۴) ۳ و ۱۳

- ۳۰- یکی از کعبه‌های (ربیه سوم) عدد مختلط  $z = -2 - 2i = r(\cos \theta + i \sin \theta)$  است، دو تابی مرتب  $(r, \theta)$  کدام است؟

- (۱)  $(\sqrt{2}, \frac{13\pi}{12})$   
(۲)  $(\sqrt{2}, \frac{7\pi}{12})$   
(۳)  $(2\sqrt{2}, \frac{5\pi}{6})$   
(۴)  $(2\sqrt{2}, \frac{11\pi}{6})$

#### هیدرو بیولوژی عمومی:

- ۳۱- کدام مورد از ویژگی‌های جانوران Lenitic است؟

- (۱) توقعات اکسیژنی بالایی دارند.  
(۲) جانوران آب‌های تند و سریع می‌باشند.  
(۳) نیازهای غذایی آن‌ها زیاد می‌باشد.  
(۴) مقاوم در برابر تغییرات حرارت محیط هستند.

- ۳۲- جنگل‌های مانگرو (حرا)، بیشتر در کدام‌یک از مناطق زیر دیده می‌شوند؟

- (۱) استوائی (۲) قطبی (۳) مدیترانه‌ای (۴) معتدل

- ۳۳- در کدام مورد میزان آب موجود در کره زمین کمترین است؟

- (۱) آب‌های موجود در یخچال‌های دائمی (۲) آب دریاچه‌های شور  
(۳) آب‌های زیرزمینی (۴) رودخانه‌ها

- ۳۴- کدام‌یک از رنگدانه‌ها، در عمل فتوسترن نقش کلیدی تری دارد؟

- (۱) اگزانتوفیل‌ها (۲) کلروفیل a  
(۳) کاروتونوئیدها (۴) فیکوسبیانین‌ها

- ۳۵- کدام مورد، چشم‌های سقوطی هستند؟

- (۱) میزان رسوبات بسترشاران زیاد می‌باشد.  
(۲) گیاه فراوان در بسترشاران رشد می‌نماید.  
(۳) اکسیژن‌گیری مناسب‌تری دارند.  
(۴) تبادل حرارتی زیادی با محیط دارند.

- ۳۶- کدام مورد، در منابع آب دیستروف (Dystroph)، عامل محدودیت تولید است؟

- (۱) افزایش کلسیم (۲) کاهش فسفر (۳) محدودیت نور (۴) محدودیت  $CO_2$

- ۳۷- کدام‌یک از موجودات، در رودخانه‌های کوهستانی و پرشیب، اهمیت کمتری دارند؟

- (۱) موجودات کفرزی (۲) فیتوپلانکتون‌ها (۳) پریفیتون‌ها (۴) ماهی‌ها

- ۳۸ - در کدام چشم، آب فسیل بیشتر دیده می‌شود؟

Rheocren (۴)

Juvenil (۳)

Vados (۲)

Limnocren (۱)

- ۳۹ - شرایط زیست در آب‌های زیرزمینی، به کدام صورت است؟

(۱) مقدار تخم موجودات کم، ولی عمر طولانی تری دارند.

(۲) مقدار تخم موجودات زیاد و عمر هم طولانی تر است.

(۳) مقدار تخم موجودات کم و عمر هم کوتاه‌تر می‌باشد.

(۴) مقدار تخم موجودات زیاد، ولی عمر کوتاه‌تری خواهد داشت.

- ۴۰ - کدام اتفاق، برای دخول مواد نفتی به لایه‌های مختلف زمین بروز می‌کند؟

(۱) با این عمل قدرت فیلتر کنندگی لایه‌ها افزایش می‌یابد.

(۲) در این پدیده قدرت فیلتر کنندگی لایه‌ها کاهش می‌یابد.

(۳) این عمل مانع عبور مواد امولسیون شده در آب می‌گردد.

(۴) سرعت انتقال آب در لایه‌ها افزایش یافته و درنتیجه چرخش آب بهتر صورت می‌گیرد.

- ۴۱ - کدام نقش را، پوشش‌های بیولوژیکی در تصفیه فاضلاب به عهده دارد؟

(۱) افزایش میزان BOD<sub>5</sub>

(۲) حذف باکتری‌ها

(۳) کاهش مواد معدنی مغذی

(۴) حذف مواد آلی قابل تجزیه

- ۴۲ - در کدام شرایط، آهن در آب به حالت محلول است؟

(۱) در شرایط احیائی

(۲) پائین بودن اکسیژن و به صورت آهن سه‌ظرفیتی

(۳) پائین بودن میزان Co<sub>2</sub>

- ۴۳ - کدام مورد، درباره پدیده Photo-assimilation درست است؟

(۱) نیاز به حضور یک‌دهنده H غیر از آب

(۲) عوامل بازدارنده نوری در عمل فتوستتر

(۳) تولید ترکیبات پیچیده‌آلی از ترکیبات ساده‌تر

(۴) افزایش نیاز به ترکیبات آلی در محیط برای تولید

- ۴۴ - کدام مورد، نیاز باکتری‌های فتوآتروف را جهت فعالیت پوشش می‌دهد؟

(۱) نور و دهنده H

(۲) نور و مواد آلی محلول

(۳) مواد معدنی محلول و دهنده H

(۴) فسفر و نیترات به میزان متعادل در کنار نور

- ۴۵ - کدام مورد، اهمیت تغذیه‌ای خزه‌ها (Fontynalis)، در آب‌های جاری است؟

(۱) خزه‌ها به طور مستقیم مورد تغذیه جانوران آبزی قرار می‌گیرند.

(۲) پناهگاه موجودات کفزی شده و درنتیجه تغذیه را تسهیل می‌کنند.

(۳) عامل فیلتر شدن ذرات غذایی برای تغذیه جانوران می‌گردد.

(۴) جلبک‌ها بر روی آن‌ها رشد و نمو بهتری داشته و بدین شکل در تغذیه موجودات دخالت می‌نمایند.

- ۴۶ - در ایام مختلف سال زمان توقف مواد غذایی (retention time) در دریاچه‌ها به کدام صورت است؟

(۱) در بهار کوتاه‌تر است.

(۲) در بهار طولانی تر است.

(۳) در زمستان طولانی تر می‌باشد.

-۴۷ - به کدام مورد، اتلاع می‌شود؟ Aufwuchs

- (۱) ارگانیزم‌های بنتیک موجود در کف رودخانه‌های کوهستانی می‌باشد.
- (۲) جامعه آتوروف‌های لایه‌های سطحی دریاچه‌های یوتروف می‌باشد.
- (۳) جامعه میکروسکوپیک ارگانیزم‌های چسبنده نظیر باکتری‌ها و پروتوزوئرها است.
- (۴) مجتمع و ذرات معلق زنده و غیرزنده در ستون‌های آب است.

-۴۸ - کدام مورد، میزان تولید در منابع آب است؟

- (۱) افزایش تراکم کلروفیل a در توده‌های سلولی
- (۲) رشد بیوماس بدون ارتباط با زمان
- (۳) تولید مواد آلی در توده آب
- (۴) رشد بیوماس در واحد زمان

-۴۹ - مهم‌ترین منابع غذا در زئوپلانکتون‌ها، از کدام طریق تأمین می‌شود؟

- (۱) نانوپلانکتون‌ها و باکتری‌ها
- (۲) میکرو پلانکتون‌ها و گیاهان عالی آبزی
- (۳) دیاتومه‌های غنی و مواد آلی محلول
- (۴) پلانکتون‌های سبز – آبی و مواد آلی محلول

-۵۰ - نقش مواد هومینی در اکوسیستم‌های آبی به کدام شکل است؟

- (۱) از رسوب فسفر جلوگیری می‌نمایند.
- (۲) از بروز سمیت‌ها تا حدودی جلوگیری می‌کند.
- (۳) سبب افزایش میزان کلسیم می‌گردد.
- (۴) رسوب عناصر سنگین را تسهیل می‌کند.

-۵۱ - موجودات نهرهای کوهستانی غیرآلوده، از نظر حرارت و اکسیژن به کدام گروه تعلق دارند؟

Eurytherm – Euryoxibiont (۱)      Eurytherm – Polyoxibiont (۱)

Coldstenotherm – Polyoxibiont (۴)      Coldstenotherm – Euryoxibiont (۳)

-۵۲ - به منظور رهاسازی ماهیان جهت افزایش ذخایر به آب‌های طبیعی، کدام مورد را، جهت نتیجه مطلوب باید مدنظر قرار داد؟

- (۱) وقتی که تراکم پلانکتون‌های منطقه جهت تغذیه کافی باشد.
- (۲) مادامی که بچه ماهیان به اندازه و وزن مطلوب رسیده باشند.
- (۳) هنگامی که بچه ماهیان به غذای طبیعی منطقه آشنا شده باشند.
- (۴) مادامی که بچه ماهیان از نظر سلامتی در وضعیت مطلوبی قرار داشته باشند.

-۵۳ - با استفاده از ترکیب  $\text{Al}_2\text{Si}_5\text{O}_{10}$ ، کدام ترکیبات را می‌توان رسوب داد؟

- (۱) ترکیبات آهن
- (۲) ترکیبات ازت
- (۳) فسفات‌ها
- (۴) فیتوپلانکتون‌ها

-۵۴ - گرم بودن نسبی سواحل غربی آمریکای شمالی (کالیفرنیا)، مربوط به کدام جریان است؟

- (۱) استوائی سطحی
- (۲) گلف استریم
- (۳) کوروشیو
- (۴) لا برادر


-۵۵ - مصرف کنندگان اولیه، مواد غذایی خود را از کدام منبع تأمین می‌نمایند؟

- (۱) با انتخاب ترجیحی
- (۲) مواد آلی محلول
- (۳) مواد معدنی محلول
- (۴) مواد غذایی شکل دار

-۵۶ - در کدام بخش منابع آب‌های ساکن، نوسان مقدار مواد غذایی محلول کمترین است؟

- (۱) منطقه هیپولیمنیوں
- (۲) منطقه ایلیمنیوں
- (۳) منطقه متالیمنیوں

- ۵۷- منحنی زیر نشان‌دهنده تغییرات کدام پارامتر است؟



(۱) نوسانات تعداد باکتری‌ها در ستون‌های آب

(۲) تغییرات H<sub>2</sub>S در رابطه با درجه حرارت آب

(۳) تغییرات وزن مخصوص در درجه حرارت‌های مختلف آب

(۴) نوسانات میزان سولفات محلول در اعمق مختلف آب

- ۵۸- کدام پلانکتون، ایجاد بیولومینسانس (Bioluminescent) می‌نماید؟

(۱) سیانوفیسی Noctiluca

(۲) Oscillatoria

(۳) Scenedesmus

(۴) Synedra

- ۵۹- جریان هومبولد (Humboldt)، چگونه جریانی است؟

(۱) یک جریان سرد از قطب شمال به سمت استوا است.

(۲) یک جریان سرد از قطب جنوب به سمت استوا است.

(۳) یک جریان گرم استوائی به طرف شرق اقیانوس اطلس می‌باشد.

(۴) یک جریان عمیقی از قطب شمال به طرف قطب جنوب می‌باشد.

- ۶۰- از اشکالات شیشه‌های تاریک و روشن در سنگش تولیدات اوکیه آب‌ها، کدام مورد را می‌توان ذکر نمود؟

(۱) جریان‌های آبی در آن دخالت ندارد.

(۲) حجم محلول کم است.

(۳) در عمق دلخواه قرار نمی‌گیرند.

### آمار حیاتی:

- ۶۱- برای محاسبه متوسط نرخ رشد تولیدات شیلات در ۳۰ سال گذشته، از کدام میانگین باید استفاده نمود؟

(۱) وزنی

(۲) هندسی

(۳) ساده

(۴) هارمونیک

۶۲- در صید مولدین ماهی خاویاری، ۱۰ ماهی به طور تصادفی صید شده‌اند. احتمال این که ۵ تا از آن‌ها ماده باشند، چقدر است؟

$$\begin{array}{r} 189 \\ 256 \\ \hline 126 \\ 128 \\ \hline 63 \\ 256 \\ \hline 63 \\ 128 \end{array}$$

۶۳- فردا اگر هوا ابری شود به احتمال ۴۰٪ باران خواهد بارید. احتمال ابری شدن هوای فردا ۸۰٪ است، در این صورت احتمال بارندگی چند درصد است؟

$$\begin{array}{r} 68 \\ 50 \\ 40 \\ 32 \end{array}$$

۶۴- از خاک‌های منطقه‌ای ۷۰ درصد شور می‌باشد، ۵۰ درصد از خاک‌های شور و ۳۰ درصد از بقیه خاک‌ها، قلیابی هستند. در صورتی که یک نمونه تصادفی از خاک منطقه مذکور گزینش شود، چند درصد احتمال می‌رود که خاک آن قلیابی باشد؟

$$\begin{array}{r} 9 \\ 35 \\ 44 \\ 50 \end{array}$$

۶۵- از ظرفی حاوی ۵ مهره با علامت‌های A، B، C، D و E با جایگذاری دو مهره را پی‌درپی برمی‌داریم. کدام مورد درست است؟

(۱) احتمال آنکه مهره اول A و مهره دوم B باشد  $\frac{1}{15}$  است.

(۲) احتمال آنکه هر دو مهره دارای علامت A باشد  $\frac{1}{20}$  است.

(۳) احتمال آنکه هیچ کدام از مهره‌ها A نباشد  $\frac{12}{25}$  است.

(۴) احتمال آنکه در دو مهره انتخابی، A و B وجود نداشته باشد  $\frac{9}{25}$  است.

- ۶۶- از یک نوع کالای ساخته شده به وسیله یک کارخانه، ۲۵٪ دارای نقص فنی تشخیص داده شده است. اگر ۳ واحد از محصول کارخانه به صورت تصادفی انتخاب شود، احتمال آنکه در ۳ واحد انتخاب شده حداقل یک واحد ناقص باشد، چقدر است؟

- $\frac{3}{4}$  (۱)  
 $\frac{7}{8}$  (۲)  
 $\frac{25}{32}$  (۳)  
 $\frac{27}{32}$  (۴)

- ۶۷- در جعبه‌ای ۲ مهره سیاه و ۱ مهره سفید با اندازه مساوی وجود دارد. اگر با جایگذاری، ۳ مرتبه مهره‌ای را انتخاب کنیم، احتمال آنکه از مهره‌های انتخابی دو مهره سفید باشد، چقدر است؟

- $\frac{1}{2}$  (۱)  
 $\frac{2}{5}$  (۲)  
 $\frac{2}{9}$  (۳)  
 $\frac{5}{9}$  (۴)

- ۶۸- دانشجویان دو رشته تحصیلی جمیعاً ۷۲ نفر در درس آمار، ۶۷ نفر در درس فیزیک و ۶۵ نفر در هر دو درس قبول شده‌اند. اگر ۵ نفر در هر دو درس محدود شده باشند، دو رشته تحصیلی چند دانشجو دارد؟

- ۱۳۲ (۱)  
۷۹ (۲)  
۷۷ (۳)  
۷۲ (۴)

- ۶۹- اگر دو پیشامد A و B مستقل باشند،  $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$  کدام است؟

- $\frac{1}{2}$  (۱)  
 $\frac{1}{3}$  (۲)  
 $\frac{2}{3}$  (۳)  
 $\frac{5}{6}$  (۴)

- ۷۰- به چند طریق می‌توان ۵ گلدان با تیمارهای متفاوت را در ۵ بلوک قرار داد؟

- ۱ (۱)  
۵ (۲)  
۲۵ (۳)  
۱۲۰ (۴)

- ۷۱- می‌خواهیم از آب ۵ دریاچه نمونه‌برداری کنیم. به دلیل بعد مسافت، تنها از ۳ دریاچه می‌توان نمونه‌برداری کرد. به چند حالت می‌توان نمونه‌برداری را انجام داد به‌طوری‌که نمونه‌ها تکراری نباشد؟
- (۱) ۵  
 (۲) ۱۰  
 (۳) ۲۰  
 (۴) ۳۰
- ۷۲- هفت نفر متمازیز به چند طریق می‌توانند در هفت طبقه از یک آپارتمان هفت طبقه‌ای ساکن شوند به شرطی که از بین آنان علی پایین‌تر از حسن و حسن پایین‌تر از احمد باشد؟
- (۱) ۸۷۰  
 (۲) ۸۴۰  
 (۳) ۸۲۰  
 (۴) ۸۱۰
- ۷۳- در کدام مورد، توزیع پواسن تقریب خوبی برای توزیع دوجمله‌ای محسوب می‌شود؟
- $P = 0.04$  ،  $n = 25$  (۱)  
 $P = 0/28$  ،  $n = 50$  (۲)  
 $P = 0/58$  ،  $n = 60$  (۳)  
 $P = 0/93$  ،  $n = 150$  (۴)
- ۷۴- به‌طور متوسط از تولیدات یک کارخانه کنسرو ماهی، در هر روز ۲ کنسرو خراب می‌باشند. احتمال اینکه در یک روز یک کنسرو خراب باشد چقدر است؟ ( $e = 2,718282$ )
- (۱)  $e^{-2}$   
 (۲)  $2e^{-2}$   
 (۳)  $3e^{-2}$   
 (۴)  $4e^{-2}$
- ۷۵- از یک استخر پورش ماهی، تعداد ۱۰۰ ماهی به‌طور تصادفی انتخاب گردید. میانگین و انحراف معیار ماهیان نر از راست به چه کدام‌اند؟
- (۱) ۴۰-۵  
 (۲) ۴۰-۱۰  
 (۳) ۵-۵۰  
 (۴) ۱۰-۵۰
- ۷۶- در یک جامعه آماری که از نظر صفت مورد بررسی در رده‌های مختلف ناهمگن است، کدام روش نمونه‌برداری مناسب است؟
- (۱) سیستماتیک  
 (۲) تصادفی ساده  
 (۳) تصادفی طبقه‌بندی شده  
 (۴) تصادفی یا سیستماتیک

- ۷۷- متهمنی که در حقیقت مقصرباشد اما قاضی حکم به مجرمیت وی صادر کند، قاضی چه نوع اشتباهی را مرتکب شده است؟

(۱) اول

(۲) دوم

(۳) اول یا دوم

(۴) هم اول و هم دوم

- ۷۸- یک کارخانه غذای ماهی، محصولات خود را در کیسه عرضه می‌کند. وزن جمعیت این کیسه‌ها از توزیع نرمال پیروی می‌کند و دارای انحراف معیار یک کیلوگرم است. ۵ درصد از این کیسه‌ها دارای وزن بیش از ۲۰ کیلوگرم می‌باشند. میانگین وزن کیسه‌ها کدام است؟

(مقادیر Z،  $z_{0.95} = 1.96$  و  $z_{0.99} = 2.57$  می‌باشند.)

(۱) ۱۸/۰۶

(۲) ۱۸/۱۴

(۳) ۱۸/۳۶

(۴) ۱۷/۴۳

- ۷۹- مقدار هورمن کورتیزول خون یک نمونه ۳۰ تایی ماهی اندازه‌گیری شد. سپس آن‌ها را در معرض آلودگی یک سم آفتکش قرار داده و مجدداً مقدار کورتیزول همان ماهیان اندازه‌گیری گردید. برای تعیین تفاوت معنی دار قبل و بعد از در معرض آفتکش قرار گرفتن آن‌ها از کدام آزمون باید استفاده کرد؟

Z (۱) ۱ جفتی

(۲) t با نمونه‌های مستقل

(۳) یک نمونه‌ای

- ۸۰- اگر حدود اعتماد ۹۶٪ میانگین جامعه‌ای از ۴۰ تا ۵۰ باشد، کدام مورد درست است؟

(۱) ۹۶٪ احتمال دارد که میانگین حقیقی جامعه در محدوده مذکور باشد یا ۴٪ احتمال دارد که میانگین حقیقی خارج از محدوده یادشده باشد.

(۲) ۹۶٪ احتمال دارد که میانگین حقیقی جامعه در محدوده مذکور یا خارج از آن باشد.

(۳) ۴٪ احتمال دارد که میانگین حقیقی جامعه در محدوده مذکور باشد.

(۴) ۹۶٪ احتمال دارد که میانگین حقیقی جامعه در محدوده مذکور نباشد.

- ۸۱- آزمون نیکویی برازنده با استفاده از کدام آماره انجام می‌گیرد؟

Z (۴)

t (۳)

F (۲)

 $\chi^2$  (۱)

- ۸۲- در رگرسیون چند متغیره، اگر بین متغیرهای مستقل همبستگی شدید وجود داشته باشد، این پدیده را چه می‌نامند؟

(۱) هم خطی

(۲) خود همبستگی

(۳) ضریب تعیین

(۴) ضریب همبستگی

- ۸۳- در تجزیه رگرسیون چند متغیره با ۵ متغیر مستقل و ۳۰ مشاهده،  $SS_{reg} = ۳۶۰$  و  $SS_e = ۴۵$  به دست آمده

است، ضریب تعیین یا  $R^2$  کدام است؟

(۱) ۰/۸۰

(۲) ۰/۹۰

(۳) ۰/۱۵

(۴) ۰/۲۵

- ۸۴ - برآورد معادله خط رگرسیون داده‌های جدول زیر کدام است؟

X	۱	۲	۳	۲	۱
Y	۲	۵	۴	۳	۳

$$Y = \frac{3}{4} + \frac{2}{1} X \quad (1)$$

$$Y = \frac{2}{1} + \frac{3}{4} X \quad (2)$$

$$Y = \frac{1}{4} + \frac{2}{1} X \quad (3)$$

$$Y = \frac{3}{4} - \frac{2}{1} X \quad (4)$$

- ۸۵ - مقدار F در تجزیه واریانس بیانگر کدام مورد است؟

(۱) نسبت میانگین درون نمونه‌ها به میانگین بین نمونه‌ها

(۲) نسبت میانگین بین نمونه‌ها به میانگین درون نمونه‌ها

(۳) نسبت برآورد واریانس درون نمونه‌ها به برآورد واریانس بین نمونه‌ها

(۴) نسبت برآورد واریانس بین نمونه‌ها به برآورد واریانس درون نمونه‌ها

- ۸۶ - کدام مورد، مزیت اصلی تجزیه چند مشاهده‌ای نسبت به تجزیه بر روی میانگین مشاهدات است؟

(۱) آزمون خطای آزمایشی      (۲) داشتن یک متبع تغییر کمتر

(۳) داشتن داده‌های بیشتر      (۴) داشتن یک متبع تغییر اضافی

- ۸۷ - روش کمترین توان‌های دوم در چه مورد به کار می‌رود؟

(۱) آزمون تجزیه واریانس      (۲) برآوردن بهترین خط رگرسیون

(۳) تعیین حداقل همبستگی داخلی بین متغیرها      (۴) در قصیه حد مرکزی برای تعیین نرمال بودن داده‌ها

- ۸۸ - پژوهشگری می‌خواهد تأثیر چهار نوع جیره غذایی را بر میزان رشد دو گونه ماهی بورسی کند. برای تجزیه و تحلیل

داده‌های این پژوهش مناسب‌ترین روش آماری کدام است؟

(۱) کای مربع      (۲) تجزیه رگرسیون

(۳) تجزیه واریانس ساده      (۴) تجزیه واریانس دوعلاملی

- ۸۹ - در آزمایشی برای تعیین اثر چند جیره غذایی بر رشد ماهی قزل آلا سعی بر این بود که تمامی ماهیان مورد استفاده

در آزمایش دارای وزن برابر باشند، اما این امر به طور کامل میسر نشد. برای حذف اثر وزن ماهیان مورد استفاده در

آزمایش از چه روشی باید استفاده نمود؟

(۱) آنالیز کوواریانس      (۲) آنالیز واریانس

(۳) آزمون من - ویتنی      (۴) آزمون کروسکال - والیس

- ۹۰ - اگر مفروضات تجزیه واریانس یک عاملی برقرار نباشد، از کدام آزمون می‌توان استفاده کرد؟

(۱) مک نمار      (۲) من - ویتنی

(۳) ویلکاکسون      (۴) کروسکال - والیس