



162

F

نام:

نام خانوادگی:

محل امضا:

صبح جمعه
۹۳/۱۲/۱۵
دفترچه شماره ۱ از ۲



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.
امام خمینی (ره)

آزمون ورودی دوره‌های دکتری (نیمه هتمرکز) داخل - سال ۱۳۹۴

علوم باگبانی - گیاهان زینتی (کد ۲۴۰۸)

مدت پاسخگویی: ۱۲۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۸۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی (فیزیولوژی گیاهی و فیزیولوژی پس از برداشت، اصول تولید گیاهان باگبانی، زنتیک و اصلاح گیاهان باگبانی، تغذیه و متابولیسم گیاهان باگبانی، فیزیولوژی گل و گیاهان زینتی، اصلاح گل و گیاهان زینتی)	۸۰	۱	۸۰

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

اسفند ماه - سال ۱۳۹۳

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و ...) بس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با متخلفین برای مقررات رفتار می‌شود.

- ۱ کدام جمله در خصوص تفاوت H^+ - ATPase - غشاء پلاسمایی و تونوپلاست درست است؟
- (۱) H^+ - ATPase تونوپلاست بر خلاف H^+ - ATPase غشاء پلاسمایی، نسبت به وانادیت حساسیتی ندارد.
 - (۲) H^+ - ATPase تونوپلاست بر خلاف H^+ - ATPase غشاء پلاسمایی، H^+ را به داخل سیتوسول می‌فرستند.
 - (۳) H^+ - ATPase تونوپلاست، یک پمپ الکتروژنیک است در حالی که H^+ - ATPase غشاء پلاسمایی، یک پمپ الکترونوتراال می‌باشد.
 - (۴) H^+ - ATPase تونوپلاست، یک پمپ الکترونوتراال است در حالی که H^+ - ATPase غشاء پلاسمایی، یک پمپ الکتروژنیک می‌باشد.
- ۲ پتانسیل اسمزی شیره سلولی با غلظت $2\text{ mol}/\text{L}$ مواد محلول در دمای 30°C درجه کلوین چند مگاپاسکال است؟ (ثابت عمومی گازها، $1\text{ K}^{-1} \cdot 10^{-8}\text{ MPa mol}^{-1}$ در نظر گرفته شود.)
- (۱) -0.24°C
 - (۲) -0.48°C
 - (۳) -0.6°C
- ۳ در یک مولکول کلروفیل برانگیخته شده (Excited)، در کدام یک از انواع حالت‌های برانگیخته، امکان رخداد فتوشیمیایی وجود دارد و دلیل آن چیست؟
- (۱) حالت سینگلت ۲، به دلیل سطح بالاتر انرژی در مولکول برانگیخته
 - (۲) حالت پایه (Ground)، به دلیل پایداری مولکول کلروفیل برانگیخته
 - (۳) حالت سینگلت ۱، به دلیل سطح نسبتاً بالای انرژی و پایداری نسبتاً بالای حالت برانگیخته
 - (۴) حالت تریپلت، به دلیل طول عمر بیشتر این حالت نسبت به حالت‌های دیگر برانگیختگی گروه «هم» در هموگلوبین، NAD و FAD به ترتیب مثال‌هایی از کدام تعریف می‌باشند؟
- (۱) کوفاکتور، کوآنزیم، گروه پروستیک
 - (۲) گروه پروستیک، کوآنزیم، کوفاکتور
 - (۳) کوآنزیم، گروه پروستیک، گروه پروستیک
 - (۴) کوآنزیم، کوآنزیم، کوآنزیم
- ۴ کدام مورد، سوبستراتی تنفس نوری است؟
- (۱) پیروات
 - (۲) فسفو گلیکولات
 - (۳) فسفو گلیسرات
 - (۴) آلفاکتو گلوتارات
- ۵ کدام پدیده می‌تواند به کاهش حباب‌های گاز در آوند حوبی کمک کند؟
- (۱) تعرق
 - (۲) تعریق
 - (۳) حفره‌سانی
 - (۴) فشار ریشه‌ای
- ۶ تبدیل پیروات به استیل کوآنزیم A، در کدام بخش انجام می‌شود؟
- (۱) سیتوزول
 - (۲) غشاء خارجی میتوکندری
 - (۳) ماتریکس میتوکندری
- ۷ در ساختمان کلروفیل، کدام گروه از عناصر شیمیایی، شرکت دارند؟
- (۱) آهن، کلسیم و پتاسیم
 - (۲) آهن، منیزیم و منگنز
 - (۳) روی، منیزیم و مولیبدن
- ۸ در حمل و نقل هوایی محصولات باگبانی، بروز شرایط کم فشار منجر به کدام مورد می‌شود؟
- (۱) افزایش شدید تعرق و کاهش قابل توجه وزن محصول
 - (۲) کاهش تعرق و کاهش دمای محصول و بهبود کیفیت
 - (۳) قهوه‌ای شدن بافت درونی به علت گرم شدن محصول
 - (۴) خروج اتیلن از بافت محصول و افزایش چشمگیر عمر انباری
- ۹ کدام مورد در میوه خرمالو، باعث کاهش گسی می‌شود؟
- (۱) تولید مولکول‌های بزرگتر و محلول تر
 - (۲) تولید مولکول‌های کوچکتر و نامحلول تر
 - (۳) تولید مولکول‌های کوچکتر و محلول تر
 - (۴) خشی شدن ساقه مارچوبه و شلغم در انبار، معمولاً در اثر کدام مورد است؟
- ۱۰ تأثیر نامطلوب اتیلن در انبار
- (۱) کمبود بر در بافت محصول در زمان برداشت
 - (۲) وجود غلظت بالای دی‌اکسید کربن در انبار
 - (۳) کمبود کلسیم در بافت گیاه در زمان برداشت
- ۱۱ پروتئین‌های شوک گرمایی (HSP)، چه نقشی دارند؟
- (۱) افزایش سرمادگی
 - (۲) افزایش آسیب گرمایی
 - (۳) حفاظت از پروتئین‌های دیگر
- ۱۲

- ۱۳ - کدام مورد در خصوص تنفس توسط محصولات باگبانی درست است؟

(۱) نشانه خوبی برای مقاومت به بیماری‌ها است.

(۲) نشانه خوبی برای جلوگیری از پیری است.

(۳) راهنمای خوبی برای استعداد عمر انباری است.

(۴) میزان تنفس، نشانه خوبی برای فعالیت آنابولیکی است.

- ۱۴ - کدام مورد در خصوص تولید اتیلن در میوه‌ها درست است؟

(۱) تغییرات اتیلن در میوه‌های فراز گرا تقریباً یکسان است.

(۲) میوه‌ها نسبت به اتیلن واکنش متفاوتی نشان می‌دهند.

(۳) تغییرات اتیلن در میوه‌های نافراز گرا در زمان نمو و رسیدن بسیار زیاد است.

(۴) نوع تنفس در بیشتر میوه‌ها را نمی‌توان با واکنش آنها نسبت به اتیلن و شیوه تولید آن تشخیص داد.

- ۱۵ - کاربرد کدام تنظیم کننده رشد و در چه مرحله‌ای از رشد میوه، نابسامانی رنگ‌گیری غیریکنواخت را بهبود می‌بخشد؟

(۲) جیبرلین - Nuaison

(۱) جیبرلین - Veraison

(۴) اتفن - Veraison

(۳) اتفن - Nuaison

- ۱۶ - بهترین روش اصلاحی ژنتیک‌های دانه‌الی نامرغوب باعث های قدیمی گردو در کشور چیست؟

(۱) سر شاخه کاری با بیوندک ارقام مرغوب

(۲) حذف کردن آنها و واکاری با ارقام مرغوب

(۳) محلول پاشی با اتیلن قبل از رسیدن محصول

(۴) گرده افشاری تکمیلی با استفاده از گرده ارقام مرغوب

- ۱۷ - برای انتخاب تراکم مناسب در کاشت بذرهای مو، چه نکاتی را باید مدنظر قرار دارد؟

(۱) حاصلخیزی خاک و نحوه آبیاری

(۲) قدرت رشدی بوته و مشکل بیماری‌ها

(۳) قدرت رشدی رقم، میزان و نوع مکانیزاسیون

(۴) میزان کود مصرفی، میزان آب در دسترس و ارتفاع از سطح دریا

- ۱۸ - چنانچه در هنگام گرده‌افشاری، کف باعث پوشیده از گل قاصدک باشد، رقم سیب Red Golden یا Red، میوه کمتری تولید می‌کنند و دلیل آن چیست؟

(۱) Red، چون ریزش‌های قبل از برداشت بیشتری دارد.

(۲) Golden، چون ریزش‌های قبل از برداشت بیشتری دارد.

(۳) Red، چون رقمی عمده‌ای خود ناسازگار است و نیاز به دگر گرده افشاری دارد.

(۴) Golden، چون رقمی عمده‌ای خود ناسازگار است و نیاز به دگر گرده افشاری دارد.

- ۱۹ - یک رقم روز کوتاه پیاز در اوایل فروردین در منطقه معتدله کشت و در اوایل خرداد از مزرعه نمونه‌گیری شده است. کدام مورد درست است؟

(۱) Leaf ratio بیشتر از ۱ است.

(۲) Bulbing ratio کمتر از ۲ است.

(۳) بوته دارای رشد رویشی زیاد است.

(۴) اندام ذخیره‌ای کوچک در گیاه تشکیل می‌شود.

- ۲۰ - علت سفید ماندن گوشت میوه گوجه فرنگی کدام است؟

(۱) کمبود منیزیم نسبت به پتاسیم

(۲) اختلال در جذب کلسیم و پتاسیم

(۳) نقش رطوبتی و تراکم بالای کشت

(۴) کمبود پتاسیم به نیتروژن مصرف شده

- ۲۱ - بهترین دما (درجه سانتی گراد) و دامنه رطوبت نسبی (درصد) برای انبار کردن سوچ پیاز خوراکی، به ترتیب کدام است؟

(۱) نزدیک صفر، ۶۵-۷۰

(۲) ۷۰-۸۰، ۱۰

(۳) ۷۰-۸۰، ۱۳

(۴) ۸۰-۹۰، ۱۵

- ۲۲ - پیاز برای غده دهی و عملکرد بالا، به چه شرایط محیطی از نظر طول روز و حرارت در اوخر دوره رشد نیاز دارد؟

(۲) بلند - نسبتاً بالا

(۱) کوتاه - پایین

(۴) کوتاه - نسبتاً بالا

(۳) بلند - پایین

- در چه موقعی از شبانه روز بیشترین افزایش طولی گیاهان، صورت می‌گیرد؟ -۲۳
 ۱) ظهر ۲) عصر ۳) ابتدای روز
 ماندگاری و طول عمر کدام گل شاخه بریده، بیشتر از بقیه است؟ -۲۴
 ۱) مریم ۲) آنتوریوم ۳) ارکیده
 در روز، Bending بیشتر به چه منظوری استفاده می‌شود؟ -۲۵
 ۱) حذف پاجوش‌ها ۲) سرزنه پاجوش‌ها
 ۳) افزایش تعداد شاخه گل ۴) افزایش تعداد گل روی یک شاخه
 کدام پایه روز، برای تکثیر پیوندی آن در ایران استفاده می‌شود؟ -۲۶
Rosa damescana (۴) *Rosa cordata* (۳) *Rosa manetti* (۲) *Rosa canina* (۱)
 تکثیر تجاری بنفسه آفریقایی از طریق کدام نوع قلمه صورت می‌گیرد؟ -۲۷
 ۱) ساقه ۲) برگ ۳) ریشه ۴) جوانه برگ
 در کدام حالت، تفکیک متجاوز (Transgressive segregation) برای یک صفت اتفاق افتاده است؟ -۲۸
 ۱) میانگین نتاج کمتر از میانگین والدین باشد.
 ۲) میانگین نتاج بیشتر از میانگین والدین باشد.
 ۳) برخی از نتاج برای آن صفت، برتر از والد برتر باشند.
 ۴) واریانس صفت در نتاج، بیشتر از واریانس والدین باشد.
 اگر وزن میوه برای میانگین والدین، والد برتر و نسل F_1 به ترتیب 40° , 30° و 50° گرم باشد. از راست به چپ هتروزیس و هتروبلتیزیس چند درصد خواهد بود؟ -۲۹
 ۱) $40^\circ - 80^\circ$ (۴) ۲) $66^\circ - 25^\circ$ (۳) ۳) $100^\circ - 75^\circ$ (۲) ۴) $50^\circ - 80^\circ$ (۱)
 سهم والد تکراری در زنوم نتاج در تلاقی بروگشتی سوم چند درصد است؟ -۳۰
 ۱) $75/00$ (۱) ۲) $87/50$ (۲) ۳) $93/75$ (۳) ۴) $97/50$ (۴)
 کدام روش اصلاحی، کارایی بالایی در اصلاح ارقام پر محصول دارد؟ -۳۱
 ۱) بالک ۲) شجره‌ای ۳) واریته مالتی لاین ۴) گرینش لینه‌های حاصل از F_1
 در کدام روش اصلاحی، امکان حذف ژنوتیپ‌های مطلوب، در اثر گزینش طبیعی بین نتاج بیشتر است؟ -۳۲
 ۱) بالک ۲) شجره‌ای ۳) بالک تک بدرا ۴) دابل هاپلوییدی
 ژنوتیپ گیاهی که دارای سه جور خامگی با حالت خامه کوتاه می‌باشد، کدام است؟ -۳۳
 ۱) ssMM ۲) SsMm ۳) SsMm ۴) SsMM
 از یک جمعیت درختان فندق با میانگین وزن دانه 2 g ، درختان با دانه‌های با وزن 2.5 g گرم گزینش و با هم تلاقی داده می‌شوند. اگر میانگین وزن میوه در نتاج 2.2 g گرم باشد، وراثت پذیری خصوصی صفت مذکور چند درصد است؟ -۳۴
 ۱) 20 ۲) 22 ۳) 25 ۴) 40
 در مورد یک صفت که به صورت پلی ژنیک و افزایشی کنترل می‌شود، اگر تعداد ژن‌های هتروزیگوت کنترل کننده صفت ۴ باشد، تعداد فنووتیپ‌ها در نسل F_1 کدام است؟ -۳۵
 ۱) 4 ۲) 5 ۳) 9 ۴) 10

- ۳۶- اگر خودناسازگاری در یک گیاه باعی وجود داشته باشد، در صورتی که ژنوتیپ افراد حاصل به صورت هموزیگوت باشد، خودناسازگاری از چه نوعی است؟
- (۱) اسپروفیتی
 - (۲) گامتوفیتی
 - (۳) اسپروفیتی و گامتوفیتی
 - (۴) اسپروفیتی یا گامتوفیتی
- ۳۷- پدیده طبیعی اینتروگرسیون معادل کدام روش اصلاحی در گیاهان است؟
- (۱) جهش
 - (۲) دورگیری
 - (۳) تلاقی برگشتی
 - (۴) گزینش دوره‌ای
- ۳۸- نسبت هموزیگوتی در فردی با ژنوتیپ $AABBCCcDd$ در نسل F_2 پس از خود گشتنی، چه میزان است؟
- $$\frac{4}{26} \quad \frac{9}{16} \quad \frac{3}{16} \quad \frac{1}{16}$$
- ۳۹- در کدام تلاقی، قابلیت ترکیب پذیری عمومی و خصوصی همزمان قابل محاسبه است؟
- (۱) پلی کراس
 - (۲) تاپ کراس
 - (۳) سینگل کراس
 - (۴) تلاقی دی آلل
- ۴۰- در یک تتراهیبریدیسم، چه نسبتی از افراد F_2 به ترتیب از راست به چپ، هر چهار صفت را به فرم غالب داشته و چه نسبتی از افراد در هر چهار صفت ناخالص هستند؟
- $$\frac{54}{256} \quad \frac{27}{256} \quad \frac{12}{256} \quad \frac{1}{256}$$
- ۴۱- به کدام علت، میوه‌های مبتلا به کمبود فسفر دیرتر می‌رسند؟
- (۱) تولید اتیلن کاهش یافته و جهش تنفسی ایجاد نمی‌شود.
 - (۲) فعالیت آنزیم فسفو فروکتوکیناز کاهش یافته و جهش تنفسی ایجاد نمی‌شود.
 - (۳) فعالیت آنزیم پلی گالاكتروناز کاهش یافته و دیواره سلول نرم نمی‌شود.
 - (۴) فعالیت آنزیم ADP-گلوکز پیروفسفوریلаз کاهش یافته و جهش تنفسی ایجاد نمی‌شود.
- ۴۲- حرکت عنصر منیزیوم (Mg) و یون فسفات در خاک به سطح ریشه، به ترتیب به چه طریقی صورت می‌گیرد؟
- (۱) انتشار - انتشار
 - (۲) انتشار - جریان توده‌ای
 - (۳) جریان توده‌ای - انتشار
- ۴۳- فرم یونی جذب عنصر سیلیسیوم (Si) و نیکل (Ni) توسط گیاه به چه شکل است؟
- $$Ni^{+}, Si^{-2} \quad Ni^{+}, Si^{+2} \quad Ni^{+2}, Si(OH)^{-}$$
- ۴۴- جایگاه ثبیت کاتیون‌ها بر روی ریشه گیاهان کدامند؟
- (۱) انواع ترکیبات اسیدهای آمینه، لیپیدها و ترکیبات ترشح شده از ریشه
 - (۲) ترکیبات متابولیت‌های ثانوی ترشح شده از ریشه به عنوان ترکیبات exudates
 - (۳) فسفولیپیدهای غشاها، جاذب کلسیم و سایر کاتیون‌ها
- ۴۵- مس در ساختمان کدام آنزیم شرکت دارد؟
- (۱) تربو سیناز
 - (۲) امولوسیون
 - (۳) اوره‌آز
 - (۴) نیترات ردوکتاز
- ۴۶- کدام موجود ثبیت‌کننده نیتروژن جو، در خاک‌هایی فعالیت دارند که از تهییه خوبی برخوردار هستند؟
- (۱) نوستوک
 - (۲) ازتو باکتر
 - (۳) آنانیا
 - (۴) کلستریدیوم
- ۴۷- اگر ۲ لیتر اسید نیتریک با خلوص 6% درصد و چگالی $1/5$ گرم بر میلی‌متر، با آب به حجم 100 لیتر رسیده باشد و از این محلول به نسبت $1:100$ برای کاهش pH محلول غذایی تزریق شود، غلظت نیتروژن (N) در محلول غذایی توسط این اسید، چقدر افزایش می‌یابد؟
- $$1) \frac{4}{15} \quad 2) \frac{1}{2} \quad 3) \frac{1}{100} \quad 4) \frac{1}{8}$$
- ۴۸- بازدارنده‌های جیبرلین، از چه طریق عامل پاکوتاهی در گیاه می‌شوند؟
- (۱) ممانعت از تولید اکسین‌ها
 - (۲) ممانعت از فتوسنتر
 - (۳) ممانعت از تولید سیتوکینین‌ها
 - (۴) ممانعت از ساختن GA_{12} آلدئیدی

-۴۹- کدام عنصر غذایی گیاه، در تثبیت CO_2 توسط آنزیم ریبولوز بیفسفات کربوکسیلاز، نقش دارد؟

Mn (۴) Mg (۳) Ca (۲) Fe (۱)

-۵۰- دلیل تشکیل رنگ قرمز در برگ‌های مبتلا به کمبود نیتروژن، کدام است؟

(۱) افزایش اسیدهای آمینه، تجمع مواد قندی و افزایش قدرت محل مصرف

(۲) مختل شدن پروتئین‌سازی، کاهش تعداد و قدرت محل مصرف و تجمع قند

(۳) مختل شدن پروتئین‌سازی، تجمع اسیدهای آمینه و افزایش پلی آمین‌ها

(۴) افزایش پروتئین‌سازی، تجمع مواد فتوسنتری و تشکیل آنتوسیانین

-۵۱- فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز، برای سنجش کدام عنصر استفاده می‌شود؟

Zn (۴) Mo (۳) Mn (۲) N (۱)

-۵۲- غلظت عناصر غذایی موبایل مثل N و P و K در برگ‌های درختان میوه که بارآوری سالیانه دارند به چه شکل تغییر می‌کند؟


(۱) در سال‌های بارده و غیر بارده، غلظت عناصر در برگ‌ها تغییری نمی‌یابد.

(۲) در سال‌های بارده، غلظت عناصر در برگ‌ها افزایش یافته و در سال‌های غیر بارده غلظت عناصر کاهش می‌یابد.

(۳) در سال‌های بارده، غلظت عناصر در برگ‌ها کم شده و در سال‌های بارده غلظت عناصر افزایش می‌یابد.

(۴) در سال‌های بارده، غلظت عناصر در برگ‌ها کاهش یافته و به سمت میوه‌ها حرکت می‌نماید.

-۵۳- رابطه بین غلظت یک عنصر در محلول خاک و شدت جذب آن توسط گیاه در منحنی زیر آمده است، مقدار I یا شدت جذب در رابطه Michaelis-Menten، کدام است؟



$$\frac{I_{\max}(C_s - C_{\min})}{K_m + (C_s - C_{\min})} \quad (1)$$

$$\frac{I_{\max}(C_s + C_{\min})}{K_m(C_s + C_{\min})} \quad (2)$$

$$\frac{K_m(C_s - C_{\min})}{I_{\max} + (C_s + C_{\min})} \quad (3)$$

$$\frac{I_{\max} + (C_s - C_{\min})}{K_m(C_s - C_{\min})} \quad (4)$$

-۵۴- عمده فسفر موجود به صورت اسید فیتیک (Phytic acid) در کدام عضو گیاه، وجود دارد؟

(۱) بذر (۲) برگ (۳) ریشه (۴) میوه

-۵۵- در گل میخ (Carnation)، اتیلن بیشتر توسط چه اندام‌هایی تولید می‌شود؟

(۱) خامه و پرچم (۲) کلاله و بساک (۳) خامه و گلبرگ (۴) پرچم و گلبرگ

-۵۶- 1-MCP در کدام گل بریدنی تأثیری مشابه STS دارد؟

(۱) سوسن (۲) فریزیا (۳) میخ کخشیده (۴) میخ استاندارد

-۵۷- شباهت یک گیاه روز بلند کیفی با یک گیاه روز کوتاه غیر اجباری، چیست؟

(۱) هر دو روز بی تفاوت هستند. (۲) هر دو روز بلند اختیاری هستند.

(۳) هر دو در روز کوتاه می‌توانند گل بدeneند. (۴) هر دو روز بلند می‌توانند گل بدeneند.

-۵۸- کدام شرایط برای انبار کردن گلهای شاخه بریده مناسب‌تر است؟

(۱) دمای پایین، رطوبت بالا و تاریکی (۲) دمای پایین، رطوبت پایین و تاریکی

(۳) دمای بالا، رطوبت بالا و روشنایی (۴) دمای پایین، رطوبت بالا و روشنایی

-۵۹- تحت کدام شرایط انباری، خواب کورمهای گلایول سریع‌تر شکسته می‌شود؟

(۱) دمای ۱۰ درجه سانتی‌گراد - انبار مرطوب (۲) دمای ۱۵ درجه سانتی‌گراد - انبار مرطوب

(۳) دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد - انبار خشک (۴) دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد - انبار خشک

- ۶۰ در کدام مورد، همه گیاهان چهار کربنه می‌باشند؟
 ۱) Bentgrass ، Bluegrass ، Bermudagrass
 ۲) Bahiagrass ، Bluegrass ، Bermudagrass
 ۳) Bahiagrass ، Bermudagrass ، Zoysiagrass
 ۴) Perennial Ryegrass ، Bentgrass ، Bermudagrass
- ۶۱ کربوهیدرات‌های ذخیره‌ای در چمن‌های فصل گرم و فصل سرد به ترتیب کدام است؟
 ۱) نشاسته - فروکتان ۲) فروکتان - نشاسته ۳) گلوکز - فروکتان ۴) نشاسته - گلوکز
- ۶۲ در ایجاد و توسعه کاسه شکافی میخک، به ترتیب کدام عناصر تأثیر بیشتری دارد؟
 ۱) کلسیم - منگنز ۲) پتاسیم - بر ۳) منیزیم - کلسیم ۴) کلسیم - بر
- ۶۳ تغییرات pH محلول‌های غذایی، چه تأثیری در ماندگاری پس از برداشت گل‌های شاخه بریده دارد؟
 ۱) pH بالا، جذب آب و ماندگاری را افزایش می‌دهد.
 ۲) pH بالا، جذب آب را کاهش و ماندگاری را افزایش می‌دهد.
 ۳) pH پایین، جذب آب و ماندگاری را افزایش می‌دهد.
 ۴) pH پایین، جذب آب را کاهش و ماندگاری را افزایش می‌دهد.
- ۶۴ در چمن‌ها، ترتیب حساسیت از بیشتر به کمتر در تنفس خشکی کدام است؟
 ۱) ریشه - شاخصاره ۲) شاخصاره - ریشه ۳) برگ - طوقه ۴) طوقه - برگ
- ۶۵ کدام دسته از گل‌های فصلی، مقاوم به سرمای زمستان هستند؟
 ۱) آهار - همیشه بهار - رعنای زیبا ۲) بنفشه معمولی - میمون - ختمی پر پر
 ۳) سلوی(مریم گلی) - همیشه بهار - شقایق زرد ۴) همیشه بهار - بنفشه معمولی - میناچمنی
- ۶۶ کدام مورد در خصوص گیاه زینتی *Oxalis cernua* صحیح است؟
 ۱) تک لپه‌ای، کورم دار با صفحه قاعده‌ای است.
 ۲) دو لپه‌ای، کورم دار با صفحه قاعده‌ای است.
 ۳) دو لپه‌ای، سوخته با فلس‌ها و برگ‌های قاعده‌ای است.
 ۴) تک لپه‌ای، سوخته با فلس‌ها و برگ‌های قاعده‌ای است.
- ۶۷ تحریک گلدهی با اتیلن در زنبق با چه تغییر مورفوژوژیکی دیگری همراه است؟
 ۱) کاهش تعداد برگ ۲) افزایش تعداد برگ ۳) گل‌های ریزتر ۴) ریزش برگ
- ۶۸ در جنس *Dendrobium* ارکیده، گل‌های حاصل از پلی پلوفیلیدی چه تفاوتی با گل‌های دیپلوفیلید دارند؟
 ۱) تفاوتی از نظر پر پر بودن و بزرگ‌تر بودن گل‌ها مشاهده نمی‌شود ولی تعداد گل حاصل از پلی پلوفیلیدی بیشتر است.
 ۲) در پلی پلوفیلیدی، خوش‌های گل کوتاه‌تر، تعداد گل بیشتر و تعداد گلبرگ کاهش می‌یابد.
 ۳) در پلی پلوفیلیدی، گل‌ها بزرگ‌تر، خوش‌ها و تعداد گل هم بیشتر می‌شود.
 ۴) گل‌های پلی پلوفیلیدی، پر پرتر و بزرگ‌تر، خوش‌ها کوتاه‌تر و تعداد گل‌ها کمتر می‌شود.
- ۶۹ رنگ زرد وارد شده به رزهای موجود از کدام گونه رز منشاء گرفته است؟
 ۱) *Rosa damascena* ۲) *Rosa canina*
 ۳) *Rosa hemispherica* ۴) *Rosa foetida*
- ۷۰ کاسه گل در ارقام مقاوم به کاسه - شکافی (Calyx splitting) در میخک چگونه است؟
 ۱) بلند و قطرور ۲) کوتاه و قطرور ۳) کوتاه و باریک ۴) بلند و باریک
- ۷۱ کدام مورد در خصوص بگونیا درست است؟
 ۱) این گیاه نر عقیم است.
 ۲) دارای گل‌های کامل است.
 ۳) گل‌های نر و ماده روی دو پایه مجزا قرار دارند.
 ۴) گل‌های نر و ماده روی یک پایه و جدا از هم قرار دارند.

- ۷۲ کدام مورد در خصوص بنفسه صحیح است؟

- (۱) عادت رشد خزنه نسبت به حالت ایستاده غالب است.
- (۲) رنگ سیاه (مایل به بنفش) گل با حضور ۵ ژن ایجاد می‌شود.
- (۳) روش گزینش توده‌ای، کاربردی در بهنژادی بنفسه ندارد.
- (۴) رنگ سیاه (مایل به بنفش) گل، با ۳ ژن بازدارنده کنترل می‌شود.

- ۷۳ کدام مورد، بهترین هدف اصلاحی آنتوریوم می‌باشد؟

- (۱) افزایش عطر گل
- (۲) افزایش عملکرد
- (۳) افزایش ماندگاری
- (۴) افزایش مقاومت به آفات در شیپوری (*Zantedeschia*) رنگ زرد چمچمه (Spath)، حاصل تلاقي کدام ارقام است؟

- ۷۴ (۱) صورتی و کرمی

(۲) قرمز و صورتی

(۳) سفید و کرمی

- ۷۵ کدام گزینه در مورد رز صحیح می‌باشد؟

- (۱) توارث عطر گل با یک ژن کنترل می‌شود که نسبت به بدون عطر مغلوب است.

(۲) پرپری با یک ژن کنترل می‌شود که در حالت غالب بیان می‌گردد.

(۳) هر چه آلل‌های غالب بیشتر باشد تأثیری در میزان پرپری ندارد.

(۴) جهش، تأثیری در تغییر رنگ گل نداشته است.

- ۷۶ کدام مورد در خصوص اطلسی صحیح است؟

- (۱) حالت پرپری بر کم پری غالب است و همبستگی با ماده سترونی دارد.

(۲) حالت پرپری بر کم پری غالب است و همبستگی با نر سترونی دارد.

- (۳) حالت کم پری بر پرپری غالب است و همبستگی با ماده سترونی دارد.

(۴) حالت کم پری بر پرپری غالب است و همبستگی با نر سترونی دارد.

- ۷۷ بیشتر چمن‌های موجود از کدام روش بهنژادی به دست آمدند؟

- (۱) گزینش طبیعی و بعد انتقال ژن

(۲) اهلی سازی و بعد انتقال ژن

- (۳) گزینش طبیعی و بعد دو رگ‌گیری

- ۷۸ **Danه گرده** تاریخت به چه منظوری صورت می‌گیرد؟

- (۱) جلوگیری از انتقال تراژن به سایر گیاهان

(۲) افزایش تولید دانه گرده

(۳) افزایش تنزگی دانه گرده

(۴) جلوگیری از خود گرده افشاری

- ۷۹ کدام مورد درست است؟

- (۱) در صفات کمی، شرایط محیطی کمتر دخالت دارد.

(۲) در صفات کیفی، تعداد ژن کمتری دخالت دارد.

- ۸۰ چرا در دوهه اخیر، بیشتر برنامه‌های بهنژادی در اطلسی به تولید ارقام نوع **multiflora** پرداخته است؟

- (۱) ارقام تولیدی از نوع **grandiflora** دارای گل‌ها و شاخه‌های کمی است.

(۲) ارقام تولیدی از نوع **multiflora** دارای گل‌های زیادی بوده و شاخه‌های بلند تولید می‌کنند.

(۳) از ارقام تولید شده از نوع **multiflora** به عنوان گیاه پوششی هم می‌توان استفاده کرد.

(۴) ارقام حاصل از نوع **grandiflora**، به بیماری، آفات و تنش‌های محیطی حساس هستند.