



330

F

نام :

نام خانوادگی :

محل امضاء :

صبح پنجشنبه  
۹۲/۱۱/۱۷



اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.  
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
سازمان سنجش آموزش کشور

### آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل – سال ۱۳۹۳

#### مجموعه مهندسی تولیدات گیاهی

(اصلاح گیاهان باغبانی - تولیدات محصولات باغبانی)

کد ۱۳۱۰

مدت پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۱۵۰

#### عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی	۳۰	۱	۲۰
۲	باغبانی (میوه‌کاری، گلکاری، سبزی کاری)	۳۰	۳۱	۶۰
۳	ژنتیک و اصلاح نباتات	۳۰	۶۱	۹۰
۴	فیزیولوژی گیاهی	۳۰	۹۱	۱۲۰
۵	طرح آزمایشات کشاورزی	۳۰	۱۲۱	۱۵۰

بهمن ماه سال ۱۳۹۲

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی‌باشد.

این آزمون نمره منفی دارد.

### Part A: Vocabulary

**Directions:** Choose the word or the phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark your answer sheet.

- 1- Mrs. Harding herself was thin and frail but her son was a \_\_\_\_\_ sixteen-year-old.  
1) unbearable      2) verbose      3) sturdy      4) lethargic
- 2- Some tribes still \_\_\_\_\_ the more remote mountains and jungles of the country.  
1) forego      2) inhabit      3) ensue      4) aggravate
- 3- The \_\_\_\_\_ of coffee brought Christine into the small cafe.  
1) aroma      2) fragility      3) whim      4) badge
- 4- The client \_\_\_\_\_ our proposal because they found our presentation banal and unimpressive.  
1) recognized      2) emulated      3) hailed      4) rejected
- 5- Immediately overcome by \_\_\_\_\_ for the wrong he had done, I lowered him to the floor and tried to apologize.  
1) remorse      2) charity      3) stubbornness      4) esteem
- 6- A health inspector gave \_\_\_\_\_ instructions on how to correct the problem; we all found out how to handle the situation.  
1) perpetual      2) rudimentary      3) explicit      4) trivial
- 7- I \_\_\_\_\_ the cold I was getting by taking plenty of vitamin C pills and wearing a scarf.  
1) vanished      2) squandered      3) forestalled      4) penetrated
- 8- Why would Ian want to claim his inheritance and then give all his money away? It was a \_\_\_\_\_ to me.  
1) riddle      2) peril      3) glory      4) fragment
- 9- He was later accused of writing \_\_\_\_\_ loan and deposit records, found guilty and sentenced to three years of imprisonment.  
1) essential      2) fraudulent      3) vulgar      4) witty
- 10- The question of how the murderer had gained entry to the house \_\_\_\_\_ the police for several weeks.  
1) exhilarated      2) assailed      3) countered      4) perplexed

### Part B: Cloze Passage

**Directions:** Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark your answer sheet.

Scuba diving is a form of underwater diving in which a diver uses a self-contained underwater breathing apparatus (scuba) to breathe underwater.

Unlike other modes of diving, (11) \_\_\_\_\_ rely either on breath-hold or on air pumped from the surface, scuba divers carry their own source of breathing gas, (usually compressed air), (12) \_\_\_\_\_ greater freedom of movement than with an air line or diver's umbilical and longer underwater endurance than breath-hold. Scuba equipment may be open circuit, in which exhaled gas (13) \_\_\_\_\_ the surroundings, or closed or semi-closed circuit, (14) \_\_\_\_\_ is scrubbed to remove carbon dioxide, and (15) \_\_\_\_\_ replenished from a supply of feed gas before being re-breathed.

- 11- 1) that      2) on which they      3) which      4) they
- 12- 1) allowing them      2) they allow      3) allowed them      4) to allow
- 13- 1) exhausts      2) is exhausted to      3) exhausting      4) be exhausted
- 14- 1) where the gas breathing  
3) the breathing gas which      2) which breathes the gas  
4) in which the breathing gas
- 15- 1) the oxygen is used  
3) uses the oxygen to be      2) the oxygen used is  
4) used is the oxygen

**Part C. Reading Comprehension**

**Directions:** *Read the following three passages and choose the best choice (1), (2), (3) or (4). Then mark it on your answer sheet.*

**PASSAGE 1**

Plant cutting, also known as striking or cloning, is a technique for vegetatively (asexually) propagating plants in which a piece of the stem or root of the source plant is placed in a suitable medium such as moist soil, potting mix, coir or rock wool. The cutting produces new roots, stems, or both, and thus becomes a new plant independent of the parent. Typically, striking is a simple process in which a small amount of the parent plant is removed. This removed piece, called the cutting, is then encouraged to grow as an independent plant. Since most plant cuttings will have no root system of their own, they are likely to die from dehydration if the proper conditions are not met. They require a moist medium, which, however, cannot be too wet lest the cutting rot. A number of media are used in this process, including but not limited to soil, perlite, vermiculite, coir, rock wool, expanded clay pellets, and even water given the right conditions. The environment should be humid and partial shade should be provided, also to prevent the cutting from drying out. After cuttings are placed in the medium, they are watered thoroughly with a fine mist, such as from a nozzle sprayer or a spray mister bottle. After the initial watering, the medium is allowed to almost dry out before misting again, with the aim to keep the soil moist but not wet and waterlogged. A fine mist is used to avoid disturbing plants. Some plants form roots much more easily. Most succulent cuttings can be left on a table and small roots will form, and some other plants can form roots from having their cuttings placed in a cup of water.

**16. The passage best suggests that.....**

1. proper cloning needs some initial dehydration
2. the striking media are generally kept rather dry
3. watering takes place on the already misted soil
4. nozzle sprayers include a spray mister bottles

**17. We understand from the passage that.....**

1. even very fine mist can disturb some cloned plants
2. propagating plants is done both vegetatively and asexually
3. water may not be needed for some plant cuttings at all
4. root systems develop early only if root cuttings are used

**18. The passage states that.....**

1. cloning should not done in direct sunlight
2. cuttings form roots if placed in a lot of water
3. root cuttings turn to independent plant more easily
4. parent plants may grow as dependent plants

**19. The passage points to the fact that.....**

1. striking is done both the summer and winter
2. root cuttings need more humidity than stems
3. potting mix is a mixture of moist soil and rock wool
4. cuttings will not rot in expanded clay pellets

**20. The word ‘coir’ in the passage (underlined) is closest to.....**

1. ‘kiwi’
2. ‘coconut’
3. ‘pineapple’
4. ‘mango’

## PASSAGE 2

The hypocotyl is the stem of a germinating seedling, found below the cotyledons (seed leaves) and above the radicle (root). As the plant embryo grows at germination, it sends out a shoot called a radicle that becomes the primary root and penetrates down into the soil. After emergence of the radicle, the hypocotyl emerges and lifts the growing tip (usually including the seed coat) above the ground, bearing the embryonic leaves (called cotyledons) and the plumule that gives rise to the first true leaves. The hypocotyl is the primary organ of extension of the young plant and develops into the stem.

The early development of a monocot seedling like cereals and other grasses is somewhat different. A structure called the coleoptile, essentially a part of the cotyledon, protects the young stem and plumule as growth pushes them up through the soil. A mesocotyl—that part of the young plant that lies between the seed (which remains buried) and the plumule—extends the shoot up to the soil surface, where secondary roots develop from just beneath the plumule. The primary root from the radicle may then fail to develop further. The mesocotyl is considered to be partly hypocotyl and partly cotyledon.

Not all monocots develop like the grasses. The onion develops in a manner similar to the first sequence described above, the seed coat and endosperm (stored food reserve) pulled upwards as the cotyledon extends. Later, the first true leaf grows from the node between the radicle and the sheath-like cotyledon, breaking through the cotyledon to grow past it.

In some plants, the hypocotyl becomes enlarged as a storage organ. Examples include cyclamen, gloxinia and celeriac. In cyclamen, this storage organ is called a tuber.

### 21. According to the passage,.....

1. plumules protect young stems while pushed through the soil
2. primary organ of extension in young plants is the seed coat
3. young plants do not need a mesocotyl in their seed
4. hypocotyls do not always grow into stems above ground

### 22. It is stated in the passage that.....

1. onions grow unaided by coleoptiles
2. the radicle is actually like a small onion
3. most hypocotyls grow into cotyledons
4. secondary roots have several cotyledons

### 23. The passage points to the fact that.....

1. the endosperm is pulled upwards into the hypocotyl
2. no plumule can be developed before the radical appears
3. monocot cereals grow differently from grasses
4. primary roots germinate into several thin but long radicles

### 24. The passage mentions that.....

1. radicles fail to develop without the seed coat
2. seedlings have radicles in their cotyledons
3. monocot seedlings grow two types of roots
4. the seed remains buried within the plumule

### 25. The word ‘celeriac’ in the passage (underlined) is a variety of celery with a root most like a.....

1. ‘parsley’
2. ‘melon’
3. ‘turnip’
4. ‘pepper’

### PASSAGE 3

In botany, a tendril is a specialized stem, leaf or petiole with a threadlike shape that is used by climbing plants for support, attachment and cellular invasion by parasitic plants, generally by twining around suitable hosts. They do not have a lamina or blade, but they can photosynthesize. They can be formed from modified shoots, modified leaves, or auxiliary branches and are sensitive to airborne chemicals, often determining the direction of growth, as in species of *Cuscuta*. The earliest and most comprehensive study of tendrils was Charles Darwin's monograph *On the Movements and Habits of Climbing Plants*, which was originally published in 1865. This work also coined the term circumnutation to describe the motion of growing stems and tendrils seeking supports. In the garden pea, it is only the terminal leaflets that are modified to become tendrils. In other plants such as the yellow vetch (*Lathyrus aphaca*), the whole leaf is modified to become tendrils while the stipules become enlarged and carry out photosynthesis. Still others use the rachis of a compound leaf as a tendril, such as members of the genus *Clematis*. The specialised pitcher traps of *Nepenthes* plants form on the end of tendrils. The tendrils of aerial pitchers are usually coiled in the middle. If the tendril comes into contact with an object for long enough it will usually curl around it, forming a strong anchor point for the pitcher. In this way, the tendrils help to support the growing stem of the plant. Tendrils of *Cuscuta*, a parasitic plant, are guided by airborne chemicals, and only twine around suitable hosts.

**26. According to the passage,.....**

1. it is possible for the entire leaf to develop into a tendril
2. some tendrils curl around objects without touching them
3. tendrils in the genus *Clematis* form the rachis of leaves
4. tendrils seek support from the circumnutation in a plant

**27. We could conclude from the passage that some tendrils .....**

- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 1. are 'invisible' | 2. dry quickly       |
| 3. bear fruit      | 4. are 'intelligent' |

**28. The passage points to the fact that.....**

1. the yellow vetch consists of several leaves
2. there was no study on tendrils before 1865
3. parasitic plants twine around suitable hosts
4. *Nepenthes* form the end of some tendrils

**29. We may best understand from the passage that.....**

1. auxiliary branches have modified side shoots
2. stipules become enlarged for photosynthesis
3. pitchers are coiled in the middle of the stem
4. photosynthesis occurs in the lamina or blade

**30. The word 'anchor' in the passage (underlined) is originally used for.....**

- |             |              |
|-------------|--------------|
| 1. 'trains' | 2. 'glasses' |
| 3. 'ships'  | 4. 'plates'  |

-۳۱ سرمای زمستان سال ۱۳۸۶ در برخی از مناطق ایران باعث صدمه دیدن کدام یک از باغهای درختان میوه تا حد ۹۰% و بیشتر گردید؟

- (۱) باغهای انار در شهرستان ساوه
- (۲) باغهای گردو در شهرستان دماوند
- (۳) باغهای هلو در شهرستان گرگان

برای تولید نهال کیوی کدام روش را ترجیح می‌دهید؟

- (۱) کاشت بذر از پایه مناسب کیوی و پیوند رقم مناسب روی آن
- (۲) ریشه‌دار کردن قلمه پایه مناسب کیوی و پیوند رقم مناسب روی آن
- (۳) ریشه‌دار کردن قله بوته نر کیوی و پیوند رقم مناسب بر روی آن
- (۴) دورگ‌گیری بین گونه‌های *A. chinensis* × *A. deliciosa* و کاشت بذر آنها و تولید گیاه قوی بدليل هتروسیس و پیوند رقم مناسب روی آن

کشت و کار نخل خرما در مناطق حاره‌ای مناسب .....

-۳۲ (۱) نیست، زیرا مشکلات زیادی در گرده افزایی و میوه بندی رخ می‌دهد.

(۲) نیست، زیرا نیاز سرمایی جهت تشکیل جوانه‌های گل برآورده نمی‌شود.

(۳) است، زیرا در این مناطق کمبود آب معمولاً وجود ندارد.

(۴) است، زیرا در مناطق حاره خاک‌های غنی از مواد آلی وجود دارد.

در مناطق نیمه گرمسیری، گل انگیزی انبه در چه شرایطی انجام می‌شود؟

(۱) در دماهای بالای ۱۵ درجه سانتی‌گراد و حضور برگ الزامی است.

(۲) در دماهای زیر ۱۵ درجه سانتی‌گراد و حضور برگ الزامی است.

(۳) در دماهای بالا ۱۵ درجه سانتی‌گراد و حضور برگ نقشی ندارد.

(۴) در دماهای زیر ۱۵ درجه سانتی‌گراد و حضور برگ الزامی نیست.

ارقام انگور موجود در ایران از چه گونه‌ای بوده و تا چه دمایی را تحمل می‌کنند؟

-۳۳ -*V. riparia* - شرایط خشکی خاک را بخوبی تحمل می‌کند.

(۱) - معمولاً نمی‌تواند درجه حرارت کمتر از ۱۵°C را تحمل کند.

(۲) - در شرایط شوری خاک بهتر از شرایط خشکی رشد و نمو می‌کند.

(۳) -*V. champini* در شرایط شوری خاک بهتر از شرایط خشکی رشد و نمو می‌کند.

(۴) -*V. Labrusca* در مناطقی کشت می‌شود که دارای سرمایی زیر بین بندان (۴۰°C) می‌باشد.

از پایه‌های ذیل کدام یک شرایط آب گرفتگی را بهتر تحمل می‌کنند؟

- (۱) پایه‌های بادام
- (۲) پایه‌های زردآلو
- (۳) پایه‌های آلو
- (۴) پایه‌های هلو

-۳۷ در صورتیکه طول عمر کیسه جنینی رقمی از سیب در دمای ۱۲ درجه سانتی‌گراد ۷ روز باشد و از زمان گرده‌افشانی تا تلقیح

۷۲ ساعت طول بکشد دوره مؤثر گرده‌افشانی این رقم سیب چند روز است؟

- (۱) ۱۰
- (۲) ۴
- (۳) ۱۰
- (۴) ۱۴

-۳۸ گلدهی شاتون نر و گل ماده در گردو به چه صورتی است؟

(۱) گل نر و ماده بصورت جانبی روی شاخه فصل جاری

(۲) گل نر و ماده بصورت جانبی روی شاخه یکساله

(۳) شاتون نر بصورت جانبی روی شاخه یکساله - گل ماده بصورت انتهایی روی شاخه فصل جاری

(۴) شاتون نر بصورت انتهایی روی شاخه یکساله - گل ماده بصورت انتهایی روی شاخه یکساله

-۳۹ کدام یک از هورمون‌های گیاهی زیر توانایی به تأخیراندازی گلدهی درختان پسته را به منظور جلوگیری از خطر سرمازدگی بهاره را دارند؟

- (۱) پکلوبوترازول
- (۲) سیتوکنین
- (۳) اکسین
- (۴) ابسیسیک اسید

<p>کدام یک از پایه‌های هسته داران رطوبت خاک را بهتر تحمل می‌کند؟</p> <p>(۱) هلو</p> <p>(۲) بادام</p> <p>(۳) زردآلو قیسی</p> <p>(۴) آلو میروبالان</p>	<p>در کدام یک از گل‌های فصلی زیر برگ‌های زینتی آن اهمیت بیشتری دارد؟</p> <p>(۱) <i>Celosia sp.</i> (۴)</p> <p>(۲) <i>Ageratum sp.</i> (۳)</p> <p>(۳) <i>Amaranthus sp.</i> (۲)</p> <p>(۴) <i>Portulaca sp.</i></p>	<p>کدام یک از گیاهان زینتی زیر دو پایه است؟</p> <p>(۱) گل حنا - سیکاس</p> <p>(۲) پامچال - بگونیای همیشه گلدار</p> <p>(۳) بگونیای همیشه گلدار - مارچوبه زینتی</p>
		<p>کدام دسته از گیاهان زینتی زیر نیاز آبی کمتری دارد؟</p> <p>(۱) کالانکوا ، ناز یخی ، زنبق رشتی</p> <p>(۲) کراسولا، آلوئه ورا ، پریوش (پروانش)</p> <p>(۳) کاکتوس، مارگریت، قرنفل</p>
		<p>در چه صورتی برآکته‌ها سبز شده و شبیه برگ می‌شوند؟</p> <p>(۱) رنگ برآکته‌ها قابل برگشت نیست.</p> <p>(۲) ادامه شرایط روز کوتاه پس از گل آغازی و پس از ریزش دانه گردد</p> <p>(۳) قرارگیری گیاهان در شرایط روز بلند پس از گل آغازی و پس از ریزش دانه گردد</p> <p>(۴) قرارگیری گیاهان در شرایط روز بلند پس از گل آغازی ولی پیش از ریزش دانه گردد</p>
		<p>کدام گزینه در مورد گیاه پرنده بهشتی (<i>Strelitzia</i>) صحیح می‌باشد؟</p> <p>(۱) دارای سه کاسبرگ آبی و سه گلبرگ نارنجی رنگ می‌باشد.</p> <p>(۲) دارای سه کاسبرگ نارنجی و سه گلبرگ آبی رنگ می‌باشد.</p> <p>(۳) دارای سه کاسبرگ و سه گلبرگ آبی رنگ می‌باشد.</p> <p>(۴) دارای سه کاسبرگ و سه گلبرگ قرمز یا نارنجی رنگ می‌باشد.</p>
		<p>کاربرد کدام تنظیم کننده‌های رشد را جهت شکستگی رکود در گل‌های پیازی زینتی توصیه می‌نمایید؟</p> <p>(۱) ABA و GA<sub>3</sub> (۴)</p> <p>(۲) GA<sub>3</sub> و BA (۳)</p> <p>(۳) BA و NAA (۲)</p> <p>(۴) CCC و GA<sub>3</sub></p>
		<p>کدام مورد از ویژگی‌های <i>Frankenia</i> می‌باشد؟</p> <p>(۱) مقاومت به خشکی - شوری - سایه</p> <p>(۲) مقاومت به سرما - شوری - گرما</p> <p>(۳) مقاومت به سرما - خشکی - پاخوری</p>
		<p>برای جلوگیری از آفتاب سوختگی درختان پوست زینتی حساس، کدام روش را توصیه می‌نمایید؟</p> <p>(۱) Trunk wrapping (۴)</p> <p>(۲) Girdling (۳)</p> <p>(۳) Mulching (۲)</p> <p>(۴) Blanching</p>
		<p>کدام گزینه در مورد چمن‌ها صحیح می‌باشد؟</p> <p>(۱) چمن‌های فصل سرد CAM و چمن‌های فصل گرم C4 می‌باشند.</p> <p>(۲) چمن‌های فصل سرد C3 و چمن‌های فصل گرم CAM می‌باشند.</p> <p>(۳) چمن‌های فصل سرد C4 و چمن‌های فصل گرم C3 می‌باشند.</p> <p>(۴) چمن‌های فصل سرد C3 و چمن‌های فصل گرم C4 می‌باشند.</p>
		<p>کدام یک از چمن‌ها زیر دارای بافت درشتی بوده، نیاز آبی آن پایین است و در چهار فصل سال (در نواحی بینایین (Transition zone)) سبز باقی می‌ماند؟</p> <p>(۱) <i>Poa pratensis</i> (۲)</p> <p>(۲) <i>Lolium perenne</i> (۱)</p> <p>(۳) <i>Cynodon dactylon</i> (۴)</p> <p>(۴) <i>Festuca arundinaceae</i></p>
		<p>کدام یک از پدیده‌های زیر کمک شایانی به اصلاح ارقام پیاز نموده است؟</p> <p>(۱) نر عقیمی</p> <p>(۲) ناسازگاری</p> <p>(۳) یک پایه بودن</p> <p>(۴) دگرگشتنی</p>

- ۵۲ سیاه شدن داخل ریشه چغندر لبویی بیشتر به دلیل کمبود عنصر (عناسنی) هم چون ..... می‌باشد.
- (۱) نیتروژن (۲) کلسیم (۳) بور (بر) (۴) مولیبدن
- ۵۳ کدام گزینه در مورد اختلاف اسفنаж‌های نر و ماده درست است؟
- (۱) اسفناج‌های نر دیرتر به گل می‌روند.  
 (۲) اندازه بوته اسفناج‌های نر بزرگتر است.  
 (۳) اسفناج‌های نر از عملکرد کمتری برخوردار هستند.  
 (۴) اسفناج‌های نر از میزان قند و کلروفیل بیشتری برخوردار هستند.
- ۵۴ کدام گزینه در مورد میزان تجمع نیترات در اندام‌های مختلف سبزیجات صحیح است؟
- (۱) برگ < ریشه < ساقه < میوه < بذر  
 (۲) برگ < ساقه < بذر < ریشه  
 (۳) برگ < ساقه < میوه < بذر < ریشه
- ۵۵ علت تلخی (bitterness) در برگ‌های کاهو چیست؟
- (۱) دمای بالا  
 (۲) آبیاری زیاد  
 (۳) دمای پایین  
 (۴) مصرف کود نیتروژن زیاد
- ۵۶ استفاده از مالج‌های پلی‌اتیلن در محصولات فصل گرم معمولاً .....
- (۱) با حفظ رطوبت خاک باعث زودرسی و افزایش عملکرد می‌گردد.  
 (۲) باعث ایجاد گرما و سوختگی محصول می‌گردد.  
 (۳) باعث دیررسی و افزایش عملکرد می‌گردد.  
 (۴) اثری روی محصولات فصل گرم ندارد.
- ۵۷ نشاءهای سبزی‌هایی که مقاوم‌سازی شده‌اند دارای چه خصوصیاتی هستند؟
- (۱) رنگ برگ‌ها متمایل به صورتی و بزرگتر  
 (۲) برگ‌های با رنگ سبز روشن و کوچکتر  
 (۳) برگ‌های با رنگ سبز تیره و بزرگتر
- ۵۸ ارتفاع کوتاه گیاه به همراه رنگ ارغوانی در برگ‌های نشاء به علت کدام عامل است؟
- (۱) کمبود نور (۲) کمبود نیتروژن (۳) کمبود فسفر (۴) دمای زیاد خزانه
- ۵۹ هنگام برداشت محصول در مارچوبه:
- (۱) ساقه‌های ذخیره‌ای زیرزمینی برداشت می‌شوند.  
 (۲) به علت دائمی بودن، برداشت هر ساله و در طول سال انجام می‌شود.  
 (۳) معمولاً ساقه‌های گل دهنده (Stalk) برداشت می‌شوند.  
 (۴) برداشت متعادل برای داشتن محصول در سال آینده ضروری است.
- ۶۰ کدام یک از واریته‌های چغندر (Beta vulgaris) به عنوان چغندر لبویی شناخته می‌شود؟
- Conditiva (۴) Variegata (۳) Rosea (۲) Cycla (۱)

- ۶۱ اگر دو زن پیوسته در وضعیت سیس با احتمال ۲۰ درصد از هم جدا شوند، چند درصد نتاج حاصل از تست کراس فردی که حامل این دو زن باشد فنوتیپ کاملاً غالب را نشان خواهد داد؟
- (۱) ۱۰ (۲) ۲۰ (۳) ۴۰ (۴) ۸۰
- ۶۲ یک گیاه با ژنوتیپ AADD با گیاه دارای ژنوتیپ aadd تلاقی داده شده و F1 حاصل تست کراس گردیده، اگر این دو زن با فاصله ۲۰ سانتی مورگان پیوسته باشند درصد احتمالی فرزندان نوترکیب کدام است؟
- (۱) ۱۰ (۲) ۲۰ (۳) ۴۰ (۴) ۸۰
- ۶۳ در جمعیتی برای مکان زنی A، ژنوتیپ‌های زیر با فراوانی‌های یاد شده شمارش شده‌اند. فراوانی آلل A<sub>۱</sub> را به دست آورید؟
- ژنوتیپ: A<sub>۱</sub>A<sub>۱</sub> A<sub>۱</sub>A<sub>۲</sub> A<sub>۱</sub>A<sub>۳</sub> A<sub>۲</sub>A<sub>۲</sub> A<sub>۲</sub>A<sub>۳</sub> A<sub>۳</sub>A<sub>۳</sub>
- فراوانی: ۱۵ ۵ ۱۵ ۱۰ ۱۰ ۴۵
- (۱) ۰/۲۲۵ (۲) ۰/۴۵ (۳) ۰/۵۵ (۴) ۰/۶۵
- ۶۴ در صورتی که بین زن‌های b و v لینکاز کامل باشد، چه نسبتی از نتاج در خود گشته  $\frac{b}{v}$  کاملاً هتروزیگوت خواهد بود؟
- (۱) ٪۱۰۰ (۲) ٪۷۵ (۳) ٪۵۰ (۴) ٪۲۵
- ۶۵ کدام یک از واژگان زیر مرتبط با همانندسازی DNA نمی‌باشد؟
- (۱) Polysomes (۲) Conservative (۳) Dispersive (۴) Semi conservative
- ۶۶ در اثر خودگشتنی، فردی با ژنوتیپ AABbCeddEe چه نسبتی از فرزندان دارای فنوتیپ ABede خواهد بود؟
- (۱)  $\frac{۳}{۶۴}$  (۲)  $\frac{۱۵}{۲۵۶}$  (۳)  $\frac{۹}{۲۵۶}$  (۴)  $\frac{۳}{۲۵۶}$
- ۶۷ از تکنیک RNAi به چه منظوری استفاده می‌شود؟
- (۱) برای تولید RNA مصنوعی (۲) برای جلوگیری از آلودگی ویروس (۳) برای انتقال RNA به گیاه برای بیان بهتر زن از لحاظ چرخش، مولکول‌های DNA شکل B و Z به ترتیب چگونه هستند؟
- (۱) راست گرد - چپ گرد (۲) چپ گرد - چپ گرد (۳) راست گرد - راست گرد (۴) چپ گرد - راست گرد
- ۶۸ زن چیست؟
- (۱) قطعه‌ای از DNA است که یک mRNA فعال را کد می‌کند. (۲) قطعه‌ای از DNA است که یک پلی پیتید را کد می‌کند. (۳) قطعه‌ای از DNA است که یک صفت را کنترل می‌کند. (۴) قطعه‌ای از DNA است که یک RNA فعال را کد می‌کند.
- ۶۹ در کدام یک از خانواده‌های زیر در صورت استقلال زن‌ها فرزندان متعدد تری از نظر ژنتیکی تولید خواهد شد؟
- (۱) AABB×aabb (۲) AAbb×aaBB (۳) Aabb×aaBb (۴) AaBB×aaBB
- ۷۰ از تلاقي والدین AABB×aabb چه نسبتی از افراد نسل F<sub>۲</sub> فنوتیپی غیر از فنوتیپ والدین نشان خواهد داد؟ (نوترکیب هستند).
- (۱)  $\frac{۱۰}{۱۶}$  (۲)  $\frac{۹}{۱۶}$  (۳)  $\frac{۶}{۱۶}$  (۴)  $\frac{۳}{۱۶}$
- ۷۱ توارث گروههای خونی O، B و A مثال بارزی از کدام یک از موارد زیر می‌باشد؟
- (۱) غالیتیت ناقص (۲) همبستگی زنی (۳) وابسته به جنس (۴) آلل‌های چندگانه

- ۷۳ جهش‌های ژنتیکی Transversion به چه معناست؟
- (۱) جهش جایگزینی باز پورین با پورین
  - (۲) جهش جایگزینی باز پیرimidin با پیرimidin
  - (۳) برداشت یک قطعه از مارپیچ و قرار گرفتن در همان محل اولیه به طور معکوس
  - (۴) جهش جایگزینی باز پورین با پیرimidin یا بالعکس
- کدام یک به نسبت تقریبی انواع هیستون‌ها در ساختمان DNA نزدیک است؟
- (۱)  $1H_1 : 2H_2a : 2H_2b : 1H_3 : 1H_4$
  - (۲)  $2H_2a : 2H_2b : 2H_3 : 2H_4$
  - (۳)  $1H_1 : 2H_2a : 2H_2b : 1H_3 : 2H_4$
- کدام گزینه صحیح است؟
- (۱) RFLP نشانگری مبتنی بر PCR است.
  - (۲) EST نشانگری مرتبط با نواحی یوکروماتین است.
  - (۳) نشانگرهای مولکولی فقط تنوع در نواحی یوکروماتین را نشان می‌دهند.
  - (۴) نشانگرهای مولکولی تنوع در نواحی هتروکروماتین را نشان نمی‌دهند.
- کدام گروه همخوان هستند؟
- (۱) هتروزیس - غالیت ژنی - GCA
  - (۲) هتروزیس - غالیت ژنی - SCA
  - (۳) هتروزیس - GCA - SCA
- در خصوص صفات کمی و نحوه توارث آنها کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟
- (۱) هرگاه اثر یک تک ژن کمتر از اثر محیط (با خطأ) باشد صفت کمی است.
  - (۲) صفات کمی با تعداد زیادی ژن کنترل می‌شوند که توارث آنها با اصول مندل متفاوت است.
  - (۳) اثر هر ژن در مقایسه با اثر محیط کوچک است و لذا نسبت‌های فتوتیپی در افراد قبل تشخص نیست.
  - (۴) در مطالعه صفات کمی از شباهت بین خویشاوندان از طریق محاسبه پارامترهای آماری استفاده می‌شود.
- در کدام حالت وراثت‌پذیری عمومی و خصوصی صفتی با هم برابر می‌شوند؟
- (۱)  $V_G$  : واریانس ژنتیکی،  $V_A$  : واریانس افزایشی ،  $V_D$  : واریانس غالیت،  $V_{GE}$  : واریانس ژنتیک  $\times$  محیط)
  - (۲)  $V_A = V_D$
  - (۳)  $V_D = 0$
  - (۴)  $V_{GE} = 0$
  - (۵)  $V_A = V_G$
- احتمال تولید ژنتیپ AabbCC از تلاقی AaBbCc  $\times$  AaBbCc کدام است؟
- (۱)  $\frac{1}{16}$
  - (۲)  $\frac{1}{32}$
  - (۳)  $\frac{3}{64}$
  - (۴)  $\frac{1}{64}$
- تنوع موجود در بین کلون‌های حاصل از یک فرد هتروزیگوس و هموزیگوس به ترتیب ..... و ..... است.
- (۱) محیطی - محیطی
  - (۲) ژنتیپی - ژنتیپی
  - (۳) ژنتیپی - محیطی
  - (۴) ژنتیپی - اثر متقابل ژنتیپ و محیط
- بیشترین درجه خلوص در کدام یک از حالات زیر قابل انتظار است؟
- (۱) پروتوژنی
  - (۲) شازموگامی
  - (۳) کلیستوگامی
  - (۴) دایکوگامی
- میزان آسیب‌پذیری ژنتیکی (Genetic vulnerability) کدام هیبرید بیشتر است؟
- (۱) Modified single cross
  - (۲) Three way cross
  - (۳) Double cross
  - (۴) Single cross
- دو لاین خالص لوبيا با یکدیگر تلاقی داده شده اند. واریانس وزن دانه در نسل  $F_1$  برابر با  $1/5$  و در نسل  $F_2$  برابر با  $1/6$  بوده است. وارثت پذیری عمومی وزن دانه چقدر است؟
- (۱) ۷۵ %
  - (۲) ۶۰ %
  - (۳) ۵۰ %
  - (۴) ۲۵ %
- اختلاف درصد بذر حاصل از خود باروری با درصد بذر حاصل از دگرباروری معیاری از ..... می‌باشد.
- (۱) آپومیکسی
  - (۲) عقیمی تخمرک
  - (۳) خودناسازگاری
  - (۴) عقیمی دانه گرده

-۸۵

گزینه صحیح در مورد نسل دوم تلاقی برگشتی کدام است؟

- (۱) ۵۰ درصد زن‌ها در گیاهان حاصل از نسل دوم تلاقی برگشتی، از والد تکرار شونده هستند.
- (۲) ۷۵ درصد زن‌ها در گیاهان حاصل از نسل دوم تلاقی برگشتی، از والد بخششده هستند.
- (۳) ۸۷/۵ درصد زن‌ها در گیاهان حاصل از نسل دوم تلاقی برگشتی، از والد بخششده هستند.
- (۴) ۸۷/۵ درصد زن‌ها در گیاهان حاصل از نسل دوم تلاقی برگشتی، از والد تکرار شونده هستند.

-۸۶

در تلاقی  $S_1S_4 \times S_2S_3$  در سیستم خود ناسازگاری اسپوروفیتی با فرض  $S_1 > S_2 > S_3$  چه نتایجی حاصل می‌شود؟

- (۱)  $S_1S_2$
- (۲) صفر
- (۳)  $S_3S_4, S_1S_2, S_1S_3$

-۸۷

در تولید چغnder قند، زنوتیپ والد نر در تولید هیبرید سینگل کراس در سیستم نر عقیمی زنگنه سیتوپلاسمی کدام است؟

- (۱)  $N M_S ms$
- (۲)  $S ms ms$
- (۳)  $N M_S M_S$
- (۴)  $N ms ms$

-۸۸

یک صفت کمی با ۴ مکان زنی افزایشی کنترل می‌شود. اگر حداقل و حداقل صفت در جمعیت به ترتیب ۳۰ و ۵۴ باشد، نسبت افراد ۴۲ سانتی‌متری در جمعیت چقدر می‌باشد؟

- (۱)  $\frac{۶}{۱۶}$
- (۲)  $\frac{۲۰}{۶۴}$
- (۳)  $\frac{۵۶}{۲۵۶}$
- (۴)  $\frac{۷۰}{۲۵۶}$

-۸۹

تنوع ناشی از مارکر RAPD از چیست؟

- (۱) تفاوت در طول باند مشاهده شده
- (۲) تفاوت در آغازگرهای استفاده شده
- (۳) تفاوت در توالی‌های نوکلئوتیدی محل برش توسط آنزیم

-۹۰

به ترتیب ..... شدت گزینش و ..... تنوع زنگنه موجب افزایش پاسخ به گزینش می‌شوند.

- (۱) کاهش - افزایش
- (۲) افزایش - کاهش
- (۳) کاهش - کاهش
- (۴) افزایش - افزایش

## فیزیولوژی گیاهی

-۹۱

علف‌کش پاراکوات چگونه باعث مرگ گیاه می‌شود؟

- (۱) با تولید سوپراکسید در PSII موجب تخرب کلروفیل می‌شود.
- (۲) انتقال الکترون بین PSII و PSI را مختل می‌سازد.

(۳) از طریق جذب الکترون‌ها بین پذیرنده الکترونی فردوسکین و NADPH عمل می‌کند.

(۴) از طریق اکسیداسیون لیپیدهای غشای کلروپلاست، عمل تخرب را انجام می‌دهد.

اصطلاح Potometry به کدام گزینه مربوط است؟

- (۱) روش تعیین سطح برگ
- (۲) روش تعیین شدت تعرق
- (۳) روش تعیین تراکم روزنہ
- (۴) روش تعیین پتانسیل آب کسر تنفسی (RQ) در گلوکز و اسیدهای آلی به ترتیب ..... و ..... می‌باشد.

-۹۳

(۱) برابر یک - بزرگتر از یک

(۲) کوچکتر از یک - بزرگتر از یک

(۳) بزرگتر از یک - کوچکتر از یک

در جریان تنفس هوای گلوکز آبی که در واکنش تولید می‌شود چه می‌نامند؟

- (۱) آب آزاد
- (۲) آب هیدراته
- (۳) آب هپگروسکوپی
- (۴) آب متابولیسمی

-۹۴

کانال‌های آبی (Aquaporines) سبب ..... در غشاء سلولی می‌شوند و ..... را در عرض غشاء افزایش می‌دهند.

(۱) تسهیل حرکت یون‌ها - بار الکتریکی

(۲) کاهش حرکت آب - جذب یون‌ها

(۳) افزایش هدایت هیدرولیکی - بار الکتریکی

-۹۵

- ۹۶ ماده اولیه تثبیت کننده  $\text{CO}_2$  در گیاهان دارای مسیرهای فتوسنترزی ..... و ..... و ..... به ترتیب RUBP و PEP است.
- (۱)  $\text{C}_3, \text{C}_4, \text{CAM} (۴)$       (۲)  $\text{CAM}, \text{C}_4, \text{C}_3 (۳)$       (۳)  $\text{C}_3, \text{CAM}, \text{C}_4 (۲)$       (۴)  $\text{C}_4, \text{C}_3, \text{CAM}$
- ۹۷ و PSII هر کدام به ترتیب:
- (۱) نور قرمز و نور قرمز دور را جذب می کنند.
  - (۲) بیشترین جذب نور آنها در  $P_{680}$  و  $P_{700}$  صورت می گیرد.
  - (۳) احیاکننده ضعیف و اکسیدکننده ضعیف می باشند.
  - (۴) در غشاهاست استروپایی و عمدتاً در غشاهاست گراناتی واقع شده اند.
- ۹۸ عنصر ..... یک کوفاکتور ضروری برای اکسیداسیون آب (در فرآیند فتوولیز) است و ..... در حکم ناقلین متحرک برای انتقال الکترون بین دو فتوسیستم عمل می کنند.
- (۱) منگنز - سیتوکروم b<sub>6</sub>f کمپلکس
  - (۲) آهن - پلاستوکوئینون
- ۹۹ کدام یک از جملات زیر در حضور تنفس نوری صحیح نمی باشد؟
- (۱) افزایش غلظت اکسیژن محیط، اثر بازدارنده ای بر شدت تنفس نوری دارد.
  - (۲) فرایند تنفس نوری تنها در شرایط تور و در اندامهای فتوسنترز کننده رخ می دهد.
  - (۳) تنفس نوری در سه اندامک کلروپلاست پراکسیزوم و میتوکندری صورت می گیرد.
  - (۴) شدت تنفس نوری به میزان  $\text{O}_2$  محیط وابسته است.
- ۱۰۰ رنگیزهای گیاهی مجموعه های برداشت کننده نور، آبزی را به کدام شکل به مرکز واکنش فتوسیستم منتقل می کنند؟
- (۱) از طریق فرآیند فسفرسانس
  - (۲) از طریق فرایند فلورسانس
  - (۳) از طریق انتقال شیمیابی
- ۱۰۱ تفاوت گیاهان CAM با گیاهان C<sub>4</sub> چیست؟
- (۱) در نوع آنزیم رویسکو
  - (۲) در اولین محصول فتوسنترزی است.
- ۱۰۲ اولین مانع در ورود آب به گیاه و آخرین مانع بر سر خروج آن از گیاه به ترتیب کدامند؟
- (۱) ذرات خاک و روزنه ها
  - (۲) دیواره ها آونده ها و کوتیکول
  - (۳) آندودرم ریشه و لایه های مزووفیل برگ
- ۱۰۳ اگر برگ های پایینی گیاه در زیر نقطه جبران نوری قرار داشته باشد چه اتفاقی رخ می دهد؟
- (۱) بیوسنترز کاروتوئیدها دو برابر می شود.
  - (۲) آنها کربن بیشتری را نسبت به آنچه تثبیت می کنند در تنفس مصرف می کنند.
  - (۳) آنها کربن بیشتری را نسبت به آنچه در تنفس مصرف می کنند، تثبیت می کنند.
  - (۴) آنها همان مقدار کربنی که توسط برگ های فوقانی تثبیت می شود، تثبیت می کنند.
- ۱۰۴ میتوکندری دارای کدام یک از فعالیت های زیر می باشد؟
- (۱) سنتز پروتئین
  - (۲) تنفس غیرهوازی
  - (۳) گلیکولیز
- ۱۰۵ طیف جذبی (Absorption Spectrum) چیست؟
- (۱) طیفی از نور را گویند که توسط گیاهان قابل جذب است.
  - (۲) طیف نورهای آبی و قرمز را گویند که توسط کلروفیل جذب می شود.
  - (۳) نمودار رابطه طول موج و جذب نور توسط رنگدانه های گیاهی را گویند.
  - (۴) رابطه بین طول موج و افزایش ماده خشک گیاهی را گویند.

- ۱۰۶ ریبولوز بی فسفات (RUBP) در گیاه در چه شرایطی به اسید گلیکولیک تبدیل می شود؟
- (۱) اکسیژن زیاد      (۲) نور کم      (۳) دمای کم      (۴) CO<sub>2</sub> زیاد
- ۱۰۷ با سوزاندن کلرووفیل، در خاکستر حاصله کدام عنصر باقی میماند؟
- (۱) آهن      (۲) کربن      (۳) منیزیم      (۴) گوگرد
- ۱۰۸ آنزیمهای گلیکولیز، در کدام بخش از سلول یا در کدام اندامک قرار دارند؟
- (۱) در میتوکندری      (۲) در سیتوپلاسم      (۳) در کلروپلاست      (۴) در پراکسیزوم وجود داشته که با میتوکندری و کلروپلاست همکاری مشترک دارند.
- ۱۰۹ حرکت ساکارز از سلول مزووفیل برگ به مجاورت آوند آبکشی، ..... نامیده می شود.
- (۱) بارگیری      (۲) حرکت سیمپلاست      (۳) مسیر انتقالی نزدیک      (۴) مسیر انتقال دور
- ۱۱۰ بیشترین بازده فتوسنترزی در طول موج های ..... نانومتر حاصل می شود.
- (۱) ۵۰۰ تا ۶۵۰      (۲) ۴۰۰ تا ۵۰۰      (۳) ۴۰۰ تا ۷۰۰      (۴) ۳۹۰ تا ۷۶۰
- ۱۱۱ در گیاهان CAM، چرخه کالوین .....
- (۱) در طی روز انجام می گیرد.      (۲) در طی شب انجام می گیرد.      (۳) هم در شب و هم روز انجام می گیرد.      (۴) وجود ندارد.
- ۱۱۲ نقطه جبرانی CO<sub>2</sub> در گیاهان C4 و C3 کدام است؟
- (۱) C3 بیشتر از C4 است.      (۲) C4 بیشتر از C3 است.      (۳) با هم برابرند.      (۴) بستگی به درجه حرارت دارد.
- ۱۱۳ آنزیم رابیسکو در کجا ساخته می شود؟
- (۱) سیتوسول      (۲) داخل استرومما
- ۱۱۴ چرا گیاهان C3 به این نام نامیده می شوند؟
- (۱) اولین قند تولیدی در چرخه کالوین - بنسون یک تریویز می باشد.      (۲) اولین ماده پایدار بعد از تثبیت CO<sub>2</sub>، ماده ۳ کربن - ۳ فسفوگلیسرات می باشد.      (۳) اولین ماده تولیدی بعد از تثبیت CO<sub>2</sub>، قند ۳ کربنی فسفوگلیسرآلدنید می باشد.      (۴) بعد از ترکیب ریبولوز بی فسفات با CO<sub>2</sub> یک ماده ۳ کربنی ناپایدار تولید می شود.
- ۱۱۵ تفاوت فسفوریلاسیون نوری چرخهای با فسفوریلاسیون غیر چرخهای کدام است؟
- (۱) در فسفوریلاسیون چرخهای، فقط PSI نقش دارد در صورتی که در فسفوریلاسیون غیر چرخهای، PSI و PSII هر دو نقش دارند.
- (۲) در فسفوریلاسیون چرخهای، اکسیژن تولید می شود ولی در فسفوریلاسیون غیر چرخهای اکسیژن تولید نمی شود.
- (۳) فسفوریلاسیون چرخهای، در روشنایی اما فسفوریلاسیون غیر چرخهای در تاریکی انجام می گیرد.
- (۴) در فسفوریلاسیون چرخهای، هم ATP و هم NADPH تولید می شود در حالیکه در فسفوریلاسیون غیر چرخهای فقط ATP تولید می شود.
- ۱۱۶ حضور کدام یک به عنوان پذیرنده هیدروژن در گلیکولیز، ضروری است؟
- (۱) O<sub>2</sub>      (۲) CO<sub>2</sub>      (۳) NAD<sup>+</sup>      (۴) FAD<sup>+</sup>
- ۱۱۷ کدام یک از موارد زیر، از اثرات کمبود آب در گیاه می باشد؟
- (۱) پتانسیل فشار سلول افزایش می یابد.      (۲) نرخ هدایت روزنهای افزایش می یابد.      (۳) تقسیمات سلولی و بزرگ شدن سلول متوقف می شود.      (۴) نشاسته در سلول های محافظه به اسید مالیک تبدیل می شود.

-۱۱۸ کدام یک از جملات زیر، ساختار غشاء سلولی را بهتر توصیف می‌نماید؟

- (۱) دو لایه لیپیدی که مولکول‌های پروتئینی در آن معلق هستند.
- (۲) دو لایه پروتئینی که در بین آنها، لایه‌های لیپیدی قرار گرفته‌اند.
- (۳) دو لایه لیپیدی که در بین آنها، پروتئین‌ها قرار گرفته‌اند.
- (۴) یک تک لایه پروتئینی در خارج و یک تک لایه لیپیدی در داخل است.

-۱۱۹ حرکت سلول‌های روزنه در طی باز و بسته شدن، عمدتاً تحت تأثیر کدام عامل صورت می‌گیرد؟

- (۱) جابجایی یون کلسیم
- (۲) تبديل نشاسته به مواد محلول در سلول‌های محافظ
- (۳) تولید فرآورده‌های فتوستنتزی در سلول‌های محافظ

-۱۲۰ در فتوسیستم II ..... تولید می‌شود.

- (۱) فقط یک احیاء‌کننده قوی
- (۲) یک اکسیدکننده قوی و یک احیاء‌کننده ضعیف
- (۳) یک احیاء‌کننده قوی و یک اکسیدکننده ضعیف

### طرح آزمایشات کشاورزی

-۱۲۱ اگر داده‌های طرح آزمایشی شرایط انجام تجزیه واریانس را نداشته باشند و ضریب تغییرات تیمارها یکسان باشد، چه نوع تبدیلی برای داده‌ها توصیه می‌شود؟

- (۱) لگاریتمی
- (۲) جذری
- (۳) معکوس
- (۴) زاویه‌ای

-۱۲۲ در یک آزمایش فاکتوریل که دارای سه عامل A، B، C، به صورت  $2^3$  است. مقدار اثر اصلی B از کدام رابطه محاسبه می‌شود؟

$$B = \frac{(a+1)(b-1)(c+1)}{4} \quad (1)$$

$$B = \frac{(a-1)(b+1)(c-1)}{4} \quad (2)$$

$$B = \frac{(a+1)(b-1)(c+1)}{2} \quad (3)$$

$$B = \frac{(a+1)(b+1)(c-1)}{4} \quad (4)$$

-۱۲۳ مقدار انحراف معیار تفاضل میانگین دو تیمار در یک طرح مربع لاتین با ۵ تیمار و ۲ مشاهده در هر واحد آزمایشی چقدر است؟

$$\sqrt{\frac{SSe}{60}} \quad (1) \qquad \sqrt{\frac{MSe}{50}} \quad (2) \qquad \sqrt{\frac{MSe}{10}} \quad (3) \qquad \sqrt{\frac{SSe}{5}} \quad (4)$$

-۱۲۴ کدام یک از آزمون‌های مقایسه میانگین تیمارها یک آزمون چند دامنه‌ای است؟

- (۱) توکی
- (۲) دانت
- (۳) LSD
- (۴) SNK

-۱۲۵ اگر مشکلی برای مطالعه اثر دو عامل در مزرعه وجود نداشته باشد، کدامیک از طرح‌های زیر را توصیه می‌کنید؟

- (۱) مربع لاتین
- (۲) آزمایش فاکتوریل
- (۳) کرت‌های خرد شده
- (۴) بلوک‌های کامل تصادفی با بیش از یک مشاهده

-۱۲۶ نقشه زیر مربوط به چه طرحی است؟

$a_1b_2$	$a_2b_1$	$a_2b_3$	$a_1b_3$	$a_1b_2$	$a_1b_1$	$a_2b_3$	$a_2b_1$	$a_2b_2$
$a_3b_1$	$a_2b_3$	$a_2b_2$	$a_2b_1$	$a_2b_2$	$a_2b_3$	$a_1b_1$	$a_1b_2$	$a_1b_3$
$a_1b_1$	$a_1b_3$	$a_1b_2$	$a_2b_1$	$a_2b_3$	$a_2b_2$	$a_2b_3$	$a_2b_1$	$a_2b_2$

- ۱۲۷ در یک آزمایش کرت خرد شده که بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا شده است در هر تکرار ۳ کرت اصلی و ۱۲ کرت فرعی وجود دارد. درجه آزادی خطای اصلی و خطای فرعی به ترتیب از راست به چپ کدام است؟
- (۱) ۴ و ۱۸      (۲) ۶ و ۲۶      (۳) ۶ و ۱۸      (۴) ۴ و ۶۶
- ۱۲۸ هرگاه در یک طرح کرت های خرد شده که طرح پایه بلوک کامل تصادفی بوده و  $MS_{E_a}$  بزرگتر از  $MS_{E_b}$  باشد، کدام گزینه صحیح است؟
- (۱) اثر متقابل بلوک و فاکتور فرعی معنی دار بوده است.  
(۲) فاکتور فرعی از نظر ماهیتی بیشتر از فاکتور اصلی است.  
(۳) کرت های فرعی مانند بلوک ها عمود بر مسیر غیر یکنواختی قرار گرفته اند.  
(۴) هر سه مورد
- ۱۲۹ در بررسی میزان سه تنظیم کننده رشد (۰، ۱۰، ۲۰، ۳۰ میکرومول - فاکتور A) و سه میزان هم فاصله دما (فاکتور B) بر فعالیت آنزیم، ریبیسکو در یک گونه گیاهی به صورت طرح کاملاً تصادفی با ۴ تکرار نتایج زیر حاصل شده است:  
(۱)  $a_1$  و  $a_2$  نماد مقایسات مستقل هستند.

$a_1b_1$	$a_2b_1$	$a_3b_1$	$a_1b_2$	$a_2b_2$	$a_3b_2$	$a_1b_3$	$a_2b_3$	$a_3b_3$	تیمار
۴	۴	۳	۳	۷	۴	۱	۵	۵	جمع تیمار
-۱	-۱	-۱	۲	۲	۲	-۱	-۱	-۱	$a_1$
-۱	۰	۱	-۱	۰	۱	-۱	۰	۱	$a_2$

- ضرایب مقایسه  $a_2$  مربوط به محاسبه مجموع مربعات ..... است.
- (۱) مصرف غلظت ۱۰ میکرومول در مقابل ۳۰ میکرومول تنظیم کننده رشد  
(۲) رگرسیون درجه ۲ برای سطوح تنظیم کننده رشد  
(۳) رابطه خطی برای میزان سطوح دما  
(۴) مصرف تمام سطوح تنظیم کننده رشد
- ۱۳۰ با داشتن تعداد برابر تکرار و تیمار در سه طرح پایه کدام مورد زیر صحیح است؟
- (۱) طرح بلوک کامل تصادفی با توجه به درجه آزادی قابل قبول خطای اعمال کنترل موضعی نسبی دقت بیشتری داشته باشد.  
(۲) طرح مربع لاتین به دلیل داشتن اثر متقابل سه جانبه (خطا) دقت بیشتری دارد.  
(۳) طرح کاملاً تصادفی به دلیل داشتن درجه آزادی خطای بیشتر دقت بیشتری دارد.  
(۴) طرح مربع لاتین به دلیل اعمال کنترل موضعی بیشتر لزوماً دقت بیشتری دارد.

-۱۳۱

- در تجزیه مرکب چنانچه کای اسکور محاسبه شده معنی دار گردد، چه باید کرد؟  
 ۱) باید تعداد آزمایشات محیطها را کاهش داد تا کای اسکور غیر معنی دار شود.  
 ۲) نباید هیچ گونه تجزیه مرکبی انجام داد.  
 ۳) اختلاف بین آزمایشات را کم کرد.  
 ۴) باید تجزیه مرکب را انجام داد.

-۱۳۲

- ۵ رقم گندم در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در دو محیط ارزیابی شده و نتایج زیر برای هر محیط حاصل شده است:  
 چنانچه مقدار SS اثر متقابل رقم × محیط در جدول تجزیه مرکب برابر با ۸ باشد، MS رقم در جدول تجزیه مرکب برابر کدام است؟

SS	آزمایش ۲	SS	آزمایش ۱	
۴	بلوک	۳	بلوک	۸ (۱)
۱۳	رقم	۱۱	رقم	۴ (۲)
۵	خطا	۴	خطا	۱۶ (۳) ۲۴ (۴)

-۱۳۳

- در یک طرح بلوک کامل تصادفی ۴ تیمار در ۶ بلوک کامل ارزیابی شده‌اند و اطلاعات ذیل به دست آمده است، در این صورت مقدار واریانس خطای (MSE) برابر کدام است؟

$$\sum_{i=1}^4 (\bar{X}_{i\circ} - \bar{X}_{\circ\circ})^2 = 10, \quad \sum_{j=1}^6 (\bar{X}_{\circ j} - \bar{X}_{\circ\circ})^2 = 5, \quad \sum_{ij} (X_{ij} - \bar{X}_{\circ\circ})^2 = 110$$

- ۲۲ (۱)  
۶/۳۳ (۴)  
۴/۷۵ (۳)

-۱۳۴

- درجه آزادی خطای آزمایش در یک آزمایش فاكتوریل  $2 \times 2 \times 5$  در قالب ۴ بلوک کامل تصادفی چقدر است؟  
 ۱) ۹۰ (۴)  
 ۲) ۸۱۲ (۱)  
 ۳) ۸۷ (۲)  
 ۴) ۱۱۹ (۳)

- در یک طرح مربع لاتین ۶ تیمار مورد ارزیابی قرار گرفته و از هر واحد آزمایش ۳ نمونه مورد اندازه‌گیری واقع شده است، در این صورت درجه آزادی خطای آزمایشی و خطای نمونه‌برداری به ترتیب از راست به چپ برابر کدام است؟

- ۱) ۱۰۸ و ۷۲ (۲)  
 ۲) ۲۵ و ۲۰ (۳)  
 ۳) ۲۰ و ۱۰۸ (۴)

-۱۳۶

- در یک طرح کاملاً تصادفی ۵ تیمار در ۴ تکرار ارزیابی شده‌اند و اطلاعات ذیل به دست آمده است:

$$X_{\circ\circ} = 200, \quad CV = \% 2, \quad \sum_{i=1}^5 (\bar{X}_{i\circ} - \bar{X}_{\circ\circ})^2 = 4$$

- در این صورت مقدار F تیمار چقدر است؟

- ۱) ۴۰۰ (۴)  
 ۲) ۸۰ (۲)  
 ۳) ۱۰۰ (۳)  
 ۴) ۲۰ (۱)

-۱۳۷

- در یک طرح آزمایشی ۵ تیمار در ۴ بلوک کامل ارزیابی شده و از هر واحد آزمایشی ۳ نمونه مورد اندازه‌گیری قرار گرفته

$$\text{است. چنانچه } \sum_{i=1}^5 (\bar{X}_{i\circ\circ} - \bar{X}_{\circ\circ\circ\circ})^2 \text{ برابر } 10 \text{ باشد در اینصورت مقدار میانگین مربعات تیمار (MSt) برابر کدام است؟}$$

- ۱) ۱۰ (۱)  
 ۲) ۳۰ (۲)  
 ۳) ۴۰ (۳)  
 ۴) ۱۲۰ (۴)

-۱۳۸

- در یک طرح کاملاً تصادفی با ۵ تیمار و ۳ تکرار برای افزایش دقت ۳ نمونه از هر واحد آزمایشی مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به این که  $F = ۱۰/۴$  تیمار،  $MS = ۱۰$  تیمار و  $F = ۵$  خطای آزمایش، مقدار مجموع مربعات خطای نمونه‌برداری برابر کدام است؟

- ۱) ۵ (۱)  
 ۲) ۲۵ (۲)  
 ۳) ۳۰ (۳)  
 ۴) ۱۵۰ (۴)

- ۱۳۹ در چه صورتی می‌توان روند بین سطوح یک تیمار را از طریق معادلات مستقل تعیین کرد؟  
 ۱) وقتی روند تغییرات یک جهته باشد.  
 ۲) تیمار کیفی و دارای سطوح هم فاصله باشد.  
 ۳) تیمار کمی و دارای سطوح هم فاصله باشند.
- ۱۴۰ هرگاه در یک آزمایش  $3 \times 2^3$  اثر ABC و BC در ۳ تکرار مورد اختلاط قرار گیرند، درجه آزادی خطا برابر کدام است؟  
 ۱) ۱۴ (۴)      ۲) ۱۱ (۳)      ۳) ۸ (۲)      ۴) ۵ (۱)
- ۱۴۱ اثر ۴ سطح ازت و ۲ سطح فسفر بر عملکرد ۳ واریته جو در طرح بلوك‌های کامل تصادفی با ۵ تکرار بررسی شده است. درجه آزادی واریانس خطا در محاسبه F برای ازت کدام است؟  
 ۱) ۱۲ (۲)      ۲) ۸ (۱)      ۳) ۲۸ (۳)      ۴) به داشتن فاکتور اصلی، فرعی و فرعی فرعی نیاز است.
- ۱۴۲ اگر مزیت نسبی (RE) طرح بلوك نسبت به طرح کاملاً تصادفی  $8^0$  بشود، چه طرحی بهتر است در ماده آزمایشی مذکور پیاده کرد؟  
 ۱) کاملاً تصادفی      ۲) بلوك کامل تصادفی      ۳) کاملاً تصادفی نامتعادل      ۴) تفاوتی نمی‌کند.
- ۱۴۳ ضریب تغییرات (C.V.) در یک آزمایش، عبارت است از خارج قسمت .....  
 ۱) واریانس کل به میانگین کل ضرب درصد  
 ۲) واریانس تیمارها به میانگین کل تیمارها ضرب درصد  
 ۳) جذر واریانس اشتباها به میانگین کل تیمارها ضرب درصد  
 ۴) جذر میانگین مرreعات اشتباه آزمایشی بر میانگین کل ضرب درصد
- ۱۴۴ در چه مواردی می‌توان روی اثرات اصلی مقایسه میانگین نموده و نتیجه گیری کرد؟  
 ۱) عدم وجود اثر متقابل یا اثر متقابل از نوع تغییر در مقدار  
 ۲) اثر متقابل از نوع تغییر در ترتیب  
 ۳) اثر متقابل از نوع تغییر در مقدار  
 ۴) عدم وجود اثر متقابل
- ۱۴۵ برای مطالعه اثر تنفس خشکی روی چند رقم گندم از طریق دوره‌های آبیاری چه طرحی را پیشنهاد می‌کنید؟  
 ۱) فاکتوریل      ۲) کرت‌های خرد شده      ۳) بلوك‌های کامل تصادفی      ۴) مریع لاتین با نمونه‌برداری
- ۱۴۶ برای مقایسه چهار تیمار آفت‌کش به همراه شاهد در قالب طرح بلوك‌های کامل تصادفی با ۳ بلوك اطلاعات زیر در دست است. واریانس مقایسه شاهد با بقیه تیمارها برابر است با:  
 ۱) ۱۰ / ۴۲ (۱)      ۲) ۲۳ / ۴۳ (۲)      ۳) ۹۳ / ۷۵ (۳)
- | D  | C | B  | A | شاهد | تیمار   |
|----|---|----|---|------|---------|
| ۱۲ | ۸ | ۱۰ | ۷ | ۳    | میانگین |
- ۱۴۷ چنانچه در یک آزمایش کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوك کامل تصادفی فاکتور A اصلی ( $a = 4$ ) و B فرعی ( $b = 2$ ) تعداد تکرار آزمایش برابر ۴ باشد و مقادیر MSE(a) و MSE(b) به ترتیب از راست به چپ برابر  $67^{\circ}$  و  $3^{\circ}$  باشد.  
 چنانچه آزمایش فاکتوریل تجزیه می‌شد (در صورت امکان)، در این صورت مقدار MSE برابر کدام است؟  
 ۱) ۴ (۴)      ۲) ۱/۸۴ (۳)      ۳) ۰ / ۱۷ (۲)      ۴) ۲ (۱)
- ۱۴۸ چنانچه در یک آزمایش فاکتوریل  $2 \times 3$  در چهار بلوك کامل تصادفی مقدار  $SSA/b_1 = 12$  و  $SSA/b_2 = 24$  و  $SSA/b_3 = 4$  حاصل شده باشد، در اینصورت مقدار میانگین مرreعات اثر متقابل دو فاکتور (MSAB) برابر کدام است؟  
 ۱) ۱۸ (۴)      ۲) ۱۶ (۳)      ۳) ۴ (۲)      ۴) ۲ (۱)

- ۱۴۹ در یک آزمایش فاکتوریل فاکتورهای  $(a = ۲)A$  ،  $(b = ۳)B$  و  $(c = ۲)C$  در چهار بلوک کامل ارزیابی شده‌اند و مقدار جمع مجددات خطای SSE (SSE) برابر ۲۷۶ حاصل شده است. چنانچه مقدار t استیودنت برابر  $2/2$  باشد، در این صورت مقدار LSD جهت مقایسه میانگین‌های اثر متقابل A \* B برابر کدام است؟
- |          |           |          |           |
|----------|-----------|----------|-----------|
| ۱) $1/2$ | ۲) $1,56$ | ۳) $2/2$ | ۴) $3/11$ |
|----------|-----------|----------|-----------|
- ۱۵۰ چنانچه یک طرح مربع لاتین با ۵ تیمار در سه سال و دو منطقه تکرار شود در تجزیه مرکب ۶ آزمایش درجات آزادی خطای ۱ و خطای ۲ به ترتیب از راست به چپ برابر کدام است؟
- |                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ۱) $48$ و $24$ | ۲) $22$ و $72$ | ۳) $36$ و $72$ | ۴) $48$ و $72$ |
|----------------|----------------|----------------|----------------|

مُوسسه تحقیقاتی آرمان