

229

A

229A

محل امضای:

نام:

نام خانوادگی:

عصر پنجم شنبه

۹۶/۲/۷



«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.»

امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل – سال ۱۳۹۶

شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز – گد ۱۳۲۶

مدت پاسخگویی: ۱۳۵ دقیقه

تعداد سوال: ۱۵۵

عنوان مواد انتخابی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد انتخابی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)	۳۰	۱	۳۰
۲	اصول زراعت	۲۵	۳۱	۵۵
۳	اصول باغبانی	۲۵	۵۶	۸۰
۴	اصول مبارزه با آفات و بیماری‌های گیاهی	۲۵	۸۱	۱۰۵
۵	علف‌های هرز و گنترل آن‌ها	۲۵	۱۰۶	۱۳۰
۶	تیادشناسی	۲۵	۱۳۱	۱۵۵

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق جاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و ... یا از برگزاری آزمون، برای تداری اشخاص خلیقی و خوبی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با متخالفین برای مقررات رقابت می‌شود

PART A: Vocabulary

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes the blank. Then mark the correct choice on your answer sheet.

- 1- By signing these papers, I agree to not ----- any of my company's financial records to anyone outside of my firm.
 1) authorize 2) articulate 3) divulge 4) victimize
- 2- Without an antidote to treat the patient, the poisonous snakebite would prove -----.
 1) vulnerable 2) fatal 3) massive 4) extreme
- 3- Stifling a yawn, Jackie covered her mouth as she listened to one of her mother's ----- stories about her childhood.
 1) interminable 2) credible 3) widespread 4) literal
- 4- After learning the lawyer accepted a bribe, the committee decided to ----- him and suspend his license.
 1) encounter 2) retaliate 3) underestimate 4) rebuke
- 5- The government will ----- any property that has been purchased with money earned through illegal means.
 1) resist 2) seize 3) eliminate 4) avoid
- 6- Now that I have got another offer of employment, which sounds as good as the earlier one, I am in a ----- as to which one to choose.
 1) necessity 2) comparison 3) postponement 4) dilemma
- 7- Since there is a huge ----- between the results of the first and second experiment, the laboratory team will conduct a third test.
 1) discrepancy 2) autonomy 3) randomness 4) opposition
- 8- To get a good grade on the research project, you must ----- your report with provable facts.
 1) inform 2) outline 3) substantiate 4) interfere
- 9- We thought that the power cuts were temporary and would end but we have now realized that this is a ----- problem and will never end.
 1) chaotic 2) perennial 3) fragile 4) memorable
- 10- If a ----- answer can provide the information requested, there is no reason to bore a person with a long response.
 1) boundless 2) conceptual 3) concise 4) logical

PART B: Cloze Passage

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

It is very easy to lead someone's memory astray. For example, if I witness a traffic accident and (11) ----- whether the car stopped before or after the tree, I am much more likely to "insert" a tree into my memory of the scene, (12) ----- no tree was actually present. This occurrence reflects the fact that when we retrieve a memory, we also re-encode it and during that process it is (13) ----- errors.

Elizabeth Loftus at the University of California, Irvine, and colleagues have shown that this “misinformation effect” can have huge implications for the court room, with experiments (14) ----- that eyewitness testimonies can be adversely influenced by misleading questioning. Fortunately, these findings also suggest ways for police, lawyers and judges to frame the questions (15) ----- they ask in a way that makes reliable answers more likely.

- | | | | | |
|-----|-------------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------|
| 11- | 1) I am later asked | 2) later asking | 3) to be asked later | 4) later asked |
| 12- | 1) even then | 2) so even | 3) as if even | 4) even if |
| 13- | 1) a possibility implanting | | 2) possible to implant | |
| | 3) possibly to implant | | 4) possibility of implanting | |
| 14- | 1) are repeatedly demonstrated | | 2) repeatedly demonstrating | |
| | 3) that are demonstrated repeatedly | | 4) to demonstrate repeatedly | |
| 15- | 1) that | 2) when | 3) because | 4) even though |

PART C: Reading Comprehension

Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

PASSAGE 1:

MCPA (2-methyl-4-chlorophenoxyacetic acid) is a powerful, selective, widely used phenoxy herbicide. The pure compound is a brown-colored powder. In 1936 investigations began at ICI's Jealott's Hill research center into the effects of the plant hormones auxins on plant growth looking specifically for a way to kill weeds without harming crops such as corn. Synthesis of MCPA was first reported by Synerholme and Zimmerman in 1945 and by Templeman and Foster in 1946. Templeman and Foster were searching for compounds with similar or greater selective activity than 1-naphthaleneacetic acid (1-NA) in inhibiting the growth of weeds while not adversely affecting the growth of cereal grains. They synthesized MCPA from the corresponding phenol by exposing it to chloroacetic acid and dilute base in a straightforward substitution reaction. MCPA is used as an herbicide, generally as its salt or esterified forms. Used thus, it controls broadleaf weeds, including thistle and dock, in cereal crops and pasture. It is selective for plants with broad leaves, and this includes most deciduous trees. Clovers are tolerant at moderate application levels. It is currently classified as a restricted use pesticide in the United States. Its toxicity and biodegradation are topics of current research. Though not extremely toxic, it has recently been determined that MCPA can form complexes with metal ions and thereby increase their bioavailability, though there is also work being done to utilize this ability. Because it is inexpensive, MCPA is used in various chemical applications. Its carboxylic acid group allows the formation of conjugated complexes with metals. The acid functionality makes MCPA a versatile synthetic intermediate for more complex derivatives.

- 16- It is stated in the passage that -----.**
- 1) there was no synthesis of MCPA prior to 1945
 - 2) restricted use pesticides are non-biodegradable
 - 3) corn crops should not be exposed to chloroacetic acid
 - 4) diluted bases form straightforward substitution reactions
- 17- The passage mentions that -----.**
- 1) clovers are classified as a restricted use pesticides
 - 2) MCPA cannot be applied to non-deciduous trees
 - 3) phenoxy herbicides have a powerful MCPA base
 - 4) 1-NA can negatively affect growth of cereal grains
- 18- According to the passage, -----.**
- 1) MCPA can help increase metal ions' bioavailability
 - 2) versatile synthetic intermediates have an MCPA base
 - 3) only esterified forms of MCPA are used as herbicides
 - 4) 2-methyl-4-chlorophenoxyacetic acid is yellowish brown
- 19- The passage points to the fact that -----.**
- 1) Synerholme first synthetized MCPA at Zimmerman's
 - 2) cereal pasture are often covered by broadleaf weeds
 - 3) auxins were at first extracted from young tree barks
 - 4) MCPA in salt form can control thistle and dock
- 20- The word 'conjugate' in the passage (underlined) is closest to -----.**
- 1) 'react'
 - 2) 'join'
 - 3) 'solve'
 - 4) 'turn'

PASSAGE 2:

Picloram is a systemic herbicide used for general woody plant control. It also controls a wide range of broad-leaved weeds, but most grasses are resistant. A chlorinated derivative of picolinic acid, picloram is in the pyridine family of herbicides. Picloram can be sprayed on foliage, injected into plants, applied to cut surfaces, or placed at the base of the plant where it will leach to the roots. Once absorbed by the foliage, stem, or roots, picloram is transported throughout the plant. Herbicides containing Picloram are sold under a variety of brand names. Dow Chemicals and now Dow AgroSciences sell herbicides containing it under the brand name Tordon. During the Vietnam War, a mixture of picloram and other herbicides were combined to make Agent White (commercially available as Tordon 101) and enhanced Agent Orange which was previously conducted by the British military during the Malayan Emergency. Large quantities of these herbicides were sprayed by U.S. forces in areas where its long-term persistence was desirable, such as inland forests. Picloram is of moderate toxicity to the eyes and only mildly toxic on the skin. There is no documented history of human intoxication by picloram so symptoms of acute exposure are difficult to characterize. Picloram is the most persistent of its family of herbicides. It does not adhere to soil and so may leach to groundwater, and has in fact been detected there. It is degraded in soil and water mainly by microbes. Picloram has very little tendency to accumulate in aquatic life. Gardeners who use dung as fertilizer should check to make certain that the animal source has not grazed on picloram treated hay, as the dung still has broadleaf killing potency.

- 21-** It is stated in the passage that -----.
- 1) symptoms of picloram exposure are easy to characterize
 - 2) aquatic life is quite suitable for developing picloram
 - 3) pyridine herbicides contain two varieties of picloram
 - 4) microbes can degrade picloram in soil and water
- 22-** The passage points to the fact that -----.
- 1) Tordon used to be produced by Dow Chemicals
 - 2) cow dung has strong broadleaf killing potency
 - 3) general woody plants need systemic control
 - 4) picloram does not often work on grasses
- 23-** It can be concluded from the passage that -----.
- 1) picloram can easily end up in groundwater
 - 2) gardeners usually treat their hay with picloram
 - 3) picloram is the most common herbicide in Malaysia
 - 4) Agent White was synthesised just before the Vietnam War
- 24-** We understand from the passage that -----.
- 1) picloram is especially toxic to human breathing system
 - 2) picloram can be sprayed or placed at the base of foliage
 - 3) Agent White and Agent Orange last very long as herbicides
 - 4) chlorinated derivatives are applied only to broad-leaved weeds
- 25-** The word ‘adhere’ in the passage (underlined) is closest to -----.
- 1) ‘remain’
 - 2) ‘stick’
 - 3) ‘combine’
 - 4) ‘enter’

PASSAGE 3:

Allelopathy is a biological phenomenon by which an organism produces one or more biochemicals that influence the germination, growth, survival, and reproduction of other organisms. Many crop cultivars show strong allelopathic properties, of which rice (*Oryza sativa*) has been most studied. Rice allelopathy depends on variety and origin: Japonica rice is more allelopathic than Indica and Japonica-Indica hybrid. More recently, critical review on rice allelopathy and the possibility for weed management reported that allelopathic characteristics in rice are quantitatively inherited and several allelopathy-involved traits have been identified. Many invasive plant species interfere with native plants through allelopathy. A famous case of purported allelopathy is in desert shrubs. One of the most widely known early examples was *Salvia leucophylla*, because it was on the cover of the journal *Science* in 1964) Bare zones around the shrubs were hypothesized to be caused by volatile terpenes emitted by the shrubs. However, like many allelopathy studies, it was based on artificial lab experiments and unwarranted extrapolations to natural ecosystems. In 1970, *Science* published a study where caging the shrubs to exclude rodents and birds allowed grass to grow in the bare zones. Allelopathy has been shown to play a crucial role in forests, influencing the composition of the vegetation growth, and also provides an explanation for the patterns of forest regeneration. The black walnut (*Juglans nigra*) produces the allelochemical juglone, which affects some species greatly while others not at all. The leaf litter and root exudates of some *Eucalyptus* species are allelopathic for certain soil microbes and plant species. The tree of heaven, *Ailanthus altissima*, produces allelochemicals in its roots that inhibit the growth of many plants. The pace of

evaluating allelochemicals released by higher plants in nature has greatly accelerated, with promising results in field screening.

26- It is stated in the passage that -----.

- 1) black walnut produces the allelochemical *Juglans nigra*
- 2) allelopathy can explain patterns of forest regeneration
- 3) rodents and birds allow grass to grow in the bare zones
- 4) allelopathic weed management is ecologically unsafe

27- The passage mentions that -----.

- 1) tree of heaven is a variety of *Ailanthus altissima*
- 2) *Oryza sativa* shows strong allelopathic properties
- 3) allelopathy is not always biological phenomenon
- 4) artificial lab experiments harm natural ecosystems

28- The passage points to the fact that -----.

- 1) most natural allelochemicals are produced by higher plants
- 2) forest shrubs emit some environmentally-friendly terpenes
- 3) allelochemicals are produced in the roots of tree of heaven
- 4) growth biochemicals are necessary for reproduction of plants

29- According to the passage, -----.

- 1) desert shrubs interfere with native plants through allelopathy
- 2) allelopathy-involved traits are not often quantitatively inherited
- 3) Indica and Japonica-Indica hybrids are non-allelopathic species
- 4) *Salvia leucophylla* species have highly allelopathic root exudates

30- The word ‘volatile’ in the passage (underlined) is the opposite of -----.

- 1) ‘complex’ 2) ‘heavy’ 3) ‘stable’ 4) ‘light’

أصول زراعت:

- ۳۱- با کاهش دوره پرشدن دانه در کلزا، چه تغییری رخ می‌دهد؟

- (۱) وزن هزاردانه کاهش می‌یابد.
- (۲) تعداد دانه در بوته کاهش می‌یابد.
- (۳) درصد روغن دانه افزایش می‌یابد.
- (۴) شاخص برداشت افزایش می‌یابد.

- ۳۲- کشت مخلوط گیاهان زراعی چه زمانی مفید خواهد بود؟

- (۱) دو نوع رقابت یکسان باشد.

(۲) مجموع دو نوع رقابت بیشتر از یک باشد.

(۳) رقابت درون گونه‌ای بیش از رقابت بین گونه‌ای باشد.

(۴) رقابت بین گونه‌ای بیش از رقابت درون گونه‌ای باشد.

- ۳۳- تراکم کاشت در کدام محصول زراعی بیشتر در نظر گرفته می‌شود؟

- (۱) ذرت
- (۲) جو
- (۳) سویا
- (۴) آفتاب‌گردان

- ۳۴- کدام عوامل در وارونگی هوا مؤثر هستند؟

(۱) شب‌های طولانی، آسمان بدون ابر و باد

(۲) شب‌های کوتاه، آسمان ابری و بدون باد

(۳) شب‌های طولانی، آسمان ابری و وجود جریان هوا

(۴) شب‌های کوتاه، آسمان بدون ابر و وجود جریان هوا

- ۳۵- امروزه برای بهبود شاخص برداشت در گندم چه اقدامی انجام می‌دهند؟
- (۱) عملکرد دانه را افزایش می‌دهند.
 - (۲) عملکرد بیولوژیکی را افزایش می‌دهند.
 - (۳) تعداد دانه در بوته را افزایش می‌دهند.
 - (۴) عملکرد بیولوژیکی و عملکرد دانه را افزایش می‌دهند.
- ۳۶- در کدام غلات سردسیری، کارایی مصرف آب و عناصر غذایی بیشتر است؟
- (۱) جو
 - (۲) یولاف
 - (۳) گندم
 - (۴) چاودار
- ۳۷- برنج آپلنده کدام نوع از انواع برنج اطلاق می‌شود؟
- (۱) برنج غرقابی
 - (۲) برنج دیم
 - (۳) برنج شناور
 - (۴) برنج آب عمیق
- ۳۸- در رقمهای جدید گندم، مقاومت به خوابیدگی، ارتفاع ساقه و اندازه برگ‌ها به ترتیب چه تغییری کرده است؟
- (۱) کاهش - کاهش - کاهش
 - (۲) افزایش - افزایش - افزایش
 - (۳) کاهش - افزایش - افزایش
 - (۴) افزایش - کاهش - کاهش
- ۳۹- وزن هزاردانه در کدام گیاه از همه کمتر است؟
- (۱) سویا
 - (۲) کلزا
 - (۳) گلرنگ
 - (۴) پنبه
- ۴۰- خاک دهی پای بوته در سی Bazمینی می‌تواند باعث کدام تغییر شود؟
- (۱) افزایش محصول غده در واحد سطح
 - (۲) افزایش تعداد بوته در واحد سطح
 - (۳) افزایش تعداد غده در بوته
 - (۴) درشت شدن غدها
- ۴۱- کشت پاییزه چغندر قند در کدام مناطق کشور موفقیت‌آمیز بوده است؟
- (۱) گلستان
 - (۲) خراسان
 - (۳) آذربایجان
 - (۴) خوزستان
- ۴۲- بذر چاودار در مقایسه با بذرهای گندم و جو به دلیل داشتن مواد قوه زیست خود را از دست می‌دهد.
- (۱) اکسیدشونده - دیرتر
 - (۲) اکسیدشونده - زودتر
 - (۳) احیاء شونده - دیرتر
 - (۴) احیاء شونده - زودتر
- ۴۳- کدام گروه از گیاهچه‌ها، براساس قوانین آزمون جوانه‌زنی ایستا (ISTA) (جزء گیاهچه‌های طبیعی بهشمار می‌روند؟
- (۱) گیاهچه فاسدشده
 - (۲) گیاهچه پدشکل
 - (۳) گیاهچه آسیب‌دیده
 - (۴) گیاهچه با آلودگی ثانوی
- ۴۴- کدام عامل ضدکیفیت در تغذیه از علوفه‌های سبز خانواده لگوم موجب بیشترین تلفات دامها می‌شود؟
- (۱) تانین‌ها
 - (۲) الکالوئیدها
 - (۳) ساپونین‌ها
 - (۴) فلاونوئیدها
- ۴۵- کدام مورد، «شخم خوب» محسوب می‌شود؟
- (۱) عمق آن زیاد بوده و ردیفهای شخم مشخص باشد.
 - (۲) با توجه به شب زمین انجام گرفته و عمق آن کم نباشد.
 - (۳) عمق آن خیلی زیاد نباشد و ردیفهای شخم نامشخص باشد.
 - (۴) عمق آن در سراسر مزرعه یکنواخت بوده و ردیفهای شخم قابل تشخیص نباشد.
- ۴۶- اگر تراکم چغندر قند ۴۰ بوته در مترمربع و فاصله بین بوته‌ها روی ردیف ۵ سانتی‌متر باشد، فاصله ردیف‌ها چند سانتی‌متر خواهد بود؟
- (۱) ۳۰
 - (۲) ۴۰
 - (۳) ۵۰
 - (۴) ۶۰

- ۴۷- کدام ویژگی گیاهان پوششی از اصلی‌ترین نقش آن‌ها محسوب می‌شود؟
 ۱) جلوگیری از فرسایش خاک
 ۲) مبارزه با علفهای هرز
 ۳) حاصل‌خیزی خاک
 ۴) بهبود ذخیره رطوبت خاک
- ۴۸- کدام مورد بهترین زمان برگرداندن کود سبز در خاک است؟
 ۱) اوایل گلدهی
 ۲) مرحله بلوغ
 ۳) درصد گلدهی
 ۴) مراحله نیمه‌بلوغ
- ۴۹- کدام مورد، کمتر تحت تأثیر کمیت و کیفیت مواد ذخیره‌ای بذر قرار می‌گیرد؟
 ۱) اندازه گیاهچه
 ۲) درصد جوانه‌زنی
 ۳) قدرت سبزشدن
 ۴) مقاومت گیاهچه به شرایط نامساعد سبزشدن
- ۵۰- تغییر اقلیم کدام ویژگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟
 ۱) طول روز
 ۲) گل‌انگیزی
 ۳) رکود بذر گیاهان زراعی
 ۴) الگوی پراکنش و مقدار بارندگی
- ۵۱- کدام مورد، بهترین روش برای از بین بردن رکود ناشی از پوسته بذر است؟
 ۱) پس‌رسی
 ۲) شستشوی بذر
 ۳) اسکاریوفیکاسیون
 ۴) استراتیفیکاسیون
- ۵۲- برای تسريع عمل پوسیدن و تخمیر شدن بهتر بقایای کاموکلش، برای هر تن کاه چند کیلوگرم کود اوره لازم است؟
 ۱) ۶
 ۲) ۲۰
 ۳) ۳۰
 ۴) ۵۰
- ۵۳- کدام گروه از گیاهان زراعی، روزگوتاه هستند؟
 ۱) ذرت - سویا
 ۲) گندم - جو
 ۳) یونجه - چغندر قند
 ۴) آفتاب‌گردان - یادامزه‌مینی
- ۵۴- ظرفیت نگهداری رطوبت در خاکی زیادتر است که میزان ماده آلی آن و بافت آن باشد.
 ۱) بیشتر - ریزتر
 ۲) کمتر - درشت‌تر
 ۳) کمتر - ریزتر
 ۴) بیشتر - درشت‌تر
- ۵۵- کدام مورد از گیاهان زراعی، مقاوم به شوری و خشکی محسوب می‌شود؟
 ۱) لوپیا - جو
 ۲) گندم - ارزن
 ۳) گلرنگ - سورگوم
 ۴) سویا - گلرنگ

أصول باگبانی:

- ۵۶- تعداد تقریبی درختان و عملکرد درهکتار باعهای سیب متراکم روی پایه M_9 در سال هشتم به ترتیب از راست به چه چند اصله و چند گلن است؟
 ۱) ۱۵-۳۰۰
 ۲) ۳۰-۵۴۰
 ۳) ۷۰-۱۱۲۰
 ۴) ۱۰۰-۲۲۰۰
- ۵۷- گاهی اوقات در اثر قرارگیری و تلقیح با دانه گرده برخی ارقام نرخربما، زمان رسیدن میوه تغییر می‌کند. این موضوع اصطلاحاً چه نامیده می‌شود؟
 ۱) Parthenocarpy (۴)
 ۲) Metaxenia (۳)
 ۳) Apomixis (۲)
 ۴) Xenia (۱)
- ۵۸- به طورکلی قدرت محل مصرف (Sink) در کدام بافت کمترین است؟
 ۱) میوه
 ۲) ریشه
 ۳) گل
 ۴) جوانه انتهایی
- ۵۹- به کدام دلیل، خرما می‌تواند شرایط اشباع خاک را تحمل کند؟
 ۱) تبخیر و تعرق زیاد
 ۲) دور شدن ریشه‌ها از محیط اشباع
 ۳) وجود فضاهایی از هوا در بافت ریشه
 ۴) سطحی بودن ریشه‌ها
- ۶۰- کدام مورد، باعث عقیم شدن سرآغازه گل آذین انگور و تبدیل آن به پیچک می‌شود؟
 ۱) نسبت سایتوکینین به جیبریلین بالا
 ۲) وجود خوشهای میوه روی شاخه‌های فصل رشد
 ۳) حذف برگ‌ها در معرض نور قرار گرفتن جوانه‌ها

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| -۶۱ | نارنگی کلثوباترا به کدام شرایط مقاوم است؟ |
| ۱) شوری | (۳) گرما |
| ۲) در کدام مرحله، رنگ میوه خرما سبز است؟ | (۲) سرما |
| ۳) خال | (۴) تمار |
| ۴) در کدام محصولات برای باردهی اقتصادی، نیاز به درصد تشکیل میوه بیشتری است؟ | (۳) رطب |
| ۵) اطلسی از نظر گلدهی چه گیاهی است؟ | (۲) کیمری |
| ۶) در گدام مرحله، رنگ میوه خرما سبز است؟ | (۴) آلو و زردآلو |
| ۷) هلو و شلیل | (۳) سیب و گلابی |
| ۸) آبلو و گیلاس | (۴) آبلو و گیلاس |
| ۹) اگر بذر بنفسه به صورت مستقیم (بدون نشاء کاری) در بهار کشت گردد، چه اتفاقی رخ می دهد؟ | (۱) گل ها ریز می شوند. |
| ۱۰) روزگوتاه غیراجباری | (۲) روزگوتاه اجباری |
| ۱۱) اگر بذر بنفسه به صورت مستقیم (بدون نشاء کاری) در بهار کشت گردد، چه اتفاقی رخ می دهد؟ | (۳) روزگوتاه اجباری |
| ۱۲) گلبرگ ها زودتر ریزش می کنند. | (۴) گیاه به گل نمی رود. |
| ۱۳) تعداد گل ها کمتر ولی درشت تر می شوند. | (۱) روزگوتاه - روزبلند |
| ۱۴) روزهای گلخانه ای و رزهای باعجهای از نظر طول روز چگونه هستند؟ | (۲) روزگوتاه - روزخنثی |
| ۱۵) روزگوتاه - روزبلند | (۳) روزخنثی - روزخنثی |
| ۱۶) پیچ های زینتی (Ornamental vines) چه گیاهانی هستند؟ | (۴) روزبلند - روزخنثی |
| ۱۷) گیاهان چوبی پیچنده مانند پیچک | (۱) گیاهان چوبی پیچنده مانند عشقه |
| ۱۸) گیاهان علفی بالارونده مانند نیلوفر | (۲) گیاهان علفی پیچنده مانند نیلوفر |
| ۱۹) یاس زرد چه نوع درختچه ای است؟ | (۳) یاس زرد چه نوع درختچه ای است؟ |
| ۲۰) گلهای آن بعد از برگ ها ظاهر می شود. | (۱) به هرس نیاز ندارد. |
| ۲۱) گلهای آن کشت می شود و از طریق قلمه تکثیر می شود، چه نام دارد؟ | (۲) در مناطق سایه قابل کشت و کار است. |
| ۲۲) گیاه گلداشی که به عنوان میوه های زیبای آن کشت می شود (Solanum) | (۳) گلهای آن قبل از برگ ها ظاهر می شود. |
| ۲۳) گیاهان علفی (Solidago) | (۱) گدوی زینتی (Cucurbita) |
| ۲۴) آلاله و آزاله معمولاً به ترتیب از کدام طریق تکثیر می شوند؟ | (۲) گیلاسی (Citrulus) |
| ۲۵) تقسیم بوته - پیوند | (۳) گل روئینه (Solidago) |
| ۲۶) زو خه (غده) - بذر | (۱) زو خه (غده) - بذر |
| ۲۷) بذر - قلمه چوب نیمه سخت | (۲) زو خه (غده) - قلمه چوب سخت |
| ۲۸) کدام مورد، شرایط مناسب محیطی گیاهان مادری داودی برای تولید قلمه است؟ | (۳) بذر - قلمه چوب نیمه سخت |
| ۲۹) دمای حدود ۵°C - طول روز بلند | (۱) دمای حدود ۱۰°C - طول روز بلند |
| ۳۰) دمای حدود ۲۰°C - طول روز کوتاه | (۲) دمای حدود ۲۵°C - طول روز بلند |
| ۳۱) چه گیاهی است و چه رنگی از آن در ایران کشت و کار می شود؟ | (۳) دمای حدود ۳۵°C - طول روز کوتاه |
| ۳۲) Polianthes tuberosa | (۱) گل مریم - سفید |
| ۳۳) گل برف - سفید | (۲) گل پامچال - صورتی |
| ۳۴) گل مرواریدی - صورتی | (۳) گل مرواریدی - صورتی |
| ۳۵) جنسیت غالب گل ها در گیاهان خیار، گوجه فرنگی و فلفل گلخانه ای به ترتیب چگونه است؟ | (۱) ماده - کامل |
| ۳۶) ۱) ماده - کامل ۲) کامل - ماده | (۲) کامل - ماده |
| ۳۷) ۳) ماده - ماده ۴) کامل - کامل | (۳) ماده - ماده |
| ۳۸) کدام مورد در باره محیط خزانه برای تولید نشاء های باکیفیت درست تر است؟ | (۱) نور کم توام با دمای بالا باعث متراکم شدن نشاء ها می شود. |
| ۳۹) دمای خشک و خنک باعث دوکی شدن نشاء ها می شود. | (۲) محیط خشک و خنک باعث دوکی شدن نشاء ها می شود. |
| ۴۰) دمای بالا در خزانه موجب پولتینگ در نشاء ها می شود. | (۳) دمای بالا در خزانه موجب پولتینگ در نشاء ها می شود. |
| ۴۱) اگر نور کم باشد باید دما و آبیاری خزانه را کاهش داد. | (۴) اگر نور کم باشد باید دما و آبیاری خزانه را کاهش داد. |

- ۷۵- از نظر نیاز به دمای بالاتر جهت رشد و نمو، کدام ترتیب درست است؟
- (۱) گوجه‌فرنگی < فلفل < بادمجان
 - (۲) بادمجان < فلفل < گوجه‌فرنگی
 - (۳) فلفل < گوجه‌فرنگی < بادمجان
- ۷۶- کدام مورد می‌تواند از عوامل مؤثر در باز شدن سر (پیچ) در کلم پیچ باشد؟
- (۱) هوای گرم و خشک و کوددهی کم
 - (۲) هوای گرم و خشک و کوددهی زیاد
 - (۳) هوای خنک و مرطوب و کوددهی کم
- ۷۷- کدام مورد علل بوکی در غده تربجمه است؟
- (۱) کمبود پتاسیم - تنک نکردن گیاهان - هوای گرم - bolting
 - (۲) برداشت دیرهنگام - هوای گرم - bolting
 - (۳) مصرف کود نیتروژن زیاد - هوای سرد - تنک نکردن گیاهان
- ۷۸- در کدام سبزی، هدف از خاک دادن پای بوته با بقیه فرق می‌کند؟
- (۱) فلفل
 - (۲) گوجه‌فرنگی
 - (۳) سبزه‌زمینی
 - (۴) گوجه فرنگی
- ۷۹- جوانه‌زنی و سبز شدن بذر کدام سبزی به مدت زمان بیشتری نیاز دارد؟
- (۱) عصری
 - (۲) گوجه‌فرنگی
 - (۳) ترتیزک
 - (۴) کاهو
- ۸۰- در کدام سبزی، ارقام موجود «کلون» هستند؟
- (۱) پیاز خوارکی
 - (۲) شیکوره
 - (۳) پامیه
 - (۴) سیر

اصول مبارزه با آفات و بیماری‌های گیاهی:

- ۸۱- در عدم موفقیت کنترل زننده کدام مورد می‌تواند دخیل بوده باشد؟
- (۱) تعدد جفتگیری افراد ماده با نرها
 - (۲) تنها یکبار جفت‌گیری افراد ماده با نرها
 - (۳) فعال بودن افراد عقیم در محل موردنظر
 - (۴) کمبود جمعیت آفت موردنظر در طبیعت
- ۸۲- کدام مورد، دلیل عدم کارایی ویروس‌ها و باکتری‌های بیمارگر حشرات در کنترل شته‌ها است؟
- (۱) تحرک پایین شته‌ها
 - (۲) نحوه تغذیه شته‌ها از گیاهان
 - (۳) استقرار شته‌ها در زیر برگ و عدم دسترسی به آن‌ها
 - (۴) کپسوله شدن این میکروگرائیسم‌ها داخل بدن شته‌ها
- ۸۳- کدام عامل میکروبی حشره‌کش می‌تواند از طریق تخم‌های آلووه در بین جمعیت منتشر شود؟
- (۱) نماتدها
 - (۲) قارچ‌ها
 - (۳) باکتری‌ها
 - (۴) ویروس‌ها
- ۸۴- کدام مورد مفهوم Scramble competition است؟
- (۱) منابع براساس توانایی افراد تقسیم نمی‌شود.
 - (۲) کمبود منابع، خاص افراد موفق است.
 - (۳) منابع به طور مساوی بین افراد تقسیم می‌شود.
 - (۴) منابع براساس توانایی افراد تقسیم می‌شود.
- ۸۵- عبارت Mating disruption چه مفهومی دارد؟
- (۱) تعیین فاصله زمانی بین دو جفت‌گیری
 - (۲) اختلال در جفت‌گیری با استفاده از فرمان
 - (۳) شاخص لینکلن بر کدام فرض استوار است؟
- ۸۶- علامت گذاری، رفتار حیوان را تغییر می‌دهد.
- (۱) علامت گذاری، فیزیولوژی و اکولوژی حیوان را تغییر می‌دهد.
 - (۲) علامت گذاری، فیزیولوژی و اکولوژی حیوان را تغییر می‌دهد.
 - (۳) احتمال شکار حیوان علامت گذاری شده با نشده یکسان نیست.
 - (۴) حیوانات علامت گذاری شده که به طور کامل در جمعیت ادغام می‌شوند.

- ۸۷- اگر به طور میانگین وجود هر حشره در هر متر مربع موجب خسارت ۴ کیلوگرم در هکتار شود و قیمت هر کیلوگرم محصول ۵۰۰۰ ریال و هزینه مدیریت آفت ۴۰۰ ریال در هکتار باشد، در صورتی که راندمان روش کنترل به کار گرفته شده ۸٪ باشد، سطح زیان اقتصادی چند حشره در متر مربع خواهد بود؟
- (۱) ۱۲/۵
 - (۲) ۲۰
 - (۳) ۲۵
 - (۴) ۵۰
- ۸۸- در مقاومت گیاهان به حشرات، کدام مورد پدیده **Induced defense** است؟
- (۱) جبران خسارت توسط گیاهان مجاور
 - (۲) جبران خسارت توسط برگ‌های سالم گیاهی
 - (۳) جبران خسارت توسط برگ‌های سالم و گیاهان مجاور
 - (۴) شکل‌گیری دفاع غریزی گیاه طی رشد و نمو و تکامل عادی
- ۸۹- در **IPM** و مدل‌های پیش‌بینی کننده طغیان آفات، کدام مورد پدیده **Artificial Neural Network** چه نقشی دارد؟
- (۱) نشان‌دادن نمایی از اطلاعات پرواز حشرات و تشخیص جنسیت و گونه حشرات و آفات منطقه
 - (۲) مطالعات طولانی مدت مهاجرت حشرات و پیش‌بینی طغیان آفات اقتصادی مانند ملخ‌ها و کرم‌های جوانه‌خوار
 - (۳) ساختن نقشه‌های پراکنش تراکم ناحیه‌ای یا کشوری گونه‌های آفت براساس آمار حشرات به تهافتاده و با استفاده از ترسیم‌های کامپیوتری
 - (۴) فراهم‌آمدن اطلاعات آزموده به مرور در تعامل با محیط و ارائه نتایج منطقی‌تر در رابطه با پیش‌بینی جمعیت آفات و قابلیت تعمیم این راهکارها
- ۹۰- برای پیش‌بینی جمعیت آفات شهری (مانند سوسن‌ها) از کدام روش (روش‌ها) بهتر است استفاده شود؟
- Cumulative pest days & $\sum(\text{Pest days})$ (۲) Degree-day (۱)
- Cumulative pest days & Pest days (۴) Cumulative pest days & Degree-day (۳)
- ۹۱- اگر یک پارازیتویید بالغ در بدن میزبانی کوچک‌تر از خود تخم‌ریزی کند، به احتمال قوی آن پارازیتویید از کدام گروه است؟
- Proovigenic (۴) Synovigenic (۳) Idiobiont (۲) Koinobiont (۱)
- ۹۲- کدام روش برای اندازه‌گیری جمعیت حشرات پوست‌خوار (اسکولیدها) که به گیاه خسارت زده‌اند مناسب‌تر است؟
- (۱) غوطه‌ور کردن شاخه‌ها داخل آب
 - (۲) بستن شاخه به وسیله پارچه‌های ململ
 - (۳) شمارش مستقیم سوراخ‌های روی پوست
 - (۴) برداشت پوست شاخه و شمارش حشرات زیر آن
- ۹۳- کدام ترکیب روی سفیدبالک و کنه مؤثر است؟
- (۱) نوالرون (۲) فیپرونیل
- کلوفلوازورون چگونه تأثیر می‌کند؟
- (۱) اختلال در کار تنفس سلول
 - (۲) بازدارندگی سنتز چربی
 - (۳) بازدارندگی سنتز کیتین
 - (۴) بازدارندگی میت
- ۹۴- ۴/۰ میلی‌لیتر از یک مایع غلیظ امولسیون‌شونده (w/v ۳۵٪) با نیم لیتر آب مخلوط کرده و بهم می‌زنیم، غلظت این محلول براساس ماده خالص چند میلی‌گرم در لیتر است؟
- (۱) ۱۴۰
 - (۲) ۲۸۰
 - (۳) ۱۴۰۰
 - (۴) ۲۸۰۰

- ۹۶- آفت کش ایندوساکارب روی کدام آفت توصیه می شود؟
- (۱) سن گندم
 - (۲) راب گلخانه
 - (۳) ملخ صحرایی دریابی
 - (۴) پروانه مینوز گوجه فرنگی
- ۹۷- برای تهیه ۲۵۰ میلی لیتر امولسیون به غلظت ۲۰۰ ppm (بر مبنای ماده موثر) از یک حشره کش EC ۲۵ به چند میلی لیتر از ماده فرموله شده نیاز خواهد بود؟
- (۱) ۰/۰۲
 - (۲) ۰/۱
 - (۳) ۰/۲
 - (۴) ۱/۰
- ۹۸- کدام گروه حشره کش نسبت به دیگران جدیدتر است؟
- (۱) IGR
 - (۲) فرامامیدین ها
 - (۳) دی آمیدها
 - (۴) نئونیکوتینوئیدها
- ۹۹- در بین فرمولاسیون های زیر، کدام مورد با بقیه تفاوت زیادتری دارد؟
- | | | | |
|---------|---------|--------|--------|
| WDG (۴) | TEC (۳) | WP (۲) | DF (۱) |
|---------|---------|--------|--------|
- ۱۰۰- در سمعیت مزمن Mutagenicity به کدام معنی است؟
- (۱) جهش زایی
 - (۲) سلطان زایی
 - (۳) ناهنجاری زایی
 - (۴) حساسیت زایی
- ۱۰۱- نحوه تأثیر کدام مورد با بقیه متفاوت است؟
- (۱) کارتاتپ
 - (۲) ریانودین
 - (۳) فلوبن دی آمیدی
 - (۴) کلرانترالیل پرول
- ۱۰۲- کدام مورد، نقش Sulfaquinoxaline در ترکیب با Chlorophacinone در طعمه مسموم علیه موش ها است؟
- (۱) به عنوان آنتی بیوتیک بوده و مانع از تولید ویتامین K توسط میکروفافلور موجود در دستگاه گوارش می شود.
 - (۲) به عنوان ماده شدائدقادی خون عمل می کند.
 - (۳) روی سیستم عصبی موش اثر می گذارد.
 - (۴) به کبد، کلیه و مغز آسیب می رساند.
- ۱۰۳- کدام ترکیب در کار هورمون جوانی اختلال ایجاد می کند؟
- (۱) پیریمیکارب
 - (۲) فنوکسی کارب
 - (۳) پندیوکارب
 - (۴) تیودیکارب
- ۱۰۴- کدام آفت کش نسبت به pH بالا (حالت قلیایی) حساس تر است و سریع تر تجزیه می شود؟
- (۱) آبامکتین
 - (۲) دی متوات
 - (۳) استامیبرید
 - (۴) دیفلوبنزورون
- ۱۰۵- کدام ترکیب می تواند در طعمه مسموم علیه موریانه ها به کار برده شود؟
- (۱) پی متروزین
 - (۲) متالدھاید
 - (۳) هگرافلومورون
 - (۴) نوالورون
- علفهای هرز و کنترل آن ها:
- ۱۰۶- کدام مورد از ویژگی های علف کش های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات ها (فوپ ها) می باشد؟
- (۱) خاک مصرف و پهنه برگ کش
 - (۲) خاک مصرف و باریک برگ کش
 - (۳) شاخ و برگ مصرف و باریک برگ کش
 - (۴) شاخ و برگ مصرف و پهنه برگ و باریک برگ کش
- ۱۰۷- کاربرد کدام علف کش در خاک ممکن است در سیکل تناوبی سیب زمینی - گندم مشکلاتی را ایجاد کند؟
- (۱) پاراکوات
 - (۲) وید مستر
 - (۳) متري بوزين
 - (۴) گلیفوسیت
- ۱۰۸- انتقال علف کش های بازدارنده فتوسیستم II عمده از طریق کدام اندام انجام می شوند؟
- (۱) آوند آپکش
 - (۲) آوند چوبی
 - (۳) هم آپکش و هم چوبی
 - (۴) در داخل گیاه حرکت ندارند.

- ۱۰۹- کدام مورد، مهم‌ترین عامل پراکنش بذر دارواش است؟

- (۱) باد (۲) خودپراکنی (۳) پرندگان (۴) حشرات

- ۱۱۰- کدام مورد را می‌توان از اهداف درازمدت کنترل بیولوژیکی دانست؟

(۱) افزایش کارایی با تنوع در تغذیه انواع علفهای هرز

(۲) استقرار تعادل اکولوژیکی بین عامل بیولوژیکی و علف هرز

(۳) افزایش کارایی عامل کنترل بیولوژیکی و تسريع در حذف علفهای هرز

(۴) کاهش تولید گیاه زراعی در اثر سرعت تغذیه علف هرز ناشی از تعداد و تکثیر عامل بیولوژیکی

- ۱۱۱- با افزایش مقدار ماده آلی خاک، مقدار علفکش مورد نیاز در خاک چه تغییری می‌کند؟

(۱) کاهش می‌یابد.

(۲) نباید علفکش استفاده شود.

(۳) افزایش می‌یابد.

- ۱۱۲- کدام مورد دقیق‌ترین روش برای کالیبره کردن سمپاش است؟

(۱) سمپاشی یک مساحت مشخص و اندازه‌گیری محلول سمپاشی شده

(۲) استفاده از وسایل ویژه اندازه‌گیری، چارت‌ها و منحنی‌های از قبل آماده شده

(۳) استفاده از جداول آماده حاوی اطلاعاتی مانند فاصله نازل‌ها، فشار، سرعت و حجم خروجی

(۴) محاسبه مساحت سمپاشی شده در ساعت در سرعت خاص و محاسبه آن بر حسب لیتر در هکتار

- ۱۱۳- کدام گونه از علفهای هرز، میزان بذر بیشتری تولید می‌کند؟

(۱) پیچک (۲) اویارسلام (۳) سیزاب ایرانی (۴) تاج خروس

- ۱۱۴- کدام گونه از علفهای هرز، در اکوسیستم‌های آبی دیده می‌شوند؟

Solanum nigrum (۲) *Cyperus rotundus* (۱)

Eichhornia crassipes (۴) *Cynodon dactylon* (۳)

- ۱۱۵- اندازه قطرات علفکش تحت تأثیر کدام عامل تغییر می‌کند؟

(۱) فشار نازل (۲) تغییر سرعت حرکت تراکتور

(۳) تغییر در اندازه بوم سمپاش

- ۱۱۶- در کدام مورد، گلیفوسيت به صورت انتخابی عمل می‌کند؟

(۱) باغات (۲) کنترل چندساله‌ها

(۳) گیاهان ترانس ژنیک

- ۱۱۷- اگر میزان آب مصرفی در یک سمپاش ۴۰۰ لیتری ۲۰۰ لیتر در هکتار و میزان سم توصیه شده یک لیتر در هکتار

باشد، برای سمپاشی ۲ هکتار چه میزان علفکش باید به مخزن سمپاش اضافه کرد؟

(۱) ۲

(۲) ۴

(۳) ۵

(۴) ۶

- ۱۱۸- آستانه اقتصادی کنترل کدام علف هرز در تراکم‌های پایین‌تر است؟

(۱) توق (۲) سلمه تره (۳) تاج خروس (۴) گل جالیز

- ۱۱۹- کنترل کدام علف هرز در سال آیش از طریق عمل آفتاده‌هی خاک **Soil solarization** مرسوم‌تر است؟

(۱) توق (۲) غربیلک (۳) کیسه کشیش (۴) گل جالیز

- ۱۲۰- با فرض کافی بودن رطوبت و عناصر غذایی خاک، در مقایسه علفهای هرز سه و چهارکربنه، اگر CO_2 هوا دو برابر شود، کدام مورد درست است؟
- افزایش CO_2 هوا بهنفع سه کربنه‌ها است.
 - افزایش CO_2 هوا بهنفع چهارکربنه‌ها است.
- (۳) دو برابر شدن CO_2 باعث کاهش راندمان مصرف آب و تولید کربوهیدرات در C_4 می‌شود.
- (۴) چون سرعت رشد در گیاهان C_4 بیشتر از C_3 است، پس افزایش CO_2 بهنفع گیاهان C_4 است.
- ۱۲۱- اقلیم از عوامل محیطی تأثیرگذار در چرخه زندگی علفهای هرز است؛ کدام مؤلفه جزء مؤلفه‌های اقلیمی محسوب می‌شود؟
- ارتفاع از سطح دریا
 - pH و بافت خاک
 - شیب زمین
 - باد
- ۱۲۲- کدام مورد، رابطه بین پسماندهای گیاهی در سطح خاک و کارایی علفکش‌های خاکپاش را به درستی بیان می‌کند؟
- نفوذ و کارایی یک علفکش در خاک فقط بستگی به بافت و ریزدانه‌های خاک دارد.
 - هرچه پسمانده روی خاک بیشتر شود، نفوذ و کارایی علفکش کمتر می‌شود.
 - هرچه پسمانده روی خاک بیشتر شود، نفوذ و کارایی علفکش بیشتر می‌شود.
 - حذف پسمانده روی خاک سبب کاهش نفوذ و کارایی علفکش می‌شود.
- ۱۲۳- اولین نشانه‌های اثر علفکش‌های بازدارنده ACCase در کدام اندام گیاه دیده می‌شود؟
- برگ‌های مسن
 - برگ‌های سبز و جوان
 - مریستم‌های انتهایی و جانبی
 - در برگ و ساقه‌ها با ارغوانی شدن
- ۱۲۴- علفکش‌های شب‌اکسینی برای کنترل کدام نوع از علفهای هرز مؤثر هستند؟
- پاریک برگ‌ها
 - پهنه برگ‌ها
 - پهنه برگ‌ها و بعضی پاریک برگ‌ها
 - پاریک برگ‌ها و بعضی پهنه برگ‌ها
- ۱۲۵- کدام عامل در بادبردگی علفکش‌های خاک مصرف مؤثر است؟
- زمان سرمایشی
 - نحوه عمل علفکش
 - سرعت و جهت حرکت باد
 - فشار بخار ماده مؤثر علفکش
- ۱۲۶- سرعت تجزیه میکروبی علفکش‌های آلی در کدام خاک زیادتر است؟
- خاک‌های حاصلخیز گرم و خشک با تهویه کم و pH قلیایی
 - خاک‌های غیرحاصلخیز سرد و مرطوب با تهویه و pH مطلوب
 - خاک‌های حاصلخیز گرم و مرطوب با تهویه خوب و pH مطلوب
 - خاک‌های غیرحاصلخیز سرد و خشک با تهویه خوب و pH اسیدی
- ۱۲۷- کدام موارد به ترتیب انگل کامل و نیمه انگل هستند؟
- استرایگا - داروаш
 - سس - دارواش
 - دارواش - استرایگا
 - استرایگا - گل جالیز
- ۱۲۸- بروز مقاومت با کاربرد متوالی کدام علفکش در گندم سریع تر ایجاد می‌شود؟
- دیکلوفوپ (ایلوکسان)
 - پرومکسینیل (پاردنر)
 - توفوردی + امسی بی‌ای
 - مزوسولفوران + یدوسولفوران (أتلاتیس)
- ۱۲۹- کدام گیاهان هرز، معمولاً در طرفین جاده‌ها دیده می‌شوند؟
- Chenopodium album-Alhagi persarum*
 - Datura stramonium-Xanthium strumarium*
 - Portulaca-Amaranthus retroflexus oleracea -Solanum nigrum*
 - Cousinia eryngioides-Bromus danthoniae-Marrubium vulgar*

- ۱۳۰- کدام مورد در رابطه با رقابت اندامهای هوایی است؟

- (۲) نسبت بالای ساقه به ریشه
- (۴) اکسیژن - نسبت بالای ریشه به ساقه
- (۱) مواد غذایی - اکسیژن
- (۳) اکسیژن - نسبت بالای ساقه به ریشه

گیاه‌شناسی:

- ۱۳۱- در گیاه کاج، کدام ساختار ترشحی یافت می‌شود؟

- (۱) لاتیسیفر بندبند
- (۲) هیداتودها
- (۳) لاتیسیفر منشعب
- (۴) حفره شیزوژنی

- ۱۳۲- تشکیلات ثالث در ریشه چغندر، نتیجه فعالیت کدام بافت گیاهی است؟

- (۱) رشد غیرعادی چوب ثانویه
- (۲) رشد غیرعادی مغز ریشه
- (۳) لایه‌های زاینده مکرر
- (۴) رشد غیرعادی آبکش ثانویه

- ۱۳۳- برگی که محور راشی و برگچه‌های متعدد دارد، چه نامیده می‌شود؟

- (۱) مرکب شانه‌ای
- (۲) مرکب پنجهای
- (۳) ساده شانه‌ای
- (۴) ساده پنجهای

- ۱۳۴- در نوشتن نام علمی یک گونه مخفف نمودن کدام بخش مجاز است؟

- (۱) جنس و صفت گونه‌ای
- (۲) جنس
- (۳) صفت گونه‌ای و مؤلف
- (۴) صفت گونه‌ای

- ۱۳۵- در دمبرگ بگوینا، کدام نوع کلاتشیم یافت می‌شود؟

- (۱) حفره‌ای
- (۲) حلقوی
- (۳) گوشه‌ای
- (۴) ورقه‌ای

- ۱۳۶- در کدام تیره تخدمان تحتانی، تعکن محوری و یا جانبی و نافه *gynostemium* است؟

- (۱) نرگس
- (۲) ارکیده
- (۳) زنبق
- (۴) سوسن

- ۱۳۷- بافت **Epiteme** در کدام قسمت گیاه قرار دارد؟

- (۱) تارهای کشنده
- (۲) روزنه‌های آبی
- (۳) روزنه‌های هوایی
- (۴) نزدیک به کلاهک ریشه

- ۱۳۸- خصوصیات زیر مربوط به کدام تیره است؟

«گیاه گوشتی - گل‌ها کوچک، بدون گلبرگ و پر، تخمک قاعده‌ای - تخدمان فوقانی و میوه فندقه»

- (۱) Crassulaceae
- (۲) Caryophyllaceae
- (۳) Amaranthaceae
- (۴) Chenopodiaceae

- ۱۳۹- مشخصات زیر مربوط به کدام تیره است؟

«برگ‌های ساده، بدون دمبرگ، متقابل، گره‌های متورم و گل آذین گرزن دوسویه، میوه کپسول»

- (۱) Caryophyllaceae
- (۲) Chenopodiaceae
- (۳) Cannabaceae
- (۴) Polygonaceae

- ۱۴۰- کدام عبارت درباره گیاهان تیره گل سرخ درست است؟

- (۱) برگ‌ها فاقد گوشوارک - گل منظم و پر - درای هیپانتیوم - میوه شفت
- (۲) برگ‌ها مرکب - گل نامنظم - پیوسته گلبرگ - بدون هیپانتیوم - میوه کپسول
- (۳) برگ‌ها مرکب - گل منظم و پنج پر - دارای هیپانتیوم - میوه به اشکال مختلف
- (۴) برگ‌ها ساده - گل‌ها تک جنس - مادگی دوبرچه‌ای - بدون هیپانتیوم - میوه فندقه

- ۱۴۱- میوه در جنس داغداغان چیست و این جنس به کدام تیره گیاهی تعلق دارد؟

- (۱) سamar - اولماسه
- (۲) سamar - موراسه
- (۳) شفت - اولماسه
- (۴) شفت - موراسه

- ۱۴۲- در کدام تیره گیاهی، کاسه گل مضاعف دیده می‌شود؟

- (۱) Chenopodiaceae
- (۲) Caryophyllaceae
- (۳) Magnoliaceae
- (۴) Berberidaceae

- ۱۴۳- متابریلم (Metaxylem) در ساقه یک گیاه گل دار دو لپهای از چه نوع سلول هایی تشکیل شده است؟
- (۱) ول، فیبر، پارانشیم
 - (۲) تراکنید، فیبر، پارانشیم
 - (۳) ول، اسکلراید، پارانشیم
- ۱۴۴- اگر در ساقه گیاهی فلوئن (کامبیوم چوب پنبه) در وسط آوند آبکش اولیه تشکیل شود، چه بافت هایی تشکیل پوسته جدا شده گیاه (outer bark) را خواهد داد؟
- (۱) کورتکس، اپیدرم
 - (۲) نیمه آوند آبکش اولیه، آبکش پسین
 - (۳) نیمه آوند آبکش اولیه، کورتکس، اپیدرم
- ۱۴۵- کدام یک از مواد زیر به حالت محلول در واکوئل قرار دارد؟
- (۱) تانن ها
 - (۲) لعاب ها
 - (۳) شیرابه ها
 - (۴) آنتوسیانین ها
- ۱۴۶- کدام یک از سلول های زیر در هنگام بلوغ، هسته خود را از دست می دهد؟
- (۱) سلول های همراء
 - (۲) لوله های آبکش
 - (۳) سلول های پارانشیم آبکشی
 - (۴) سلول های آلبومن دار
- ۱۴۷- در کدام گیاهان هیپاتیوم گوشته است و به دیواره تخمدان اتصال دارد؟
- (۱) سبب و به
 - (۲) آلو و سبب
 - (۳) زرد آلو و آبالو
 - (۴) گل سرخ و زالزالک
- ۱۴۸- کدام یک از گیاهان زیر دارای کاسه رنگی و رشد یافته است؟
- (۱) میخک
 - (۲) لاله عباسی
 - (۳) گل کاغذی
 - (۴) آفتاب گردان
- ۱۴۹- تمکن در گیاهان لاله، میخک و پامچال به ترتیب از راست به چپ کدام است؟
- (۱) کناری - محوری - مرکزی
 - (۲) محوری - کناری - کناری
 - (۳) محوری - مرکزی - کناری - مرکزی
 - (۴) مرکزی - کناری - محوری
- ۱۵۰- در کدام تیره، تخمدان تحتانی، مادگی دو برجهای متصل بهم، خامه ها جدا و میوه دو فندقه است؟
- (۱) نعنای
 - (۲) آلاله
 - (۳) زیتون
 - (۴) جعفری
- ۱۵۱- در کدام جنس از گیاهان تیره Solanaceae، میوه از نوع کپسول است؟
- | | | | |
|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Capsicum</i> (۴) | <i>Physalis</i> (۳) | <i>Atropa</i> (۲) | <i>Datura</i> (۱) |
|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
- ۱۵۲- کدام گیاه مهمیز یا اپرون دارد؟
- (۱) میخک
 - (۲) شمعدانی
 - (۳) شببو
 - (۴) تاج الملوك
- ۱۵۳- صفت دوپرچمی از اختصاصات کدام تیره است؟
- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| <i>Oleaceae</i> (۲) | <i>Asteraceae</i> (۱) |
| <i>Ranunculaceae</i> (۴) | <i>Magnoliaceae</i> (۳) |
- ۱۵۴- کدام یک از جنس های زیر از نظر غنای گونه ای در ایران در مرتبه نخست قرار دارد؟
- | | |
|----------------------|-----------------------|
| <i>Tulipa</i> (۲) | <i>Salvia</i> (۱) |
| <i>Taraxacum</i> (۴) | <i>Astragalus</i> (۳) |
- ۱۵۵- میوه هایی که در محل رگبرگ پشتی بوجه باز می شوند، چه نام دارند؟
- (۱) لوکولیسید (Loculicide)
 - (۲) سپتی سید (Septicide)
 - (۳) پوریسید (مجری) (Septifrage)