

370

F



نام :
نام خانوادگی :
 محل امضاء :

دفترچه شماره ۲
صبح پنجشنبه
۹۳/۱۱/۱۶



اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان منجذب آموزش کشور

آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل – سال ۱۳۹۴

مجموعه فوتونیک – کد ۱۲۰۵

تعداد سوال: ۲۰

مدت پاسخگویی: ۳۰ دقیقه

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	اپتیک	۲۰	۱۱۱	۱۳۰

این آزمون نمره منفی دارد.
استفاده از ماشین حساب محظوظ نیست.

بهمن ماه – سال ۱۳۹۳

حق جا، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و ...) پس از برگزاری آزمون، برای نفعی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان محظوظ نیست و با مخالفین برای غفران رفتار نمی شود.

۱۱۱- زاویه بروستر برای چه نوع مُدی وجود دارد؟

(۱) TE

(۲) TM

(۳) هر دو مُد TE و TM

(۴) به نوع مُد بستگی ندارد و فقط به زاویه تابش بستگی دارد.

۱۱۲- یک لایه به ضریب شکست $1/2$ بر روی یک زیر لایه به ضریب شکست $1/5$ نشانده شده است. در صورتی که

ضخامت لایه برای نور زرد $\frac{\lambda}{4}$ باشد، توان بازتاب، R، در تابش عمودی برای این طول موج چقدر است؟

(۱) $(\frac{1}{3})^2$

(۲) $(\frac{1}{3})^4$

(۳) $(\frac{1}{7})^2$

(۴) $(\frac{1}{7})^4$

۱۱۳- برای دو طول موج $\lambda_2 = 600 \mu\text{m}$ ، $\lambda_1 = 300 \mu\text{m}$ ، نسبت پراکندگی λ_2/λ_1 به پراکندگی λ_2 چقدر است؟

(۱) $\frac{1}{16}$

(۲) $\frac{1}{8}$

(۳) ۸

(۴) ۱۶

۱۱۴- برای یک عدسی به ضریب شکست ۲، نسبت شعاع سطح اول به سطح دوم، $| \frac{r_1}{r_2} |$ ، چقدر باشد تا کمترین

ابیراهی کروی را داشته باشیم؟

(۱) صفر

(۲) $0/2$

(۳) ۵

(۴) بینهایت

۱۱۵- گرته پراش مربوط به یک شکاف خیلی باریک است و هرگاه شکاف بازتر شود گرته می‌شود.

(۱) پرنور و پهن - باریک‌تر و کم‌نور‌تر

(۲) کم نور و پهن - باریک‌تر و روشن‌تر

(۳) پرنور و باریک - پهن‌تر و کم‌نور‌تر

(۴) کم نور و باریک - پهن‌تر و پرنور‌تر

۱۱۶- در یک دوشکافی اگر فاصله بین دو شکاف 2 mm و پهنای هر شکاف 5 mm باشد، تعداد بیشینه‌هایی که در زیر پوش پراش میانی قرار می‌گیرند، چند است؟

- (۱) ۳
(۲) ۵
(۳) ۷
(۴) ۹

۱۱۷- یک لایه ناز به ضخامت 40 nm و ضریب شکست $n = \frac{4}{3}$ در آب (با ضریب شکست $\frac{1}{2}$) غوطه‌ور است. نور سفید از درون آب به طور عمودی به آن می‌تابد. برای چه طول موجی در ناحیه مرئی بیشترین بازتاب را خواهیم داشت؟

- (۱) 480 nm
(۲) 512 nm
(۳) 640 nm

(۴) بازتاب نور مرئی در آب وجود ندارد.

۱۱۸- یک نور قطبیده خطی و یک نور کاملاً ناقطبیده، با دامنه میدان الکتریکی یکسان، با یکدیگر ترکیب می‌شوند. در این صورت درجه قطبیدگی آنها چقدر است؟

- (۱) $\frac{1}{2}$
(۲) $\frac{2}{3}$
(۳) $\frac{3}{4}$
(۴) ۱

۱۱۹- پرتویی از سطح یک عدسی برمی‌خیزد و پس از طی مسافت 20 cm به یک عدسی با فاصله‌ی کانونی 5 cm می‌رسد. پس از عبور از عدسی ماتریس تبدیل پرتو بر حسب متر کدام است؟

$$\begin{bmatrix} 1 & 0/2 \\ -\frac{1}{5} & -3 \end{bmatrix} \quad (1)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0/2 \\ -\frac{1}{5} & 5 \end{bmatrix} \quad (2)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0/2 \\ -20 & -3 \end{bmatrix} \quad (3)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0/2 \\ -20 & 5 \end{bmatrix} \quad (4)$$

۱۲۰- اگر نورقطبیده خطی با دامنه E_0 و نور قطبیده دایره‌ای با دامنه E' که در راستای z انتشار می‌باشد، دارای

تابندگی یکسان باشند، در این صورت نسبت $\frac{E'}{E_0}$ چقدر خواهد بود؟

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \quad (1)$$

$$\frac{1}{2} \quad (2)$$

$$1 \quad (3)$$

$$2 \quad (4)$$

۱۲۱- دو عدسی نازک به فاصله کانونی 10 cm داریم. در صورتیکه بخواهیم با استفاده از این دو عدسی یک عدسی با فاصله کانونی 20 cm داشته باشیم، فاصله جدایی این دو عدسی از یکدیگر چند سانتی‌متر باید باشد؟

$$10 \quad (1)$$

$$12 \quad (2)$$

$$15 \quad (3)$$

$$20 \quad (4)$$

۱۲۲- فلزی با ضریب خاموشی 4 و قسمت حقیقی ضریب شکست 2 ، در فرود عمودی دارای چه توان بازتابی است؟

$$\frac{5}{13} \quad (1)$$

$$\frac{5}{19} \quad (2)$$

$$\frac{17}{19} \quad (3)$$

$$\frac{17}{25} \quad (4)$$

۱۲۳- ضریب شکست ماده‌ای به صورت $i = N/\sqrt{2}$ می‌باشد. تغییر فازی که در بازتاب، هنگام فرود عمودی نور رخ می‌دهد، چند درجه است؟

$$45 \quad (1)$$

$$90 \quad (2)$$

$$\tan^{-1}(\sqrt{2}) \quad (3)$$

$$\tan^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \quad (4)$$





۱۲۴- از یک پرتو نور لیزر با تابندگی I و طول همدوسي 30 m ، دو پرتو یکی با تابندگی $I/2$ و دیگری با تابندگی $I/8$ ، ایجاد می‌شود. این دو پرتو با اختلاف راه نوری 3 m دوباره با یکدیگر تداخل می‌کنند. نمایانی فریزها در این حالت چقدر است؟

(۱) تقریباً 1° (۲) 72° (۳) 9° (۴) 1°

۱۲۵- یک تیغه نازک چارک موج متوازی السطوح در هوا با پرتو نوری به صورت عمودی روشن می‌شود. ضریب شکست تیغه برابر ۲ است. اگر از جذب نور درون تیغه صرف نظر شود، توان تراگسیل نور عبوری چقدر است؟

(۱) $\frac{4}{5}$ (۲) $\frac{8}{9}$ (۳) $\frac{16}{25}$ (۴) $\frac{64}{81}$

۱۲۶- کدام شکل می‌تواند مشخص کننده صفحات اصلی برای یک عدسی گوز- تخت باشد؟



۱۲۷- باریکه‌ای موازی به طول موج 500 nm به یک عدسی همگرا به قطر 2 cm و به فاصله کانونی 40 cm تابانده می‌شود. قطر تقریبی قرص ایری که به صورت نقش پراش در صفحه‌ی کانونی ظاهر می‌شود، چند میکرومتر است؟

(۱) 10 (۲) $11/2$ (۳) 20 (۴) $24/4$

۱۲۸- در یک توری به پهنای 2cm در صورتی که از نوری به طول موج 500nm استفاده شود و بخواهیم در پوش مرتبه‌ی اول توان تفکیک $1/\circ\text{nm}$ را داشته باشیم، توری باستی چند خط در میلی‌متر داشته باشد؟

- (۱) 250
- (۲) 500
- (۳) 2500
- (۴) 5000

۱۲۹- کدام عبارت برای یک تیغه $\frac{\lambda}{4}$ صحیح است؟

(۱) محور تند باید در جهت انتشار پرتو قرار گیرد.

(۲) محور کند باید در جهت انتشار پرتو قرار گیرد.

(۳) یکی از محورهای تند و یا کند باستی در جهت انتشار پرتو قرار گیرد.

(۴) محور تند و کند تیغه باستی در صفحه عمود بر جهت انتشار پرتو باشد.

۱۳۰- پرتویی غیرقطبی در جهت z ثابت به یک سری مولکول‌های پراکنده کننده مطابق شکل برخورد می‌کند.
پرتویی که در جهت x پراکنده می‌شود، حالت قطبیش آن چگونه است؟

- (۱) قطبیده خطی در جهت z
- (۲) قطبیده خطی در جهت x
- (۳) قطبیده خطی در جهت y
- (۴) غیرقطبی

