

نام :

نام خانوادگی :

محل امضاء :



صبح جمعه
۹۲/۱۲/۱۶
دفترچه شماره (۱)



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.
امام خمینی (ره)

آزمون ورودی دوره‌های دکتری (نیمه مرکز) داخل سال ۱۳۹۳

مجموعه علوم خاک (۲۴۲۲) —پیدایش و رده‌بندی و ارزیابی خاک

مدت پاسخگویی: ۱۲۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۸۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی (شیمی و حاصلخیزی خاک، فیزیک و حفاظت خاک، رده‌بندی و ارزیابی خاک - روابط آب و خاک و گیاه تکمیلی، زنگ و کانی‌شناسی خاک، رده‌بندی و ارزیابی اراضی)	۸۰	۱	۸۰

استندهای سال ۱۳۹۲

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی‌باشد.

-۱

عناصر فعال در واکنش جداسازی آب در فرآیند فتوسنتز کدام هستند؟

- (۱) منگنز و کلر (۲) پتاسیم و منگنز (۳) مولیبدن و منگنز (۴) منیزیم و کلر

-۲

جذب عنصر از طریق جربان توده‌ای با کدام عامل رابطه معکوس دارد و کاهش می‌یابد؟

- (۱) آب قابل استفاده گیاه در خاک (۲) سرعت بالای باد و رطوبت نسبی پایین

-۳

(۳) نور خورشید با شدت بالا و آب کافی (۴) هوای سرد و ابری و رطوبت کافی

-۴

اگر گیاهی رنگ پریده یا رشد آن کند باشد ولی در آزمایش تجزیه گیاه مقادیر K,P,N را بالا نشان دهد، این مستعله بیانگر چیست؟

- (۱) برهم کنش عناصر با یکدیگر (۲) حضور کافی عناصر غذایی

-۵

(۳) حضور ناکافی عناصر غذایی (۴) وجود عامل محدود کننده دیگر رشد

كمبود کدام عنصر موجب افزایش میزان ازت محلول در سلول‌های گیاهی می‌گردد؟

-۶

- (۱) پتاسیم و فسفر (۲) پتاسیم و گوگرد (۳) قسفر و گوگرد (۴) پتاسیم و سدیم

-۷

در کمبود خفیف عنصر غذایی در اندام هوایی گیاه آیا نشانه ظاهری و کاهش عملکرد دیده می‌شود؟

- (۱) تنها نشانه ظاهری قابل روئیت است.

-۸

(۲) نشانه ظاهری و کاهش عملکرد اتفاق می‌افتد.

- (۳) تنها کاهش عملکرد به میزان کم (حدود ۱۰ درصد) اتفاق می‌افتد.

-۹

(۴) نشانه ظاهری مشاهده می‌شود ولی کاهش عملکرد دیده نمی‌شود.

-۱۰

با توجه به داده‌های زیر نقش حرکت توده‌ای و تماس ریشه‌ای به ترتیب در رساندن کلسیم (Ca^{+2}) به سطح ریشه برای

جذب چند کیلوگرم در یک هکتار است؟ (غلظت کلسیم در محلول خاک ۶۰۰۰ میلی‌گرم در لیتر، میزان کلسیم تبادلی ۶۰۰۰ کیلوگرم در هکتار، میزان آب جذب شده ۲/۵ میلیون لیتر در هکتار و با فرض اینکه ۱ درصد حجم خاک را ریشه فعال

تشکیل می‌دهد)

-۱۱

- (۱) ۱۰۰-۱۰۰

-۱۲

- (۲) ۶۰-۱۵۰

-۱۳

- (۳) ۶۰۰-۱۵۰۰

-۱۴

(۴) با توجه به داده‌های موجود، محاسبه نقش حرکت توده‌ای و تماس ریشه‌ای مقدور نیست.

-۱۵

غلظت نیتروژن-نیتراتی در خاکی ۵ (پنج) میلی‌گرم در کیلوگرم خاک است. چند کیلوگرم کوداوه (N=۱۴) باید به یک

هکتار خاک به عمق ۳۰ سانتی‌متر (وزن خاک چهار میلیون کیلوگرم) اضافه کنیم تا غلظت نیتروژن-نیتراتی به ۲۰

-۱۶

میلی‌گرم در کیلوگرم خاک برسد؟ (با فرض اینکه هیچگونه هدر روی نیتروژن صورت نگرفته باشد).

(عدد جرمی: O=۱۶ و N=۱۴: N=۱۴ و O=۱۶)

-۱۷

- (۱) ۱۳۰/۴ (۲) ۲۶۰/۸ (۳) ۲۸۸/۸ (۴) ۵۷۷/۵

-۱۸

در محلولی غلظت‌های کلسیم، منیزیم و کلراید به ترتیب ۱۵۰، ۱۰۰ و ۲۵۰ میلی‌اکی‌والان در لیتر است. اگر این محلول

فاقد سایر نمک‌ها باشد، قدرت یونی محلول چند مول در لیتر است؟

-۱۹

- (۱) ۰/۲۸۶ (۲) ۰/۳۷۵ (۳) ۰/۶۲۵ (۴) ۱/۱۲۵

-۲۰

به ۵ گرم از یک خاک سدیمی ۱۰۰ میلی‌لیتر محلول اشباع گچ اضافه شده و بعد از تکان دادن و سانتریفیوژ کردن غلظت

-۲۱

کلسیم در محلول تعادلی ۱۰ میلی‌اکی‌والان در لیتر اندازه‌گیری می‌شود. گچ مورد نیاز برای اصلاح کامل این خاک چند

-۲۲

میلی‌اکی‌والان بر صد گرم خاک است؟ (۱ meq l⁻¹ = غلظت کلسیم در محلول اشباع گچ)

-۲۳

- (۱) ۱۰ (۲) ۲۰ (۳) ۳۰ (۴) ۴۰

-۲۴

در معادله همدماهی جذب لانگمویر اگر KC باشد، آنگاه همدما از نوع است.

-۲۵

- (۱) خطی (۲) سیگموئیدی (۳) فروند لیچ (۴) BET

- ۱۱ اگر فشار جزئی گاز CO_2 در هوا $\text{atm} = 0.1, 10^{-3/5}$ باشد، PH آب باران چقدر است؟
- $$\frac{[\text{HCO}_3^-]}{[\text{H}_2\text{CO}_3]} = 10^{-1/5} \text{ Matm}^{-1}, K_{\text{a}1} = 10^{-6.35}$$
- (۱) ۵/۳۵ (۲) ۵/۴۵ (۳) ۵/۵۵ (۴) ۵/۶۵
- ۱۲ مقاومت به هوا دیدگی در کانی‌ها یا گروه کانی‌های مشخص شده به چه ترتیب است؟
- اولیوین > فلد سپارهای پتاسیم‌دار > بیوتایت > کوارتز
 - اولیوین > آجایت > فلد سپارهای پتاسیم‌دار > بیوتایت > کوارتز
 - اولیوین > آجایت > بیوتایت > فلد سپارهای پتاسیم‌دار > کوارتز
 - اولیدین > بیوتایت > آجایت > فلد سپارهای پتاسیم‌دار > کوارتز
- ۱۳ در دو نمونه A و B از یک خاک، ESP مساوی و برابر با ۴۲ درصد می‌باشد. ولی بقیه ظرفیت تبادلی در نمونه A با یون‌های کلسیم و منیزیم و در نمونه B با یون آمونیم اشغال شده است. حال اگر به یک گرم از هر یک از دو نمونه 50°C از محلول کلریدلیتیوم اضافه و خوب به هم بزنیم، مقدار سدیم جایگزین شده چه وضعیتی دارد؟
- در نمونه A بیشتر خواهد بود.
 - در نمونه B بیشتر خواهد بود.
 - در هر دو نمونه یکسان خواهد بود.
 - در غلظت‌های کم کلریدلیتیوم در نمونه B و در غلظت‌های زیاد در نمونه A بیشتر خواهد بود.
- ۱۴ فرمول نیم واحد سلولی یک کانی رس به صورت $[\text{Al}_{0.6}\text{Mg}_{2.4}\text{Si}_{2.6}\text{Al}_{1.4}\text{O}_{10}(\text{OH})_2]$ می‌باشد. این کانی رس متعلق به کدام گروه از کانی‌ها است؟
- سربنتین‌ها
 - میکاها
 - اسمکتیت‌ها
 - ورمی کولیت‌ها
- ۱۵ اگر نقطه H در پروفیل خاک بعد از توقف بارندگی پتانسیل فشاری برابر با $+30$ سانتی‌متر داشته باشد و پس از گذشت دو هفت‌تۀ پتانسیل ماتریک آن به -20 سانتی‌متر برسد، در طول این دو هفت‌تۀ سطح ایستایی چند سانتی‌متر پایین رفته است؟
- (۱) ۱۰ (۲) ۲۰ (۳) ۳۰ (۴) ۵۰
- ۱۶ آبیاری و زهکشی خاک باعث می‌شود که:
- دماي خاک سطحی در تابستان افزایش يافته و در زمستان کاهش داشته باشد.
 - دماي خاک سطحی در تابستان کاهش يافته و در زمستان افزایش داشته باشد.
 - دماي خاک سطحی در هر دو فصل افزایش داشته باشد.
 - دماي خاک سطحی در هر دو فصل کاهش داشته باشد.
- ۱۷ علت انحراف سطح آب در لوله مویین کدام است؟
- تفوق نیروی ادھیژن بر کوهیژن
 - چسبناک بودن جداره لوله مویین
 - اختلاف فشار بیرون و درون لوله
 - برای ارزیابی امکان سله بندی خاک کدام یک از خصوصیات ملاک بهتری است؟
- بافت خاک
 - پایانی خاک
 - سطح ویژه ذرات خاک
 - پایداری ساختمان خاک
- ۱۸ در حرکت آب در خاک:
- شدت جریان واقعی و دارسی برابرند.
 - شدت جریان دارسی کمتر از شدت جریان واقعی است.
 - شدت جریان دارسی بیشتر از شدت جریان واقعی است.
 - بسته به بافت خاک، شدت جریان واقعی و دارسی متفاوتند.

-۲۰

مقدار عددی عامل P در معادله جهانی فرسایش خاک در کشت بر روی خطوط تراز، و کشت نواری در بهترین حالتها نسبت به مقدار P در کرت استاندارد به ترتیب معادل و می باشد.

- (۱) نصف - یک چهارم
- (۲) یک چهارم - نصف
- (۳) نصف - نصف

در روش عدد منحنی رواناب (CN)، چنانچه ظرفیت نگهداشت خاک صفر باشد، ضریب رواناب بارندگی چقدر خواهد بود؟

- (۱) صفر
- (۲) 45°
- (۳) 45°

-۲۱

اگر در یک دامنه به طول شیب 100° متر، گاو آهنی به عمق شخم 20° سانتی متر خاک را در طول سال 10° سانتی متر جابجا کرده باشد، با فرض اینکه چگالی خاک 1.5 گرم بر سانتی متر مکعب باشد، فرسایش مکانیکی (شخم شیار) چند تن در هکتار است؟

- (۱) $1/5$
- (۲) 2
- (۳) $6/4$

-۲۲

اولین گام (مرحله) از یک برنامه ملی حفاظت خاک کدام است؟

- (۱) مدیریت صحیح اراضی (اصلاح کاربری)
- (۲) کنترل رسوب با سازه های مکانیکی
- (۳) مدیریت خاک

-۲۳

۴) کنترل رسوب با سازه های مکانیکی به همراه استقرار پوشش گیاهی

بر اساس روابط زیر چنانچه بارندگی فرضی با شدت 10° میلی متر و به مدت نیم ساعت رخ دهد، انرژی جنبشی و EI_3 این بارندگی به ترتیب چقدر خواهد بود؟

-۲۴

$$\begin{cases} e_m \rightarrow (MJ.ha^{-1}.mm^{-1}) \\ I \rightarrow (mm.h^{-1}) \end{cases}$$

$$\begin{cases} e_m = 0/119 + 0/0873 \log_{10}(I) & I \leq 76 \frac{mm}{h} \\ e_m = 0/283 & I > 76 \frac{mm}{h} \end{cases}$$

(۱) $14/15$ مگازول بر هکتار و 1415 مگازول - میلی متر بر هکتار - ساعت

(۲) $14/15$ مگازول بر هکتار و $707/5$ مگازول - میلی متر بر هکتار - ساعت

(۳) $283/0$ مگازول بر هکتار - میلی متر و $14/15$ مگازول - میلی متر بر هکتار - میلی متر - ساعت

(۴) $283/0$ مگازول بر هکتار - میلی متر و $3/28$ مگازول - میلی متر بر هکتار - میلی متر - ساعت

کدام یک از گزینه های ذیل حد بحرانی عدد فرود (F) در خصوص تلاطم جریان می باشد؟

- (۱) $0/5$
- (۲) $0/8$
- (۳) $0/9$

-۲۵

مقدار تخلخل تهويه ای خاک و کافی بودن تهويه در کدام یک از سطوح رطوبتی زیر ارزیابی می شود؟

- (۱) در رطوبت بین pwp - FC
- (۲) در رطوبت معادل مکش بین -33 تا -10 - کيلو پاسکال
- (۳) در رطوبت معادل مکش های بزرگتر از 33 کيلو پاسکال
- (۴) در دامنه رطوبتی معادل مکش ورود هوا تا 33 کيلو پاسکال

-۲۶

- ۲۷ D_{۳۰} و D_{۴۰} خاکی به ترتیب ۰٪ و ۵٪ میلی‌متر می‌باشد. این خاک چند درصد شن دارد؟
- (۱) ۳۰ (۲) ۴۰ (۳) ۶۰ (۴)
- ۲۸ خاکی با افق‌های (Bt(۳۵-۷۵cm), AB(۲۰-۳۵cm), A(۰-۲۰ cm) با بیش از یک درصد کربن آلی در همه افق‌ها و جوشش با اسید رقیق و تغییر جزئی رس، بیانگر کدامیک از موارد زیر است؟
- (۱) حضور افق مالیک به ضخامت ۲۰ سانتی متر بدون افق آرجیلیک
 (۲) حضور افق مالیک به ضخامت ۷۵ سانتی متر بدون افق آرجیلیک واضح
 (۳) حضور افق مالیک به ضخامت ۲۰ سانتی متر و افق آرجیلیک با ضخامت ۴۰ سانتی متر
 (۴) حضور افق مالیک به ضخامت ۷۵ سانتی متر و افق آرجیلیک به ضخامت ۴۰ سانتی متر
- ۲۹ در یک منطقه خاک معدنی افق‌های O_i, E, Bhs, C_x بررسی گردیده است. در این خاک، افق شناسایی اصلی کدامیک از موارد زیر می‌باشد؟
- | | | | |
|-------------|------------|--------------|-----------|
| Duripan (۴) | Spodic (۳) | Fragipan (۲) | Albic (۱) |
|-------------|------------|--------------|-----------|
- ۳۰ در مورد مرز بین رژیم زریک و یوستیک کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟
- (۱) مدت زمان تجمعی خشکی خاک بعد از انقلاب تابستانه در رژیم رطوبتی یوستیک کمتر از زریک است.
 (۲) مدت زمان تجمعی خشکی خاک بعد از انقلاب تابستانه در رژیم رطوبتی زریک کمتر از یوستیک است.
 (۳) مدت زمان متوالی خشکی خاک بعد از انقلاب تابستانه در رژیم رطوبتی زریک کمتر از یوستیک است.
 (۴) مدت زمان متوالی خشکی خاک بعد از انقلاب تابستانه در رژیم رطوبتی یوستیک کمتر از زریک است.
- ۳۱ فرآیندهای Cryoturbation و Lessivage به ترتیب در کدام گروه از خاک‌های زیر اتفاق می‌افتد؟
- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| Cryalfs و Turbels (۲) | Turbels و Cryalfs (۱) |
| Xerepts و Cryalfs (۴) | Cryalfs و Xerepts (۳) |
- ۳۲ در یک منطقه خاکی با افق‌های Lma و O_e و O_a بررسی شده، در این خاک کدامیک از گزینه‌های زیر می‌تواند صادق باشد؟
- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Humification and Mineral soil (۲) | Humification and organic soil (۱) |
| Pedoturbation and Mineral soil (۴) | Pedoturbation and organic soil (۳) |
- ۳۳ تشکیل کدامیک از کانی‌های ثانویه زیر معرف خاک‌های مربوط به خشک‌ترین اقلیم‌ها می‌باشد؟
- (۱) گوتایت و گیسبایت (۲) هماتایت و بوهمایت (۳) کربنات ثانویه و گچ ثانویه (۴) سودا، میرابلیت، ناکولیت
- ۳۴ در یک منطقه از کشور خاکی تحت عنوان Inceptisol گزارش گردیده است، کدام گروه از افق‌های زیر در داخل ۱۱۰cm از سطح خاک معدنی می‌توانند تشکیل شوند؟
- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Calcic , Gypsic , Sombritic (۲) | Calcic , Gypsic , Fragipan (۱) |
| Calcic , Placic , Sombritic (۴) | Calcic , Gypsic , Placic (۳) |
- ۳۵ در یک منطقه خاکی با افق‌های C و Byy و A بررسی شده، در این خاک افق Byy بیانگر کدام مورد زیر است؟
- (۱) افق تحت الارضی با بیش از ۵۰٪ حجمی گچ اولیه (۲) افق تحت الارضی با بیش از ۵۰٪ حجمی گچ ثانویه
 (۳) افق تحت الارضی با بیش از ۵۰٪ وزنی گچ اولیه و ثانویه (۴) افق تحت الارضی با بیش از ۵۰٪ حجمی گچ اولیه و ثانویه
- ۳۶ در ارزیابی اراضی فاریاب بوسیله سیستم پارامتریک، ایجاد تراس در مناطقی با شیب ۲-۳٪ باعث کدامیک از موارد زیر می‌باشد؟
- | | |
|---|------------------------------------|
| (۱) تأثیری در درجه اراضی نمی‌گذارد. | (۲) باعث کاهش درجه اراضی می‌شود. |
| (۴) عدم تأثیر تا شیب ۱٪ و افزایش درجه اراضی می‌شود. | (۳) باعث افزایش درجه اراضی می‌شود. |

-۳۷

- در ارزیابی اراضی فاریاب بوسیله سیستم پارامتریک، کدام یک از موارد زیر صحیح است؟
- (۱) اراضی با ۴۰٪ ژپسیم دارای درجه بالایی هستند.
 - (۲) اراضی با ۵۰٪ کربنات کلسیم و ژپسیم دارای درجه یکسان هستند.
 - (۳) اراضی با ۴۰٪ کربنات کلسیم دارای درجه بالایی هستند.
 - (۴) اراضی با ۵۰٪ کربنات کلسیم و ژپسیم به ترتیب دارای درجه پایین و بالا هستند.

-۳۸

در **Land capability system** با حرکت از کلاس I به طرف کلاس VIII کدامیک از موارد زیر حاکم می‌شود؟

- (۱) افزایش خطرات و محدودیتها و کاهش شدت استفاده زراعی
- (۲) افزایش خطرات و محدودیتها و شدت استفاده زراعی
- (۳) کاهش خطرات و محدودیتها و شدت استفاده زراعی
- (۴) کاهش خطرات و محدودیتها و افزایش شدت استفاده زراعی

-۳۹

ارزیابی اراضی در منطقه‌ای که به ترتیب مرتفع ترین نقطه آن ۱۳۷۲ و پست ترین نقطه آن ۱۳۱۲ متر از سطح دریای آزاد می‌باشد صورت گرفته، اگر فاصله این دو نقطه در روی نقشه با مقیاس ۱:۱۰۰۰ ۶۰۰۰ سانتی‌متر باشد، درصد شیب منطقه چقدر است؟

- (۱) یک صدم درصد
- (۲) یک دهم درصد
- (۳) یک درصد
- (۴) ده درصد

-۴۰

در ارزیابی اراضی فاریاب دارای $EC = \frac{dS}{m}$ بوسیله سیستم پارامتریک کدام گزینه در رابطه با مقدار ESP صحیح است؟

- (۱) درجه اراضی با افزایش ESP در کلاس بافتی ریز افزایش می‌یابد.
- (۲) درجه اراضی با افزایش ESP در کلاس بافتی ریز کاهش می‌یابد.
- (۳) درجه اراضی با کاهش ESP در کلاس بافتی ریز کاهش می‌یابد.
- (۴) درجه اراضی با افزایش ESP در کلاس بافتی ریز تغییر می‌یابد.

-۴۱

واژه انعطاف‌پذیر فنتیپیکی «phenotypic Plasticity» به چه معنومی است؟

- (۱) سازگاری ذاتی گیاهان با محیط
- (۲) انطباق گیاهان پس از مواجهه با یک استرس
- (۳) بازگشت‌پذیری ذاتی گیاهان پس از مواجهه با یک استرس
- (۴) پلاسمادسماata چیست؟

-۴۲

(۱) غشاهای دیوارهای سلولی

(۲) غشاء‌های دیوارهای پروتوپلاست

(۳) کanal‌هایی که بین دیوارهای سلولی قرار دارند.

(۴) کanal‌های میکروسکوپی که از طریق دیوارهای سلولی قرار دارند.

نقش مدیریت زراعی در افزایش کارآیی مصرف آب عمده‌تاً از کدام طریق است؟

- (۱) کاهش تعرق
- (۲) کنترل علف‌های هرز
- (۳) تغییر مسیوفوتونترزی
- (۴) کاهش برگ - آب

-۴۳

کدام مورد درباره جذب فعال آب به وسیله گیاه صحیح است؟

$$(1) \text{ جذب فعال آب از قانون } Q = -\frac{\Delta \Psi}{R} \text{ تعیین می‌کند.}$$

(۲) جذب فعال در واقع همان جذب ناشی از کشش تعرقی است.

(۳) جذب فعال تنها در شرایط کمبود آب در گیاه می‌تواند اتفاق بیافتد.

(۴) از نظر مصرف غیر مستقیم انرژی متابولیکی جذب فعال توجیه‌پذیر است.

-۴۴

در رابطه $\Psi^* + \frac{RT}{V_w} \ln e / e_s = \Psi$ مقدار Ψ دربرگیرنده کدام اجزا است؟

$$\Psi_m + \Psi_s \quad (2)$$

$$\Psi_s + \Psi_m + \Psi_p + \Psi_z \quad (4)$$

$$\Psi_s + \Psi_m + \Psi_p \quad (3)$$

$$\Psi_s \quad (1)$$

-۴۶

در مورد جذب آب توسط گیاه در طول شب و ضرورت آن کدام صحیح است؟

۱) جذب آب در طول شب اتفاق می‌افتد و در رشد مستمر گیاه واقعاً ضرورت دارد.

۲) جذب آب در طول شب اتفاق می‌افتد و برای کارساز بودن کشش تعزی در روز بعدی ضرورت دارد.

۳) جذب آب در طول شب عملاً صفر بوده و ضرورتی برای آن وجود ندارد چون فتوستتری در کار نیست.

۴) جذب آب در طول شب در رشد گیاه نقش ندارد ولی اتفاق می‌افتد و مقدار آن تقریباً در حدود ۲۰٪ کل جذب شبانه‌روزی است.

-۴۷

در اندازه‌گیری ψ بافت‌های گیاهی (مثل برگ) به روش‌های زیر، در کدام روش اثر رقیق شدن (Dilution effect) وجود ندارد؟

۲) روش رطوبت سنج ترمومکاپل

۱) روش محفظه فشار

۴) روش کاهش در دمای انجماد (سايكروسكوپي)

۳) روش EC سنجی عصاره بافت

کدام یک از روش‌های زیر برای تعیین پتانسیل اسمزی محلول‌های طبیعی (عصاره خاک و گیاه) استفاده نمی‌شود؟

۲) روش اندازه‌گیری رسانایی الکتریکی

۱) روش رطوبت سنج دما جفت

۴) روش کاهش نقطه انجماد

۳) فرمول وانت هو夫

-۴۸

بافتی با پتانسیل اسمزی $bar = 10$ در تعادل با محلولی با پتانسیل اسمزی $-3bar$ می‌باشد، پتانسیل فشاری و DPD این بافت به ترتیب کدام است؟

$-3bar$, $-2bar$ (۴)

$-2bar$, $-7bar$ (۳)

$-3bar$, $-3bar$ (۲)

$-3bar$, $-7bar$ (۱)

-۴۹

اگر حداقل تخلیه مجاز برابر 70% و FC و PWP خاک به ترتیب برابر 30 و 15 درصد حجمی باشد. مقدار آب سهل‌الوصول در یک متر عمق این خاک چند میلی‌متر است؟

150 (۴)

105 (۳)

$10/5$ (۲)

15 (۱)

-۵۰

زاله (شبیم) Gutlation چیست؟

۱) آبی که بیشتر صحیح‌ها روی سطح برگ می‌نشینند.

۲) آبی که از طریق میان بخار آب روی برگ می‌نشینند.

۳) آبی که بر اساس فشار بخار اتمسفر روی برگ می‌نشینند.

۴) آبی که به صورت قطره از آوند چوبی با فشار خارج و در سطح برگ می‌نشینند.

بازده مصرف آب به طور کلی یعنی: (WUE)

۱) کاهش مصرف آب برای افزایش بهره‌وری

۲) افزایش تولید بیومس برای افزایش بهره‌وری

۳) نسبت خروج به ورود آب در سیستم خاک، گیاه و اتمسفر

۴) افزایش بازده مصرف و تأمین آب به صورتی که از دست رفتن آب به حداقل برسد.

تنش (استرس) به چه معناست؟

-۵۲

۱) مواجهه گیاهان با کمبود و یا زیاد بود یکی از عوامل رشد

۴) مواجهه گیاهان با گرمای شدید

۳) مواجهه گیاهان با کمبود یکی از عوامل رشد

-۵۳

فشار بخار آبی $22/5$ میلی‌بار است. در صورتی که فشار بخار اشباع 24 میلی‌بار باشد، پتانسیل این آب در دمای 25 درجه سانتی‌گراد کدام است؟ (ثابت گازها = $8/314$ ژول بر مول درجه کلوین)

$-52bar$ (۴)

$-28/9bar$ (۳)

$-28/9bar$ (۲)

-۵۴

در تشکیل خاک Acropex کدام گروه از فرآیندهای زیر غالب می‌باشد؟

Pedoturbation and Weathering (۲)

Ferralization and Weathering (۱)

Decalcification and Weathering (۴)

Cryoturbation and Weathering (۳)

-۵۵

- | | |
|--|---|
| در تشکیل خاک Sandy, mixed, frigid, ortstein, Typic Durorthod تأثیر کدام گروه از فاكتورهای خاکسازی زیر غالب میباشد؟ | -۵۶ |
| Climate and organisms (۲) | Climate and relief (۱) |
| Organisms and parent materials (۴) | Climate and parent materials (۳) |
| کدام یک از فرآیندهای زیر غالب میباشد؟ | در خاک Fine, smectitic, thermic , Udic Haplustert -۵۷ |
| Congelli cryoturbation (۲) | Argilli pedoturbation (۱) |
| Crystal cryorbtion (۴) | Crystal pedoturbation (۳) |
| فرآیند هیدرولیز (Hydrolysis) طی خاکسازی در کدام یک از تحت ردههای زیر شدیدتر انجام شده است؟ | -۵۸ |
| Ustox (۴) | Ustepts (۳) |
| Usterts (۲) | Ustolls (۲) |
| میزان پوسیدگی مواد آلی از عمدۀ ترین تفاوت‌های کدام گروه از خاکهای ذیل میباشد؟ | -۵۹ |
| Xerolls, Udolls, Ustolls (۲) | Cambids, Calcids, Argids (۱) |
| Aquents, Fluvents, Orthents (۴) | Saprists, Hemists , Fibrists (۳) |
| در تشکیل خاک Haplic Ustarent تأثیر کدام یک از فاكتورهای زیر بیشتر میباشد؟ | -۶۰ |
| Time (۴) | Parent material (۳) |
| Organisms (۲) | Relief (۱) |
| در یک منطقه خاک Argidurid بررسی شده در این خاک کدام گروه از فرآیندها غالب میباشند؟ | -۶۱ |
| Gypsification, Leaching, Eluviation (۲) | Calcification, Leaching , Eluviation (۱) |
| Solodization, Leaching , Eluviation (۴) | Alkalizaiton , Leachinig , Eluviation (۳) |
| کدام یک از گزینههای زیر کانی رسی نمیباشد؟ | -۶۲ |
| (۲) هکتوریت | (۱) هورمایت |
| (۴) کوارتز در ابعاد کوچکتر از ۲ میکرون | (۳) سپیولیت |
| در ساختار کانیهای سیلیکاته، تعداد اکسیژنهایی که در اطراف یک اتم سیلیسیم قرار میگیرند، به چه عاملی بستگی دارد؟ | -۶۳ |
| (۱) نسبت شعاع اکسیژن به سیلیسیم | (۲) تعداد الکترون‌های ظرفیت سیلیسیم |
| (۳) نسبت شعاع سیلیسیم به اکسیژن | (۴) تعداد الکترون‌های ظرفیتی اکسیژن |
| در شرایط مشابه از نظر مواد مادری، میزان ورمیکولیت در کدام تحت رده‌ها احتمالاً بیشتر است؟ | -۶۴ |
| Orthents (۴) | Udox (۳) |
| Xeralfs (۲) | Uadults (۱) |
| CEC خیلی پایین و مقادیر بالای هماتیت و گئوئیت در کدام تحت رده‌ها محتمل‌تر است؟ | -۶۵ |
| Udolls, Histels (۴) | Udox, Uadults (۳) |
| Udepts, Udolls (۲) | Udepts , Udolls (۱) |
| کدام کانی از گروه تکتوسیلیکات‌ها نیست؟ | -۶۶ |
| (۱) کوارتز | (۲) ارتوکلاز |
| (۴) پیروکسین | (۳) زئولیت |
| کدام گزینه زیر در رابطه با وضعیت CEC میکاها و ورمیکولیت صحیح است؟ | -۶۷ |
| (۱) CEC میکاها به علت قابل تبادل بودن کاتیون‌های بین لایه‌ای زیاد است. | (۲) CEC ورمیکولیت به علت قابل تبادل بودن کاتیون‌های بین لایه‌ای زیاد است. |
| (۳) CEC ورمیکولیت به علت قابل تبادل نبودن کاتیون‌های بین لایه‌ای کم است. | (۴) ورمیکولیت و میکاها از نظر CEC تفاوتی ندارند. |
| خاکهای آلفی سول دارای شرایط aquic که در آن‌ها یک یا چند افق اشباع از آب وجود داشته باشد در کدام یک از گروههای بزرگ زیر قرار میگیرند؟ | -۶۸ |
| Endoaqualfs (۴) | Glossaqualfs (۳) |
| Epiquaqualfs (۲) | Albaqualfs (۱) |
| جهت نمایش تجمع در جای سزکوئی اکسیدها و تجمع حاصل از آبسوی آن‌ها در افق‌های تحت اراضی از کدام پسوندهای افق خاک استفاده می‌شود؟ | -۶۹ |
| (۱) به ترتیب O و S | (۲) به ترتیب S و O |
| (۳) O به ترتیب هر دو | (۴) S به ترتیب هر دو |

- ۷۰ از نظر شرایط فیزیکی و حاصلخیزی کدام یک از تحت رده‌های زیر شرایط مساعدتری دارد؟
 Uadults (۴) Udolls (۳) Gypsids (۲) Calcids (۱)
- ۷۱ کدام یک از کلاس‌های دمایی خاک در سطح فامیل عامل شناسایی نمی‌باشد?
 Cryic (۴) Frigid (۳) Pergelic (۲) Isohyperthermic (۱)
- ۷۲ کدام یک از مجموعه عناصر سازنده زیر در نامگذاری خاک‌های مناطق حاره‌ای براساس تاکسونومی آمریکایی خاک کاربرد زیادتری دارد?
 Acr و Dystr و Plinth (۲) Hapl و Natr. Camb (۱)
 Arg و Calci و Pale (۴) Calcic و Gyps و Sal (۳)
- ۷۳ در بخش کنترل میزان‌الوزی یک پروفیل میانگین وزنی CEC خاک ۱۴ سانتی‌مول بار بر کیلوگرم و میانگین وزنی رس ۴۲ درصد است. کلاس فعالیت کاتیونی این خاک کدام است?
 superactive (۴) semiactive (۳) subactive (۲) active (۱)
- ۷۴ در یک منطقه به ترتیب با رژیم‌های رطوبتی و حرارتی Ochric Epipedon و Thermic Aridic و میزان ۷° درصد OC در عمق ۱۲۵ cm زیر سطح خاکمعدنی گزارش شده، به نظر شما این خاک در کدام گروه بزرگ قرار می‌گیرد?
 Torrifluvents (۴) Torriwassents (۳) Ustiwassents (۲) Ustifluvents (۱)
- ۷۵ کلاس میزان‌الوزی خاک در سطح فامیل کدام یک از گزینه‌ها به کار نمی‌رود?
 ۱) کوارتزی سامنتها ۲) اندی سول‌ها ۳) خاک‌های شور
- ۷۶ کدام یک از موارد زیر بیانگر دوره‌ی رشد دائم در یک دوره رشد نرمال می‌باشد?
 R < PET (۴) R > PET (۳) $R < \frac{1}{2} PET$ (۲) R = PET (۱)
- ۷۷ در منطقه‌ای از کشور نتیجه ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای گلنگ به صورت S_{cesf} گزارش شده، این نتیجه بیانگر کدام یک از موارد زیر است?
 ۱) کلاس تناسب اراضی با محدودیت اقلیم، خواص فیزیکی و حاصلخیزی خاک
 ۲) زیر کلاس تناسب اراضی با محدودیت اقلیم، خواص فیزیکی و حاصلخیزی خاک
 ۳) کلاس تناسب اراضی با محدودیت خواص فیزیکی، حاصلخیزی و شوری و سدیمی خاک
 ۴) زیر کلاس تناسب اراضی با محدودیت خواص فیزیکی، حاصلخیزی و شوری و سدیمی خاک
- ۷۸ در سطوح مختلف سیستم ارزیابی کیفی تناسب اراضی به روش FAO، کلاس تناسب اراضی بیانگر کدام گزینه زیر است?
 ۱) نوع محدودیت در تناسب اراضی را نشان می‌دهد.
 ۲) درجه تناسب اراضی را نشان می‌دهد که به وسیله اعداد متولی نامگذاری شود.
 ۳) تناسب یا عدم تناسب اراضی برای استفاده مورد نظر را نشان می‌دهد.
 ۴) انواع محدودیت‌ها را در ایجاد واحدهای تناسب نشان می‌دهد.
- ۷۹ در ارزیابی تناسب اراضی برای گیاهان یکساله اگر میزان آهک و گچ از سطح به عمق کاهش پیدا نکند، نحوه محاسبه میزان آن‌ها چگونه خواهد بود?
 ۱) متوسط آن‌ها تا عمق ۲۵ cm از سطح خاک محاسبه می‌شود.
 ۲) متوسط آن‌ها تا عمق ۱۰۰ cm از سطح خاک محاسبه می‌شود.
 ۳) درصد آن‌ها براساس فاکتورهای وزنی تا عمق ۱۵۰ cm محاسبه می‌شود.
 ۴) درصد آن‌ها براساس فاکتورهای وزنی تا عمق ۱۰۰ cm محاسبه می‌شود.

براساس نظر FAO دوره‌ی رشد از نظر رطوبت شامل کدام قسمت‌های زیر است؟

- ۱) قسمت اول با $P > \frac{1}{2}$ PET و قسمت دوم از دسترس خارج شدن ۱۰۰mm از آب ذخیره شده
- ۲) قسمت اول با $P < \frac{1}{2}$ PET و قسمت دوم از دسترس خارج شدن ۱۰۰mm از آب ذخیره شده
- ۳) قسمت اول با $P < \frac{1}{2}$ PET و قسمت دوم از دسترس خارج شدن ۱۲۰mm از آب ذخیره شده
- ۴) قسمت اول با $P > \frac{1}{2}$ PET و قسمت دوم از دسترس خارج شدن ۱۲۰mm از آب ذخیره شده