

کد کنترل

231

E

نام:

نام خانوادگی:

محل امضا:



231E

صبح جمعه
۱۳۹۶/۱۲/۴

دفترچه شماره (۱)



«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.»
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمکن) - سال ۱۳۹۷

رشته بیهودی و مراقبت‌های ویژه دامپزشکی (کد - ۲۷۲۶)

مدت پاسخگویی: ۱۲۰ دقیقه

تعداد سوال: ۹۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی: فارماکولوژی - فیزیولوژی اصول جراحی و بیهودی دامپزشکی - جراحی عمومی دامهای بزرگ و دامهای کوچک	۹۰	۱	۹۰

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره منفی دارد.

حق جاپن، تکنر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تمام اندکس حقوقی و حقوقی ثبت نهاد با مجوز این سازمان مجاز نیاشد و با مخالفین برای معرفت و رفاقت می‌شود.

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی در جلسه این آزمون شرکت می‌نمایم.

امضا:

- ۱- کدام دارو از طریق مهار آنزیم سیکلواکسیژناز انر خود را اعمال نمی‌کند؟
- (۱) متادون (۲) کوتیپروفن (۳) فنیل بوتاون (۴) ملوکسیکام
- ۲- داروهای بیهوشی استنشاقی قاد کدام ویژگی هستند؟
- (۱) فراموشی (Amnesia) (۲) کاهش فشارخون (Hypotension) (۳) شلی عضلانی (Muscle relaxation) (۴) بی‌دردی
- ۳- سرعت القاء بیهوشی با داروهای بیهوشی استنشاقی به کدام عامل بستگی ندارد؟
- (۱) حلالیت داروی بیهوشی در خون (۲) MAC داروی بیهوشی (۳) درجه تبخیرکننده (Vaporizer) (۴) میزان جریان اکسیژن فلومتر (Flowmeter)
- ۴- کدام دارو فعالیت پلاکت‌ها را مهار می‌کند؟
- (۱) زایلوکائین (xylocaine) (۲) زایلازین (xylazine) (۳) کتامین (ketamine) (۴) کوتیپروفون
- ۵- متابولیسم کدام داروی بی‌حسی منجر به تولید پارآمینوبنزوثیک اسید (Para-amino benzoic acid) خواهد شد؟
- (۱) روپی واکائین (۲) بوبیواکائین (۳) پروکائین (۴) لیدوکائین
- ۶- پدیده هیپوکسی انتشاری (diffusion hypoxia) به دنبال مصرف کدام دارو روی می‌دهد؟
- (۱) نیتروس اکسید (۲) هالوتان (۳) کلروفرم (۴) ایزوکلوران
- ۷- کدام مورد در خصوص داروی بیهوشی استنشاقی ایزوکلوران نادرست است؟
- (۱) بازگشت از بی‌هوشی سریع‌تر از هالوتان روی می‌دهد. (۲) سریع‌تر از هالوتان بی‌هوشی را القاء می‌کند. (۳) در دمای اطاق به شکل مایع است. (۴) از هالوتان قوی‌تر است.
- ۸- تزریق خارج عروقی کدام دارو می‌تواند منجر به صدمه بافتی شود؟
- (۱) پروپوفل (Propofol) (۲) تیوپنتال سدیم (Sodium thiopental) (۳) زیلازین (Xylazine) (۴) کتامین (Ketamine)
- ۹- تجویز وریدی کدام دارو می‌تواند منجر به آزادسازی هیستامین شود؟
- (۱) رامیفیدین (Romifidine) (۲) مورفین (Morphine) (۳) پروپوفل (Propofol) (۴) آسپرومازین (Acpromazine)

- ۱۰ کدام مورد در داروی آسپرومازین درست است؟
- کاهش تجمع پلاکت‌ها
 - دارای اثرات بی‌دردی
 - بالا بردن فشارخون
 - افزایش مقاومت عروق سیستمیک
- کدام مورد، مهم‌ترین مزیت میدازولام (Midazolam) نسبت به دیازepam (Diazepam) است؟
- برخلاف دیازepam، نمی‌توان آن را وریدی تزریق کرد.
 - طول اثر آن بیشتر از دیازepam است.
 - این دارو از دیازepam بسیار قوی‌تر است.
 - در تزریق عضلانی به خوبی جذب می‌شود.
- ۱۲ کدام داروی بیهوشی استنشاقی بیشتر توسط بدن متabolیزه می‌شود؟
- دسفلوران
 - سووفلوران
 - هالوتان
 - ایزووفلوران
- کدام مورد درباره داروهای تیوپنتال و پروپوفل نادرست است؟
- هردو دارو باعث تضعیف سیستم تنفسی و کاهش فشارخون می‌شوند.
 - هردو دارو برای ادامه بیهوشی استفاده می‌شوند.
 - هردو دارو باید به روش وریدی تجویز شوند.
 - هردو دارو برای القاء بیهوشی استفاده می‌شوند.
- ۱۴ کدام داروی بیهوشی استنشاقی در دمای اطاق به صورت گاز است؟
- اتر
 - ایزووفلوران
 - هالوتان
 - نیتروس اکسید
- ۱۵ کدام مورد در خصوص داروی ایپی‌نفرین نادرست است؟
- قدرت انقباضی قلب را کاهش می‌دهد.
 - تعداد ضربان قلب را افزایش می‌دهد.
 - باعث انقباض عروق می‌شود.
 - میزان اکسیرین مصرفی قلب را افزایش می‌دهد.
- ۱۶ کدام گونه آتروپین را سریع تر متabolیزه می‌کند؟
- اسپ
 - سگ
 - خرگوش
 - گریه
- ۱۷ کدام داروی بیهوشی از طریق مهار گیرونده‌های آن - متیل - دی - آسپارتات اثر خود را اعمال می‌کند؟
- پروپوفل
 - کتامین
 - هالوتان
 - تیوپنتال
- ۱۸ کدام ویژگی‌ها در مورد یک داروی بیهوشی استنشاقی ایدئال درست است؟
- عدم نیاز به سودالایم MAC بالا
 - حالیت بایین دارو در خون
 - متabolیسم سریع و بالا
 - میلی‌لیتری زایلزین ۲ درصد چند میلی‌گرم دارو وجود دارد؟
- ۱۹ به چه منظوری ممکن است از داروی فنتانیل (Fentanyl) در طی بیهوشی استفاده شود؟
- تأمین بی‌دردی
 - ایجاد شلی عضلانی
 - ادامه بیهوشی
 - جلوگیری از افت فشارخون
- ۲۰ در یک ویال ۳ میلی‌لیتری زایلزین ۲ درصد چند میلی‌گرم دارو وجود دارد؟
- ۳۰۰
 - ۴۰۰
 - ۵۰۰
 - ۶۰۰

- ۲۱ - کدام عبارت نادرست است؟

- (۱) سیستم سمپاتیک از طریق گیرندهای بتا موجب گشادی برونشها می‌شود.
- (۲) افزایش دمای بدن موجب کاهش تعداد تنفس می‌شود.
- (۳) حدود یک سوم حجم جاری را هوای مرده تشکیل می‌دهد.
- (۴) سورفاکتانت توسط پنوموسیت‌های تیپ دو ساخته می‌شود.

- ۲۲ - دلیل کاهش یافتن فشار اکسیژن خون سیاهگ ششی به هنگام ورود به دهلیز چپ قلب کدام است؟

- (۱) میل ترکیبی زیاد دی‌اکسیدکربن با هموگلوبین
- (۲) تمایل زیاد اکسیژن برای جدایی از هموگلوبین
- (۳) مصرف اکسیژن توسط عضله قلبی
- (۴) اختلاط با خون وریدهای برونشی

- ۲۳ - افزایش کدام پارامتر منجر به کاهش بروون ده قلبی (cardiac output) می‌شود؟

(۱) Preload

(۲) Heart rate

(۳) Systemic vascular resistance

(۴) Myocardial contractility

- ۲۴ - مقدار طبیعی فشار وریدی مرکزی (CVP) در سگ و گربه چقدر است؟

- | | | | |
|-------------------------|-----|------------------------|-----|
| ۸-۱۰ cmH ₂ O | (۲) | ۳-۵ cmH ₂ O | (۱) |
| ۸-۱۰ mm Hg | (۴) | ۳-۵ mm Hg | (۳) |

- ۲۵ - برای مقابله با اسیدوز تنفسی کدام مورد توصیه می‌شود؟

- (۱) تجویز بی‌کربنات سدیم
- (۲) تجویز رینگر لاكتات
- (۳) اکسیژن درمانی از طریق ماسک
- (۴) انجام تهویه ریوی با فشار مثبت (IPPV)

- ۲۶ - اگر فشار خون دیاستولیک سگی ۸۰ mmHg و فشار سیستولیک ۱۲۰ mmHg باشد میانگین فشار خون (MAP) بر حسب mmHg چقدر است؟

- | | | | | | | | |
|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|
| ۱۱۰ | (۴) | ۸۳ | (۳) | ۱۰۰ | (۲) | ۹۳ | (۱) |
|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|

- ۲۷ - در سیستم گردش خون پستانداران کدام مورد نادرست است؟

- (۱) دریچه میترال یک دریچه دولختی است.
- (۲) شریان ریوی حاوی خون سیاهگی است.
- (۳) در زمان سیستول دریچه‌های دولختی و سه لختی باز هستند.
- (۴) نارسایی سمت چپ قلب باعث خیز ریوی می‌شود.

- ۲۸ - کدام مورد درباره پرنده‌گان نادرست است؟

- (۱) حجم فضای مرده نای (Tracheal dead space) در مقایسه با پستانداران کم‌تر است.
- (۲) تبادل گازهای تنفسی اکسیژن و دی‌اکسیدکربن در کیسه‌های هوایی (Air sacs) انجام نمی‌شود.
- (۳) تعداد تنفس آن‌ها در مقایسه با پستانداران هم جثه کم‌تر است.
- (۴) طول و قطر نای در مقایسه با پستانداران بیش‌تر است.

- ۲۹- اعصاب پس سیناپسی (post-synaptic) سمپاتیک کدام نروترانسمیتر (neurotransmitter) را آزاد می‌کنند؟
 ۱) نوراپی نفرین ۲) استیل کولین
 ۳) اپی نفرین ۴) گاما‌امینوبوتیریک اسید
- ۳۰- برای درمان کاهش فشارخون کدام مورد توصیه نمی‌شود؟
 ۱) تجویز داروهای Vasoconstrictor
 ۲) تجویز مایعات Fluid therapy
 ۳) تجویز داروهای Chronotropes
 ۴) تجویز داروهای Inotropes
- ۳۱- داروی اپی نفرین از طریق گیرنده‌های:
 ۱) بتا آدرنرژیک باعث انقباض عروق می‌شود.
 ۲) موسکارینی باعث افزایش ضربان قلب را افزایش می‌دهد.
- ۳۲- تعداد طبیعی ضربان قلب و تعداد تنفس در حین بیهوشی در اسب بالغ به ترتیب از راست به چه چند بار در دقیقه است؟
 ۱) (۲۰-۳۰)، (۳-۶) ۲) (۳۰-۴۰)، (۶-۸)
 ۳) (۴۰-۵۰)، (۸-۱۲) ۴) (۶۰-۷۰)، (۱۰-۱۵)
- ۳۳- حداقل قابل قبول میانگین فشار خون شریانی در طی بیهوشی در اسب چند میلی‌متر جیوه است؟
 ۱) ۶۰-۷۰ ۲) ۸۰-۹۰ ۳) ۹۰-۱۰۰ ۴) ۱۰۰-۱۱۰
- ۳۴- کدام مورد از علایم بالینی درد محسوب نمی‌شود؟
 ۱) کاهش اشتها
 ۲) افزایش فشار خون
 ۳) افزایش تعداد ضربان قلب
 ۴) تنگی مردمک چشم
- ۳۵- چرا در صورت افزایش شدید ضربان قلب، میزان برون دهقلبی کاهش می‌یابد؟
 ۱) قدرت انقباضی قلب کاهش می‌یابد.
 ۲) حالت انبساط عروق محیطی روی می‌دهد.
 ۳) میزان پیش‌بار (preload) کاهش می‌یابد.
 ۴) میزان پس‌بار (after load) کاهش می‌یابد.
- ۳۶- در سیستم قلبی عروقی بین برون دهقلبی و کدام یک از پارامترها رابطه معکوس وجود دارد؟
 ۱) حجم خون در گردش
 ۲) پس‌بار after load
 ۳) پیش‌بار preload
- ۳۷- حجم خون یک سگ با وزن ۲۵ کیلوگرم حدوداً چندلیتر است؟
 ۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۵
- ۳۸- کدام مورد در خصوص انتقال اکسیژن درخون نادرست است؟
 ۱) هر مولکول هموگلوبین ظرفیت اتصال با چهار مولکول اکسیژن را دارد.
 ۲) هموگلوبین متصل به اکسیژن دارای رنگ قرمز روشن است.
 ۳) هر گرم هموگلوبین قادر به انتقال ۱/۳۴ سی سی اکسیژن است.
 ۴) بخش عمده اکسیژن از طریق اتصال به پروتئین‌های پلاسمای انتقال می‌یابد.
- ۳۹- در یک حیوان مبتلا به دهیدراسیون کدام مورد افزایش نمی‌یابد؟
 ۱) لاكتات پلاسمایی
 ۲) تولید ادرار
 ۳) کراتینین پلاسمایی
 ۴) CRT
- ۴۰- در کدام مورد حالت آلکالوز متابولیک روی می‌دهد؟
 ۱) کاهش بی‌کربنات خون
 ۲) شوک
 ۳) استفراغ
 ۴) اسهال

- ۴۱- بخیه پارکرکر (Parkerker) از مجموع چند الگوی بخیه تشکیل شده است؟
 ۱) کوشینگ و لمبرت ۲) لمبرت و هالستد ۳) سرتاسری و فقلی ۴) لمبرت و تشکی
- ۴۲- از معاایب حرارت خشک یا آون برای استریل کردن وسایل جراحی کدام است؟
 ۱) ابزارهای تیز را کند می‌کند. ۲) برای مواد روغنی مناسب نیست.
 ۳) در پارچه و کاغذ قدرت نفوذ کمی دارد. ۴) اسپور باکتری‌ها را از بین نمی‌برد.
- ۴۳- خون‌بندي با کمک الکتروکوآکولاسیون برای عروق تا چه قطری مناسب است؟
 ۱) سیاهرگ ۳ میلی‌متر سرخرگ ۲ میلی‌متر ۲) سیاهرگ ۲ میلی‌متر سرخرگ ۱ میلی‌متر
 ۳) سیاهرگ ۴ میلی‌متر سرخرگ ۳ میلی‌متر ۴) سیاهرگ ۴ میلی‌متر سرخرگ ۲ میلی‌متر
- ۴۴- کوتاه‌ترین زمان لازم برای اسکراب دست جراح با محلول‌های آنتی‌سپتیک، با بیشترین میزان تأثیر چند دقیقه است؟
 ۱) ۷ ۲) ۱۵ ۳) ۲ ۴)
- ۴۵- کدام یک از پنس‌های سوزن‌گیر زیر، باید به صورت قلمی (Pencil grip) در دست گرفته شود؟
 Olsen-Hegar (۴) Mathieu (۳) Castroviejo (۲) Mayo-Hegar (۱)
- ۴۶- نخ کات گوت ساده و کات گوت کرومیک از نظر کدام یک از بیزگی‌ها مشابه می‌باشد؟
 ۱) قدرت کششی ۲) میزان واکنش بافتی ۳) طول دوره جذب ۴) امنیت گره
- ۴۷- کدام دسته از آنتی‌بیوتیک‌ها از طریق ایجاد اختلال در سنتز پروتئین‌ها باعث، نابودی باکتری‌ها می‌شوند؟
 ۱) پنی‌سیلین‌ها ۲) سفالوسپورین‌ها ۳) آمینوگلیکوزیدها ۴) فلوروکوئینولون‌ها
- ۴۸- در صورتی که در طول جراحی اسبی به پشت خوابیده باشد (Dorsal Recumbency) در زمان بازگشت از بی‌هوشی باید آن را در چه وضعیتی قرار داد؟
 ۱) روی سمت راست ۲) روی سمت چپ ۳) روی جناغ سینه ۴) خوابیده به پشت
- ۴۹- فضای مناسب در بی‌حسی اپیدورال در اسب کدام فضای بین‌مهره‌ای است؟
 Lumbosacral (۲) Sacrococcygeal (۱)
- ۵۰- نشانه اولیه مسمومیت با داروهای بی‌حسی موضعی بیشتر به چه شکلی بروز می‌کند؟
 ۱) سمیت در سیستم اعصاب مرکزی ۲) تضعیف سیستم تنفسی ۳) مت هموگلوبینی
- ۵۱- کدام نخ در بافت براساس فرایند هیدرولیز آنزیمی از بین می‌روند؟
 Prolene (۲) Catgut (۱)
- ۵۲- تجویز کدام داروی بی‌هوشی در سگ و گربه سبب افزایش فشار داخلی چشم می‌شود؟
 ۱) ایزوفلوران ۲) کاتامین ۳) پروپوفول ۴) سدیم تیوپنتان
- ۵۳- در مورد محدودیت غذایی پیش از جراحی در حیوانات کوچک کدام مورد درست است؟
 ۱) عموماً نیازی به محروم کردن بیمار از آب پیش از جراحی وجود ندارد.
 ۲) در حیوانات بالغ ۶ تا ۱۲ ساعت پرهیز از خوردن آب و غذا باید پیش از جراحی اعمال شود.
 ۳) در حیوانات نابالغ ۱۲ ساعت پرهیز غذایی پیش از عمل جراحی باید اعمال شود.
 ۴) در جراحی‌های روده بزرگ در حیوانات بالغ ۶ تا ۱۲ ساعت پرهیز غذایی پیش از جراحی کافی است.

- ۵۴- در سگ مبتلا به شوک هیپوفلیمیک حداکثر میزان تجویز مایع با «شوک دوز» چقدر است؟
 ۱) 10 mL/kg/hr (۴) ۲) 80 mL/kg/hr (۳) ۳) 5 mL/kg/hr (۲) ۴) 60 mL/kg/hr (۱)
- ۵۵- کدام یک از گزینه‌های زیر بیان کننده خصوصیات نخ پلی‌پروپیلن می‌باشد؟
 ۱) تکرشته‌ای - طبیعی - غیرقابل جذب ۲) سنتتیک - غیرقابل جذب
 ۳) تکرشته‌ای - سنتتیک - قابل جذب ۴) چندرشته‌ای - سنتتیک - قابل جذب
- ۵۶- کدام یک از نخ‌های زیر گزینه مناسب‌تری برای بستن برش گاسترتوومی می‌باشد؟
 ۱) پلی‌گلیکولیک اسید (۲) ابریشم (۳) پلی‌گلاکتین ۹۱۰ (۴) پلی‌دیاکسانون
- ۵۷- در مورد خون‌بندي با استفاده از الکتروکووتر کدام یک از موارد زیر صحیح است؟
 ۱) بهترین وسیله خون‌بندي در خونریزی‌های دیواره روده‌هاست.
 ۲) استفاده از کوتر احتمال بروز عفونت در بافت را کاهش می‌دهد.
 ۳) استفاده از کوتر می‌تواند باعث تسريع روند التیام شود.
 ۴) استفاده از کوتر باعث کاهش طول مدت جراحی می‌شود.
- ۵۸- کدام دارو باعث افزایش دفع ادرار می‌شود؟
 ۱) دتومیدین (۲) کتامین (۳) میدازولام (۴) آسپرومازین
- ۵۹- کدام یک از نخ‌های بخیه برای دوختن بریدگی بر روی لیگامان جانبی مفصل زانو در سگ مناسب است؟
 ۱) Polyglyconate (۲) Polymerized Caprolactum (۳) Polypropylene (۴) Polydioxanone
- ۶۰- تجویز کدام داروي می‌تواند منجر به بروز بی فراری یا تحریک در اسب شود؟
 ۱) دتومیدین (۲) آسپرومازین (۳) مورفین (۴) رامیفیدین
- ۶۱- کدام داروي بیهوشی قابل اشتغال است؟
 ۱) اتر (۲) نیتروس اکسید (۳) هالوتان (۴) ایزوفلوران
- ۶۲- در عملیات احیاء قلبی ریوی (CPR) در یک سگ توسط فرد نسبت ماساز قلبی به تعداد تنفس چگونه است?
 ۱) ۳۰ بار به ۲ بار (۲) ۱۵ بار به ۲ بار (۳) ۲۰ بار به ۲ بار (۴) ۱۰ بار به ۲ بار
- ۶۳- کدام دارو باعث افزایش بروونده قلبی می‌شود؟
 ۱) پروپوفل (۲) تیوپنتال سدیم (۳) هالوتان (۴) کتامین
- ۶۴- از بین رفتن کدام مورد می‌تواند از علایم بیهوشی عمیق محسوب شود؟
 ۱) رفلکس پدال (۲) رفلکس بلع (۳) رفلکس قرنیه (۴) رفلکس پلکی
- ۶۵- کدام داروي بیهوشی دارای اثر بی‌دردی است؟
 ۱) کتامین (۲) پروپوفل (۳) نیوبنتال (۴) ایزوفلوران
- ۶۶- از کدام روش بی‌حسی می‌توان برای انجام جراحی کسلیک (Caslik's) در گاو استفاده کرد؟
 ۱) شبکه اعصاب بازویی (۲) ناحیه‌ای وریدی (۳) پاراورتبرال (۴) اپیدورال خلفی

- ۶۷- در یک گوساله ۵ کیلویی که حدود ۸ درصد دهیدره است، چه مقدار مایع برای جبران کمبود مورد نیاز است؟
- (۱) ۸۰۰ سی سی
 - (۲) ۴۰۰ سی سی
 - (۳) ۴ لیتر
 - (۴) ۴ لیتر
- ۶۸- برای درمان حالت دهیدراسیون در سگ، مایع انتخابی کدام است؟
- (۱) پلاسما
 - (۲) سالین هیپرتونیک
 - (۳) محلول های کریستالوئیدی
 - (۴) محلول های کلوریدی
- ۶۹- کدام دارو ممکن است در اسب باعث پروز Priapism شود؟
- (۱) کاتامین
 - (۲) مدتومیدین
 - (۳) زایلارزین
 - (۴) آسپرومازین
- ۷۰- تجویز کدام دارو سبب ایجاد آرامبخشی، شلی عضلانی و بی دردی می شود؟
- (۱) مدتومیدین
 - (۲) کاتامین
 - (۳) میدازولام
 - (۴) آسپرومازین
- ۷۱- در سگ ماده مبتلا به پیومتر استفاده از آنتی بیوتیک قبل از دریافت پاسخ نمونه برداری کشت و انجام تست آنتی بیوگرام، باید براساس وجود کدام بیک از اجرام دخیل در پیومتر باشد؟
- (۱) اشرشیاکلی
 - (۲) استافیلوکوکوس ارئوس
 - (۳) بروسلakanتیس
 - (۴) پروتئوس
- ۷۲- شایع ترین دلیل انجام عمل برداشت توأم رحم و تخدمانها در سگ و گربه کدام مورد است؟
- (۱) جلوگیری از بروز تومورهای پستانی
 - (۲) جلوگیری از زاد و ولد
 - (۳) جلوگیری از چاقی و رفتارهای ناخوشایند جنسی
 - (۴) درمان بیماری های سیستمیک نظیر صرع
- ۷۳- در عمل برداشت رحم و تخدمان در سگ برای قطع نمودن کدام رباط می توان از قیچی استفاده کرد؟
- (۱) معلقه (Broad lig.) (Suspensory lig.)
 - (۲) پهن (Proper lig.)
 - (۳) بین دو شاخ رحم (Intercorrial lig.)
 - (۴) مخصوص (Proper lig.)
- ۷۴- پارگی مثانه در دام های کوچک معمولاً در کدام قسمت مثانه اتفاق می افتد؟
- (۱) نوک مثانه (Apex)
 - (۲) سطح پشتی مثانه (Dorsal)
 - (۳) گردن مثانه (Neck)
- ۷۵- معمول ترین رهیافت عمل اخته در سگ کدام مورد است؟
- (۱) prescroatal
 - (۲) prepubic
 - (۳) perineal
 - (۴) scrotal
- ۷۶- کدام نخ برای ترمیم پارگی مثانه ارجحیت دارد؟
- (۱) Vicryl
 - (۲) Silk
 - (۳) Prolene
 - (۴) PDS II
- ۷۷- کدام مورد می تواند متعاقب استفراغ های مداوم به جهت استنوز پیلور ایجاد شود؟
- (۱) دهیدراسیون، هایپر کالمی و آنکالوز
 - (۲) دهیدراسیون، هایپو کالمی و آنکالوز
 - (۳) دهیدراسیون، هایپر کالمی و اسیدوز

- ۷۸- کدام مورد درباره زخم‌های جلدی درست است؟

- (۱) استفاده از آنتی‌بیوتیک به صورت عمومی کمکی به درمان زخم‌های آلوده نمی‌کند.
- (۲) تجویز کورتون در درمان زخم‌های عفونی به روند التیام کمک می‌کند.
- (۳) زخم‌های ناشی از گاز گرفتگی را تا ۶ ساعت پس از ایجاد، می‌تواند بخیه کرد.
- (۴) زخم‌هایی که بیش از ۱۲ ساعت از ایجادشان گذشته را نباید بخیه کرد.

- ۷۹- تحت چه شرایطی امکان بروز «عدم کنترل در ادرار نمودن» در سگ ماده افزایش می‌باید؟

- (۱) عقیم‌سازی بین شش ماهگی تا یک‌سالگی
- (۲) عقیم‌سازی در کمتر از سه ماهگی
- (۳) عقیم‌سازی بعد از اولین زایمان موفق
- (۴) عقیم‌سازی بعد از اولین مرحله استرسوس

- ۸۰- بهترین زمان انجام عمل عقیم‌سازی سگ ماده برای جلوگیری از بروز تومورهای پستانی چه زمانی است؟

- (۱) بعد از اولین فحلی
- (۲) قبل از اولین فحلی
- (۳) قبل از دومین فحلی

- ۸۱- در یک گوساله ۴ ماهه مبتلا به فتق نافی (hernia sac) (umbilical hernia) معمولاً کدام عضو در کیسه فتقی (hernia sac) (umbilical hernia) معمولاً کدام عضو در کیسه فتقی

قرار دارد؟

- | | |
|--------------|--------------|
| Ileum (۲) | Rumen (۱) |
| Abomasum (۴) | Duodenum (۳) |

- ۸۲- جراحی رومینوتومی (rumenotomy) از نظر سطح آلوگی جزء کدام دسته است؟

- | | |
|-----------|------------------------|
| Clean (۲) | Coutaminated (۱) |
| Dirty (۴) | Clean-Coutaminated (۳) |

- ۸۳- مهمترین عارضه درازمدت پس از جراحی روده کوچک در دام‌های بزرگ کدام مورد است؟

- | |
|--------------------------------|
| (۱) نشت محتویات روده (Leakage) |
| (۲) تنگی مجرأ (Stricture) |
| (۳) کیسه‌ای شدن (Diverticulum) |
| (۴) باز شدن شکاف (Dehiscence) |

- ۸۴- در گاو شیری بالغ حالت تلسکوبی شدن روده‌ها (intussusception) بیشتر در کدام قسمت روی می‌دهد؟

- | | |
|----------------------|---------------------|
| Duodenum (۲) | Jejuno ileum (۱) |
| Proximal jejunum (۴) | Ascending colon (۳) |

- ۸۵- معمول‌ترین محل انسداد مری در اثر بلع مواد غذایی مانند شلغم یا چغندر در گاو در کدام قسمت مری می‌باشد؟

- | |
|-------------------------------|
| (۱) محل ورود مری به قفسه صدری |
| (۲) ناحیه سینه‌ای مری |
| (۳) ابتدای مری |
| (۴) ناحیه شکمی مری |

- ۸۶- فلجي اندام خلفی ناشی از زایمان در گاو به دلیل صدمه به کدام عصب اتفاق می‌افتد؟

- | | |
|---------------|------------------|
| Peroneal (۲) | Sciatic (۱) |
| Obturator (۴) | Cauda equina (۳) |

- ۸۷- معمول‌ترین اختلال پاتولوژیک سکوم اسب کدام مورد است؟

- | | |
|-------------------|----------------------|
| Cecal ulcer (۲) | Cecal impaction (۱) |
| Cecal rupture (۴) | Cecal prforation (۳) |

- ۸۸- در جراحی سزارین گاو کدام الگوی بخیه برای دوختن رحم توصیه می‌شود؟

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| Inverting interrupted (۲) | Everting continuos (۱) |
| Inverting continous (۴) | Everting intrrrupted (۳) |

- ۸۹ در روش اخته بسته در اسب، کدام لایه برش داده نمی‌شود؟
- ۱) دارتوس
۲) تونیکا آلبازینا و دارتوس
۳) تونیکا واژینالیس
۴) پوست
- ۹۰ عفونت مزمن طناب بیضه (**Spermatic cord**) بعد از جراحی اخته در نریان را اصطلاحاً چه می‌نامند؟
- Champignon (۲)
Stump retention (۴)
Scirrhous cord (۱)
Paraphimosis (۳)

سپاهان

سپاهان