

283

F

نام :

نام خانوادگی :

محل امضاء :



صبح جمعه  
۹۲/۱۲/۱۶  
دفترچه شماره (۱)



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
سازمان سنجش آموزش کشور

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.  
امام خمینی (ره)

## آزمون ورودی دوره‌های دکتری (نیمه مرکز) داخل سال ۱۳۹۳

### مجموعه علوم خاک (کد ۴۴۲۱) – فیزیک و حفاظت خاک

مدت پاسخگویی: ۱۲۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۸۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی (شیمی و حاصلخیزی خاک، فیزیک و حفاظت خاک، ردهبندی و ارزیابی خاک – روابط آب و خاک و گیاه تکمیلی، فیزیک خاک تکمیلی، فرسایش و حفاظت خاک تکمیلی)	۸۰	۱	۸۰

استندهای سال ۱۳۹۲

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد.

-۱

عناصر فعال در واکنش جداسازی آب در فرآیند فتوسنتز کدام هستند؟

- (۱) منگنز و کلر      (۲) پتاسیم و منگنز      (۳) مولیبدن و منگنز      (۴) منیزیم و کلر

-۲

جذب عنصر از طریق جربان توده‌ای با کدام عامل رابطه معکوس دارد و کاهش می‌یابد؟

- (۱) آب قابل استفاده گیاه در خاک      (۲) سرعت بالای باد و رطوبت نسبی پایین

-۳

(۳) نور خورشید با شدت بالا و آب کافی      (۴) هوای سرد و ابری و رطوبت کافی

-۴

اگر گیاهی رنگ پریده یا رشد آن کند باشد ولی در آزمایش تجزیه گیاه مقادیر K,P,N را بالا نشان دهد، این مستعله بیانگر چیست؟

- (۱) برهم کنش عناصر با یکدیگر      (۲) حضور کافی عناصر غذایی

-۵

(۳) حضور ناکافی عناصر غذایی      (۴) وجود عامل محدود کننده دیگر رشد

كمبود کدام عنصر موجب افزایش میزان ازت محلول در سلول‌های گیاهی می‌گردد؟

-۶

- (۱) پتاسیم و فسفر      (۲) پتاسیم و گوگرد      (۳) قسفر و گوگرد      (۴) پتاسیم و سدیم

-۷

در کمبود خفیف عنصر غذایی در اندام هوایی گیاه آیا نشانه ظاهری و کاهش عملکرد دیده می‌شود؟

- (۱) تنها نشانه ظاهری قابل رویت است.

-۸

(۲) نشانه ظاهری و کاهش عملکرد اتفاق می‌افتد.

- (۳) تنها کاهش عملکرد به میزان کم (حدود ۱۰ درصد) اتفاق می‌افتد.

-۹

(۴) نشانه ظاهری مشاهده می‌شود ولی کاهش عملکرد دیده نمی‌شود.

-۱۰

با توجه به داده‌های زیر نقش حرکت توده‌ای و تماس ریشه‌ای به ترتیب در رساندن کلسیم ( $Ca^{+2}$ ) به سطح ریشه برای

جذب چند کیلوگرم در یک هکتار است؟ (غلظت کلسیم در محلول خاک ۶۰۰۰ میلی‌گرم در لیتر، میزان کلسیم تبادلی ۶۰۰۰ کیلوگرم در هکتار، میزان آب جذب شده ۲/۵ میلیون لیتر در هکتار و با فرض اینکه ۱ درصد حجم خاک را ریشه فعال

تشکیل می‌دهد)

-۱۱

- (۱) ۱۰۰-۱۰۰

-۱۲

- (۲) ۶۰-۱۵۰

-۱۳

- (۳) ۶۰۰-۱۵۰۰

-۱۴

(۴) با توجه به داده‌های موجود، محاسبه نقش حرکت توده‌ای و تماس ریشه‌ای مقدور نیست.

-۱۵

غلظت نیتروژن-نیتراتی در خاکی ۵ (پنج) میلی‌گرم در کیلوگرم خاک است. چند کیلوگرم کوداوه (N=۱۴) باید به یک

هکتار خاک به عمق ۳۰ سانتی‌متر (وزن خاک چهار میلیون کیلوگرم) اضافه کنیم تا غلظت نیتروژن-نیتراتی به ۲۰

-۱۶

میلی‌گرم در کیلوگرم خاک برسد؟ (با فرض اینکه هیچگونه هدر روی نیتروژن صورت نگرفته باشد).

(عدد جرمی: O=۱۶ و N=۱۴)

-۱۷

- (۱) ۱۳۰/۴      (۲) ۲۶۰/۸      (۳) ۲۸۸/۸      (۴) ۵۷۷/۵

-۱۸

در محلولی غلظت‌های کلسیم، منیزیم و کلراید به ترتیب ۱۵۰، ۱۰۰ و ۲۵۰ میلی‌اکی‌والان در لیتر است. اگر این محلول

فاقد سایر نمک‌ها باشد، قدرت یونی محلول چند مول در لیتر است؟

-۱۹

- (۱) ۱/۱۲۵      (۲) ۰/۳۷۵      (۳) ۰/۶۲۵      (۴) ۱/۱۲۵

-۲۰

به ۵ گرم از یک خاک سدیمی ۱۰۰ میلی‌لیتر محلول اشباع گچ اضافه شده و بعد از تکان دادن و سانتریفیوژ کردن غلظت

-۲۱

کلسیم در محلول تعادلی ۱۰ میلی‌اکی‌والان در لیتر اندازه‌گیری می‌شود. گچ مورد نیاز برای اصلاح کامل این خاک چند

-۲۲

میلی‌اکی‌والان بر صد گرم خاک است؟ ( $meq l^{-1}$  = غلظت کلسیم در محلول اشباع گچ)

-۲۳

- (۱) ۱۰      (۲) ۲۰      (۳) ۳۰      (۴) ۴۰

-۲۴

در معادله همدماهی جذب لانگمویر اگر  $KC$  باشد، آنگاه همدما از نوع ..... است.

-۲۵

- (۱) خطی      (۲) سیگموئیدی      (۳) فروند لیچ      (۴) BET

- ۱۱ اگر فشار جزئی گاز  $\text{CO}_2$  در هوا  $\text{atm} = 0.1, 10^{-3/5}$  باشد،  $\text{PH}$  آب باران چقدر است؟
- ( $K_H = 10^{-6/35}$  ،  $K_{a1} = 10^{-1/5}$   $\text{Matm}^{-1}$ )
- (۱) ۵/۳۵      (۲) ۵/۴۵      (۳) ۵/۵۵      (۴) ۵/۶۵
- ۱۲ مقاومت به هوا دیدگی در کانی‌ها یا گروه کانی‌های مشخص شده به چه ترتیب است؟
- اولیوین > فلد سپارهای پتاسیم‌دار > بیوتایت > کوارتز
  - اولیوین > آجایت > فلد سپارهای پتاسیم‌دار > بیوتایت > کوارتز
  - اولیوین > آجایت > بیوتایت > فلد سپارهای پتاسیم‌دار > کوارتز
  - اولیدین > بیوتایت > آجایت > فلد سپارهای پتاسیم‌دار > کوارتز
- ۱۳ در دو نمونه A و B از یک خاک، ESP مساوی و برابر با ۴۲ درصد می‌باشد. ولی بقیه ظرفیت تبادلی در نمونه A با یون‌های کلسیم و منیزیم و در نمونه B با یون آمونیم اشغال شده است. حال اگر به یک گرم از هر یک از دو نمونه  $50^{\circ}\text{C}$  از محلول کلریدلیتیوم اضافه و خوب به هم بزنیم، مقدار سدیم جایگزین شده چه وضعیتی دارد؟
- در نمونه A بیشتر خواهد بود.
  - در نمونه B بیشتر خواهد بود.
  - در هر دو نمونه یکسان خواهد بود.
  - در غلظت‌های کم کلریدلیتیوم در نمونه B و در غلظت‌های زیاد در نمونه A بیشتر خواهد بود.
- ۱۴ فرمول نیم واحد سلولی یک کانی رس به صورت  $[\text{Al}_{0.6}\text{Mg}_{2.4}\text{Si}_{2.6}\text{Al}_{1.4}\text{O}_{10}(\text{OH})_2]$  می‌باشد. این کانی رس متعلق به کدام گروه از کانی‌ها است؟
- (۱) سرپنتین‌ها      (۲) میکاها      (۳) اسماکتیت‌ها      (۴) ورمی‌کولیت‌ها
- ۱۵ اگر نقطه H در پروفیل خاک بعد از توقف بارندگی پتانسیل فشاری برابر با  $+30$  سانتی‌متر داشته باشد و پس از گذشت دو هفت‌تۀ پتانسیل ماتریک آن به  $-20$  سانتی‌متر برسد، در طول این دو هفت‌تۀ سطح ایستایی چند سانتی‌متر پایین رفته است؟
- (۱) ۱۰      (۲) ۲۰      (۳) ۳۰      (۴) ۵۰
- ۱۶ آبیاری و زهکشی خاک باعث می‌شود که:
- دماي خاک سطحی در تابستان افزایش يافته و در زمستان کاهش داشته باشد.
  - دماي خاک سطحی در تابستان کاهش يافته و در زمستان افزایش داشته باشد.
  - دماي خاک سطحی در هر دو فصل افزایش داشته باشد.
  - دماي خاک سطحی در هر دو فصل کاهش داشته باشد.
- ۱۷ علت انحراف سطح آب در لوله مویین کدام است؟
- تفوق نیروی ادھیژن بر کوهیژن
  - اختلاف فشار بیرون و درون لوله
  - چسبناک بودن جداره لوله مویین
  - برای ارزیابی امکان سله بندی خاک کدام یک از خصوصیات ملاک بهتری است؟
- (۱) بافت خاک      (۲) پایانی خاک      (۳) پایداری ساختمان خاک      (۴) سطح ویژه ذرات خاک
- ۱۸ در حرکت آب در خاک:
- شدت جریان واقعی و دارسی برابرند.
  - شدت جریان دارسی کمتر از شدت جریان واقعی است.
  - شدت جریان دارسی بیشتر از شدت جریان واقعی است.
  - بسته به بافت خاک، شدت جریان واقعی و دارسی متفاوتند.

- ۲۰ مقدار عددی عامل P در معادله جهانی فرسایش خاک در کشت بر روی خطوط تراز، و کشت نواری در بهترین حالتها نسبت به مقدار P در کرت استاندارد به ترتیب معادل ..... و ..... می باشد.
- (۱) نصف - یک چهارم
  - (۲) یک چهارم - نصف
  - (۳) نصف - نصف
- ۲۱ در روش عدد منحنی رواناب (CN)، چنانچه ظرفیت نگهداشت خاک صفر باشد، ضریب رواناب بارندگی چقدر خواهد بود؟
- (۱) صفر
  - (۲)  $45^\circ$
  - (۳)  $45^\circ$
- ۲۲ اگر در یک دامنه به طول شیب  $100^\circ$  متر، گاو آهنی به عمق شخم  $20^\circ$  سانتی متر خاک را در طول سال  $10^\circ$  سانتی متر جابجا کرده باشد، با فرض اینکه چگالی خاک  $1.5$  گرم بر سانتی متر مکعب باشد، فرسایش مکانیکی (شخم شیار) چند تن در هكتار است؟
- (۱)  $1/5$
  - (۲)  $2$
  - (۳)  $6$
- ۲۳ اولین گام (مرحله) از یک برنامه ملی حفاظت خاک کدام است؟
- (۱) مدیریت صحیح اراضی (اصلاح کاربری)
  - (۲) کنترل رسوب با سازه های مکانیکی
  - (۳) مدیریت خاک
  - (۴) کنترل رسوب با سازه های مکانیکی به همراه استقرار پوشش گیاهی
- ۲۴ بر اساس روابط زیر چنانچه بارندگی فرضی با شدت  $10^\circ$  میلی متر و به مدت نیم ساعت رخ دهد، انرژی جنبشی و  $EI_3$  این بارندگی به ترتیب چقدر خواهد بود؟
- $$\left[ \begin{array}{l} e_m \rightarrow (MJ.ha^{-1}.mm^{-1}) \\ I \rightarrow (mm.h^{-1}) \end{array} \right]$$
- $$\left\{ \begin{array}{l} e_m = 0/119 + 0/0873 \log_{10}(I) \quad I \leq 76 \frac{mm}{h} \\ e_m = 0/283 \quad I > 76 \frac{mm}{h} \end{array} \right.$$
- ۲۵ کدام یک از گزینه های ذیل حد بحرانی عدد فرود (F) در خصوص تلاطم جریان می باشد؟
- (۱)  $14/15$  مگاژول بر هكتار و  $1415^\circ$  مگاژول - میلی متر بر هكتار - ساعت
  - (۲)  $14/15$  مگاژول بر هكتار و  $707/5$  مگاژول - میلی متر بر هكتار - ساعت
  - (۳)  $283^\circ$  مگاژول بر هكتار - میلی متر و  $14/15$  مگاژول - میلی متر بر هكتار - میلی متر - ساعت
  - (۴)  $283^\circ$  مگاژول بر هكتار - میلی متر و  $3/28$  مگاژول - میلی متر بر هكتار - میلی متر - ساعت
- ۲۶ مقدار تخلخل تهويه ای خاک و کافی بودن تهويه در کدام یک از سطوح رطوبتی زیر ارزیابی می شود؟
- (۱) در رطوبت بین pwp - FC
  - (۲) در رطوبت معادل مکش بین  $-33$  تا  $-10^\circ$  کيلو پاسکال
  - (۳) در رطوبت معادل مکش های بزرگتر از  $33^\circ$  کيلو پاسکال
  - (۴) در دامنه رطوبتی معادل مکش ورود هوا تا  $33^\circ$  کيلو پاسکال

- ۲۷ D<sub>۳۰</sub> و D<sub>۴۰</sub> خاکی به ترتیب ۰٪ و ۵٪ میلی‌متر می‌باشد. این خاک چند درصد شن دارد؟
- (۱) ۳۰ (۲) ۴۰ (۳) ۶۰ (۴)
- ۲۸ خاکی با افق‌های (Bt(۳۵-۷۵cm), AB(۲۰-۳۵cm), A(۰-۲۰ cm) با بیش از یک درصد کربن آلی در همه افق‌ها و جوشش با اسید رقیق و تغییر جزئی رس، بیانگر کدامیک از موارد زیر است؟
- (۱) حضور افق مالیک به ضخامت ۲۰ سانتی متر بدون افق آرجیلیک  
 (۲) حضور افق مالیک به ضخامت ۷۵ سانتی متر بدون افق آرجیلیک واضح  
 (۳) حضور افق مالیک به ضخامت ۲۰ سانتی متر و افق آرجیلیک با ضخامت ۴۰ سانتی متر  
 (۴) حضور افق مالیک به ضخامت ۷۵ سانتی متر و افق آرجیلیک به ضخامت ۴۰ سانتی متر
- ۲۹ در یک منطقه خاک معدنی افق‌های O<sub>i</sub>, E, Bhs, C<sub>x</sub> بررسی گردیده است. در این خاک، افق شناسایی اصلی کدامیک از موارد زیر می‌باشد؟
- |             |            |              |           |
|-------------|------------|--------------|-----------|
| Duripan (۴) | Spodic (۳) | Fragipan (۲) | Albic (۱) |
|-------------|------------|--------------|-----------|
- ۳۰ در مورد مرز بین رژیم زریک و یوستیک کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟
- (۱) مدت زمان تجمعی خشکی خاک بعد از انقلاب تابستانه در رژیم رطوبتی یوستیک کمتر از زریک است.  
 (۲) مدت زمان تجمعی خشکی خاک بعد از انقلاب تابستانه در رژیم رطوبتی زریک کمتر از یوستیک است.  
 (۳) مدت زمان متوالی خشکی خاک بعد از انقلاب تابستانه در رژیم رطوبتی زریک کمتر از یوستیک است.  
 (۴) مدت زمان متوالی خشکی خاک بعد از انقلاب تابستانه در رژیم رطوبتی یوستیک کمتر از زریک است.
- ۳۱ فرآیندهای Cryoturbation و Lessivage به ترتیب در کدام گروه از خاک‌های زیر اتفاق می‌افتد؟
- |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Cryalfs و Turbels (۲) | Turbels و Cryalfs (۱) |
| Xerepts و Cryalfs (۴) | Cryalfs و Xerepts (۳) |
- ۳۲ در یک منطقه خاکی با افق‌های Lma و O<sub>e</sub> و O<sub>a</sub> بررسی شده، در این خاک کدامیک از گزینه‌های زیر می‌تواند صادق باشد؟
- |                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Humification and Mineral soil (۲)  | Humification and organic soil (۱)  |
| Pedoturbation and Mineral soil (۴) | Pedoturbation and organic soil (۳) |
- ۳۳ تشکیل کدامیک از کانی‌های ثانویه زیر معرف خاک‌های مربوط به خشک‌ترین اقلیم‌ها می‌باشد؟
- (۱) گوتایت و گیسبایت (۲) هماتایت و بوهمایت (۳) کربنات ثانویه و گچ ثانویه (۴) سودا، میرابلیت، ناکولیت
- ۳۴ در یک منطقه از کشور خاکی تحت عنوان Inceptisol گزارش گردیده است، کدام گروه از افق‌های زیر در داخل ۱۱۰cm سطح خاک معدنی می‌توانند تشکیل شوند؟
- |                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Calcic , Gypsic , Sombritic (۲) | Calcic , Gypsic , Fragipan (۱) |
| Calcic , Placic , Sombritic (۴) | Calcic , Gypsic , Placic (۳)   |
- ۳۵ در یک منطقه خاکی با افق‌های C و Byy و A بررسی شده، در این خاک افق Byy بیانگر کدام مورد زیر است؟
- (۱) افق تحت الارضی با بیش از ۵۰٪ حجمی گچ اولیه (۲) افق تحت الارضی با بیش از ۵۰٪ حجمی گچ ثانویه  
 (۳) افق تحت الارضی با بیش از ۵۰٪ وزنی گچ اولیه و ثانویه (۴) افق تحت الارضی با بیش از ۵۰٪ حجمی گچ اولیه و ثانویه
- ۳۶ در ارزیابی اراضی فاریاب بوسیله سیستم پارامتریک، ایجاد تراس در مناطقی با شیب ۲-۳٪ باعث کدامیک از موارد زیر می‌باشد؟
- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| (۱) تأثیری در درجه اراضی نمی‌گذارد.                 | (۲) باعث کاهش درجه اراضی می‌شود.   |
| (۴) عدم تأثیر تا شیب ۱٪ و افزایش درجه اراضی می‌شود. | (۳) باعث افزایش درجه اراضی می‌شود. |

-۳۷

- در ارزیابی اراضی فاریاب بوسیله سیستم پارامتریک، کدامیک از موارد زیر صحیح است؟
- (۱) اراضی با ۴۰٪ ژپسیم دارای درجه بالایی هستند.
  - (۲) اراضی با ۵۰٪ کربنات کلسیم و ژپسیم دارای درجه یکسان هستند.
  - (۳) اراضی با ۴۰٪ کربنات کلسیم دارای درجه بالایی هستند.
  - (۴) اراضی با ۵۰٪ کربنات کلسیم و ژپسیم به ترتیب دارای درجه پایین و بالا هستند.

-۳۸

در **Land capability system** با حرکت از کلاس I به طرف کلاس VIII کدامیک از موارد زیر حاکم می‌شود؟

- (۱) افزایش خطرات و محدودیتها و کاهش شدت استفاده زراعی
- (۲) افزایش خطرات و محدودیتها و شدت استفاده زراعی
- (۳) کاهش خطرات و محدودیتها و شدت استفاده زراعی
- (۴) کاهش خطرات و محدودیتها و افزایش شدت استفاده زراعی

-۳۹

ارزیابی اراضی در منطقه‌ای که به ترتیب مرتفع ترین نقطه آن ۱۳۷۲ و پست ترین نقطه آن ۱۳۱۲ متر از سطح دریای آزاد می‌باشد صورت گرفته، اگر فاصله این دو نقطه در روی نقشه با مقیاس ۱:۱۰۰۰ ۶۰۰۰ سانتی‌متر باشد، درصد شیب منطقه چقدر است؟

- (۱) یک صدم درصد
- (۲) یک دهم درصد
- (۳) یک درصد
- (۴) ده درصد

-۴۰

در ارزیابی اراضی فاریاب دارای  $EC = \frac{dS}{m}$  بوسیله سیستم پارامتریک کدام گزینه در رابطه با مقدار ESP صحیح است؟

- (۱) درجه اراضی با افزایش ESP در کلاس بافتی ریز افزایش می‌یابد.
- (۲) درجه اراضی با افزایش ESP در کلاس بافتی ریز کاهش می‌یابد.
- (۳) درجه اراضی با کاهش ESP در کلاس بافتی ریز کاهش می‌یابد.
- (۴) درجه اراضی با افزایش ESP در کلاس بافتی ریز تغییر می‌یابد.

-۴۱

واژه انعطاف‌پذیر فنتیپیکی «phenotypic Plasticity» به چه معنومی است؟

- (۱) سازگاری ذاتی گیاهان با محیط
- (۲) انطباق گیاهان پس از مواجهه با یک استرس
- (۳) بازگشت‌پذیری ذاتی گیاهان پس از مواجهه با یک استرس
- (۴) پلاسمادسماوات چیست؟

-۴۲

(۱) غشاهای دیوارهای سلولی

(۲) غشاء‌های دیوارهای پروتوپلاست

(۳) کanal‌هایی که بین دیوارهای سلولی قرار دارند.

(۴) کanal‌های میکروسکوپی که از طریق دیوارهای سلولی قرار دارند.

نقش مدیریت زراعی در افزایش کارآیی مصرف آب عمده‌تاً از کدام طریق است؟

- (۱) کاهش تعرق
- (۲) کنترل علف‌های هرز
- (۳) تغییر مسیوفوتونتری
- (۴) کاهش برگ - آب

-۴۳

کدام مورد درباره جذب فعال آب به وسیله گیاه صحیح است؟

$$(1) \text{ جذب فعال آب از قانون } Q = -\frac{\Delta \Psi}{R} \text{ تعیین می‌کند.}$$

(۲) جذب فعال در واقع همان جذب ناشی از کشش تعرقی است.

(۳) جذب فعال تنها در شرایط کمبود آب در گیاه می‌تواند اتفاق بیافتد.

(۴) از نظر مصرف غیر مستقیم انرژی متابولیکی جذب فعال توجیه‌پذیر است.

-۴۴

در رابطه  $\Psi^* + \frac{RT}{V_w} \ln e / e_s = \Psi$  مقدار  $\Psi$  دربرگیرنده کدام اجزا است؟

$$\Psi_m + \Psi_s \quad (2)$$

$$\Psi_s + \Psi_m + \Psi_p + \Psi_z \quad (4)$$

$$\Psi_s + \Psi_m + \Psi_p \quad (3)$$

$$\Psi_s \quad (1)$$

-۴۶

در مورد جذب آب توسط گیاه در طول شب و ضرورت آن کدام صحیح است؟

(۱) جذب آب در طول شب اتفاق می‌افتد و در رشد مستمر گیاه واقعاً ضرورت دارد.

(۲) جذب آب در طول شب اتفاق می‌افتد و برای کارساز بودن کشش تعزی در روز بعدی ضرورت دارد.

(۳) جذب آب در طول شب عملاً صفر بوده و ضرورتی برای آن وجود ندارد چون فتوستنتزی در کار نیست.

(۴) جذب آب در طول شب در رشد گیاه نقش ندارد ولی اتفاق می‌افتد و مقدار آن تقریباً در حدود ۲۰٪ کل جذب شبانه‌روزی است.

-۴۷

در اندازه‌گیری  $\psi$  بافت‌های گیاهی (مثل برگ) به روش‌های زیر، در کدام روش اثر رقیق شدن (Dilution effect) وجود ندارد؟

(۲) روش رطوبت سنج ترمومکاپل

(۱) روش محفظه فشار

(۴) روش کاهش در دمای انجماد (سايكروسكوپي)

(۳) روش EC سنجی عصاره بافت

کدام یک از روش‌های زیر برای تعیین پتانسیل اسمزی محلول‌های طبیعی (عصاره خاک و گیاه) استفاده نمی‌شود؟

(۲) روش اندازه‌گیری رسانایی الکتریکی

(۱) روش رطوبت سنج دما جفت

(۴) روش کاهش نقطه انجماد

(۳) فرمول وانت هو夫

-۴۸

بافتی با پتانسیل اسمزی  $bar = 1$  در تعادل با محلولی با پتانسیل اسمزی  $-3bar$  می‌باشد، پتانسیل فشاری و DPD این بافت به ترتیب کدام است؟

$-3bar$ ,  $-2bar$  (۴)

$-2bar$ ,  $-7bar$  (۳)

$-3bar$ ,  $-3bar$  (۲)

$-3bar$ ,  $-7bar$  (۱)

-۴۹

اگر حداقل تخلیه مجاز برابر  $70\%$  و FC و PWP خاک به ترتیب برابر  $30$  و  $15$  درصد حجمی باشد. مقدار آب سهل‌الوصول در یک متر عمق این خاک چند میلی‌متر است؟

$150$  (۴)

$105$  (۳)

$10/5$  (۲)

$15$  (۱)

-۵۰

زاله (شبیم) Gutlation چیست؟

(۱) آبی که بیشتر صحیح‌ها روی سطح برگ می‌نشینند.

(۲) آبی که از طریق میان بخار آب روی برگ می‌نشینند.

(۳) آبی که بر اساس فشار بخار اتمسفر روی برگ می‌نشینند.

(۴) آبی که به صورت قطره از آوند چوبی با فشار خارج و در سطح برگ می‌نشینند.

بازده مصرف آب به طور کلی یعنی: (WUE)

(۱) کاهش مصرف آب برای افزایش بهره‌وری

(۲) افزایش تولید بیومس برای افزایش بهره‌وری

(۳) نسبت خروج به ورود آب در سیستم خاک، گیاه و اتمسفر

(۴) افزایش بازده مصرف و تأمین آب به صورتی که از دست رفتن آب به حداقل برسد.

تنش (استرس) به چه معناست؟

-۵۲

(۱) مواجهه گیاهان با کمبود و یا زیاد بود یکی از عوامل رشد

(۲) مواجهه گیاهان با زیاد بودن یکی از عوامل رشد

(۳) مواجهه گیاهان با کمبود یکی از عوامل رشد

-۵۳

فشار بخار آبی  $22/5$  میلی‌بار است. در صورتی که فشار بخار اشباع  $24$  میلی‌بار باشد، پتانسیل این آب در دمای  $25$  درجه سانتی‌گراد کدام است؟ (ثابت گازها =  $8/314$  ژول بر مول درجه کلوین)

(۱)  $-28/9bar$  (۲)  $-52bar$  (۳)  $-28/9$  ژول بر مول

-۵۴

اگر به خاکی که سرعت حرکت آب در آن  $80\%$  سانتی‌متر بر ثانیه است و عامل تأخیر (Retardation Factor) پتانسیم در خاک برابر  $2$  باشد، کود کلرید‌پتانسیم اضافه کرده باشیم، سرعت حرکت پتانسیم در خاک چند سانتی‌متر بر ثانیه است؟

(۲)  $0/04$

(۴)  $0/16$

(۱)  $0/04$

(۳)  $0/4$

-۵۵

-۵۶

کدام گزینه نشان دهنده مراحل مختلف تشکیل ساختمان خاک به ترتیب اولویت است؟

- ۱) دومین، کلاستر، خاکدانه ریز، خاکدانه درشت
- ۲) کلاستر، دومین، خاکدانه ریز، خاکدانه درشت
- ۳) خاکدانه ریز، خاکدانه درشت، کلاستر، دومین
- ۴) خاکدانه ریز، خاکدانه درشت، دومین، کلاستر

-۵۷

مکش ورود هوا (AEV) در کدام یک از خاک های زیر بیشتر است؟

- ۱) خاک شنی
- ۲) خاک لوم
- ۳) خاک رسی
- ۴) خاک رسی متراکم


-۵۸

یک لایه رسی با ضخامت خیلی کم  $z$  و هدایت هیدرولیکی اشباع  $100 \text{ cm}^2/\text{sec}$  سانتی متر در روز در میان ستون شنی به ارتفاع  $100 \text{ cm}$  سانتی متر و هدایت هیدرولیکی اشباع  $100 \text{ cm}^2/\text{sec}$  سانتی متر در روز قرار گرفته است و هدایت هیدرولیکی مؤثر  $5 \text{ cm}^2/\text{sec}$  سانتی متر در روز حاصل شده است. میزان  $y$  بر حسب سانتی متر چقدر است؟

- ۱)  $1/1$
- ۲)  $2/1$
- ۳)  $3/8$
- ۴)  $4/3$

-۵۹

اگر هیستوگرام توزیع اندازه ای منافذ خاک به صورت زیر داده شده باشد، ظرفیت نگهداری آب خاک چگونه است؟



- ۱) بالا
- ۲) متوسط
- ۳) ضعیف
- ۴) بسیار ضعیف

-۶۰

دانستن ضریب اعوجاج در حرکت ..... خاک کاربود دارد.

- ۱) هوا و گرمای
- ۲) عناصر، هوا و گرمای
- ۳) آب، هوا، عناصر و گرمای
- ۴) هوا

-۶۱

سطح ویژه ذرهای کره ای شکل با دانسیته برابر  $1/5 \text{ g/cm}^3$  بر سانتی متر مکعب و شعاع  $2 \text{ cm}$  سانتی متر، چند سانتی متر مربع بر گرم است؟

- ۱)  $250$
- ۲)  $500$
- ۳)  $1000$
- ۴)  $2000$

-۶۲

در مورد ضریب پخشیدگی آب در خاک (Diffusivity) کدام عبارت صحیح است؟

- ۱) واژه ای قراردادی است.
- ۲) اختلاف غلظت آب بین دو نقطه از خاک
- ۳) چنین واژه ای در فیزیک خاک نیست.
- ۴) اختلاف غلظت آب در حالت اشباع و غیر اشباع

-۶۳

سرعت تبادل کاتیون ها بین محلول خاک و لایه دوگانه پخشیدگی به صورت آنی نمی باشد. این فرآیند بستگی به کدام عامل (عوامل) دارد؟

- ۱) نوع رس خاک
- ۲) درجه پایداری خاکدانه های خاک
- ۳) شماره پکلت (Peclet Number) خاک
- ۴) همه موارد

-۶۴

با استفاده از معادله پوازی، سرعت متوسط جريان خطی آب در لوله ای به طول  $5 \text{ m}$  و قطر  $1 \text{ cm}$  با اختلاف فشار  $200 \text{ Pa}$  کال چند متر مکعب بر ثانیه است؟ (ضریب ویسکاپیتیه برابر با یک هزارم پاسکال - ثانیه فرض شود)

- ۱) تقریباً نیم
- ۲) تقریباً یک
- ۳) تقریباً دو
- ۴) تقریباً سه

- ۶۵ ضریب پخشیدگی گرمایی در خاک عبارت است از:
- (۱) نسبت هدایت گرمایی به حجم خاک
  - (۲) نسبت ظرفیت گرمایی به حجم خاک
  - (۳) نسبت هدایت گرمایی به ظرفیت گرمایی
  - (۴) نسبت چمله در مورد منحنی انقباض خاک صحیح نیست؟
- ۶۶ کدام جمله در مورد منحنی انقباض خاک صحیح نیست؟
- (۱) بیشتر کاهش حجم خاک در ناحیه انقباض نرمال رخ می‌دهد.
  - (۲) در رس‌های خالص منحنی انقباض از دو ناحیه انقباض نرمال و پس‌مانده تشکیل شده است.
  - (۳) در خاک‌های ساختمان‌دار، منحنی انقباض سه ناحیه‌ای (ساختمانی، نرمال، و پس‌مانده) است.
  - (۴) در خاک‌های با ساختمان توده‌ای، منحنی انقباض از سه ناحیه انقباض ساختمانی، نرمال و پس‌مانده تشکیل شده است.
- ۶۷ شعاع لوله کاپیلاری در صورتی که ارتفاع آب در آن  $20\text{ cm}$  باشد، چند میلی‌متر است؟ (زاویه تماس را صفر فرض نمایید)
- (۱) ۰/۵
  - (۲) ۱
  - (۳) ۲
  - (۴) ۳
- ۶۸ اگر مقطع جریان به شکل نیمه دایره‌ای به شعاع  $20\text{ cm}$  باشد، شعاع هیدرولیکی جریان چند متر است؟
- (۱) ۰/۱
  - (۲) ۰/۲
  - (۳) ۱
  - (۴) ۲
- ۶۹ خطر لغزش زمین با کدام یک از پارامترهای زیر رابطه مستقیم دارد؟
- (۱) زاویه اصطکاک داخلی
  - (۲) ضریب چسبندگی موثر خاک
  - (۳) مقاومت برشی خاک در سطح لغزش
  - (۴) فشار آب حاصله در سطح لغزش
- ۷۰ حداکثر غلظت سزیم مرجع در خاک در چه نقاطی از کره زمین قابل مشاهده است؟
- (۱) نیمکره جنوبی، مرطوب، عرض جغرافیایی خیلی بالا
  - (۲) نیمکره شمالی، خشک، عرض جغرافیایی خیلی بالا
  - (۳) نیمکره جنوبی، مرطوب، عرض جغرافیایی متوسط
  - (۴) نیمکره شمالی، مرطوب، عرض جغرافیایی پایین
- ۷۱ مقدار ارتفاع زبری ( $Z$ ) بیشتر تابع کدام یک از فاکتورهای ذیل است؟
- (۱) نوع گیاه
  - (۲) ارتفاع گیاه
  - (۳) پوشش لاشبرگ
  - (۴) دانه‌بندی ذرات خاک
- ۷۲ خاک‌هایی با حداقل نفوذپذیری و بیشترین پتانسیل تولید رواناب در چه گروه هیدرولوژیکی قرار می‌گیرند؟
- (۱) A
  - (۲) B
  - (۳) C
  - (۴) D
- ۷۳ در طراحی یک آبراهه اگر دبی حداکثر  $2\text{ l/s}$  برابر و سرعت مجاز نیز  $2\text{ m/s}$  باشد، سطح مقطع آبراهه باید چند برابر در نظر گرفته شود؟
- (۱) ۱
  - (۲) ۲
  - (۳) ۳
  - (۴) ۴
- ۷۴ در طراحی یک آبراهه از دسته منحنی‌های شدت - مدت - دوره بازگشت بارندگی چه استفاده‌ای می‌شود؟
- (۱) تعیین مدت بارندگی
  - (۲) تعیین مقدار بارندگی
  - (۳) تعیین بیشترین شدت بارندگی
  - (۴) تعیین دوره بازگشت بارندگی
- ۷۵ سرعت آب در کanal، با کاهش محیط خیس شده ..... و با کاهش زبری ..... می‌یابد.
- (۱) کاهش - کاهش
  - (۲) افزایش - افزایش
  - (۳) افزایش - کاهش
  - (۴) کاهش - افزایش
- ۷۶ اگر بادی با سرعت  $100\text{ km/h}$  در ساعت به صورت عمود بر یک بادشکن نیمه تراوا با ارتفاع  $5\text{ m}$  بوزد، سرعت باد در فالله‌های  $20^{\circ}$  و  $100\text{ km/h}$  در پشت بادشکن حدود چند کیلومتر در ساعت خواهد بود؟
- (۱)  $120\text{ km/h}$
  - (۲)  $20\text{ km/h}$
  - (۳)  $40\text{ km/h}$
  - (۴)  $80\text{ km/h}$
- ۷۷ در قسمت‌های مختلف یک شب، معمولاً بیشترین فرسایش در ..... و بیشترین رسوب‌گذاری در ..... صورت می‌گیرد.
- (۱) پای شب - گردش شب
  - (۲) پنجه شب - پای شب
  - (۳) گردش شب - پنجه شب
  - (۴) گردش شب - شانه شب

- ۷۸- در حوضه‌ای به مساحت ۱۰ هکتار، بارانی به مدت ۱۰ ساعت با شدت ثابت ۲۱ میلیمتر در ساعت در تمام سطح حوضه باریده که دبی اوج هیدروگراف سیل آن ۴۲ متر مکعب در ثانیه می‌باشد. حجم رواناب کل این باران چند متر مکعب است؟
- (۱) ۱۵۱۱۱۶ ° ۱۵۱۱۱۶ ° ۱۵۱۱۱۱/۶ ۳ ۱۸۳۴۵۸ ۴
- ۷۹- برش هیدرولیکی رواناب،تابع کدام یک از فاکتورهای ذیل نیست؟
- (۱) عمق جریان ۴) شعاع هیدرولیکی (۲) بافت خاک ۳) شب کانال
- ۸۰- اگر مکانیزم تولید باران مصنوعی به روش سقوط آزاد باشد، ارتفاع لازم برای حصول سرعت نهایی قطره چند متر باید باشد؟
- (۱) ۵ ۲) ۸ ۳) ۹ ۴) ۱۲