

نام :

نام خانوادگی :

محل امضاء :



صبح جمعه
۹۲/۱۲/۱۶
دفترچه شماره (۱)



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.
امام خمینی (ره)

آزمون ورودی دوره‌های دکتری (نیمه متاخر) داخل سال ۱۳۹۳

مجموعه علوم صنایع غذایی (کد ۲۴۱۳) – میکروبیولوژی مواد غذایی

مدت پاسخگویی: ۱۲۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۸۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی (میکروبیولوژی مواد غذایی، شیمی مواد غذایی، شیمی مواد غذایی، اصول مهندسی صنایع غذایی، تکنولوژی مواد غذایی - فرایند مواد غذایی تكمیلی، میکروبیولوژی مواد غذایی تكمیلی، میکروبیولوژی صنعتی، بیولوژی ملکولی میکرووارگانیزما)	۸۰	۱	۸۰

استبدمه سال ۱۳۹۲

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد.

- | | |
|----|---|
| ۱ | کدام یک از موارد زیر در خصوص اختلاف بین سلول‌های پروکاریوتیک و یوکاریوتیک صحیح است؟ |
| ۲ | (۱) زیر واحد rRNA ۱۶S تنها مربوط به پروکاریوت‌ها است.
(۲) پروکاریوت‌ها دارای دستگاه گلزاری بزرگی هستند. |
| ۳ | (۳) ریبوزوم در سلول‌های یوکاریوت 70°S اما در پروکاریوت‌ها 80°S است.
(۴) یوکاریوت‌ها نیز مانند پروکاریوت‌ها در ساختار سلولی خود پیتیدوگلیکان دارند. |
| ۴ | پرگندهای مشکوک استافیلوکوس اورنوس وقتی در محیط کشت شوند و فعالیت داشته باشند، سمی تلقی می‌گردند. |
| ۵ | (۱) MacConkey - کاتالاز
(۲) Baird - Parker |
| ۶ | مهتمترین عامل بروز فساد bacterial soft rot در سبزی‌ها کدام مورد زیر است؟
<i>Lactobacillus Lactis</i> (۲)
<i>Pectobacterium cavatovorum</i> (۴) |
| ۷ | (۱) <i>Bacillus Cereus</i>
(۲) <i>Clostridium butyricum</i> |
| ۸ | کدام گزینه، عبارت زیر را براساس فاکتورهای نمونه‌برداری به درستی نشان می‌دهد؟
اگر از بین ۷ نمونه از یک ماده غذایی حداکثر ۲ نمونه حاوی حداکثر 3×10^3 باکتری باشد این غذا اینم خواهد بود.) |
| ۹ | (۱) $m = 3 \times 10^3$, $c = 7$, $n = 2$ (۲)
(۲) $m = 7$, $c = 2$, $n = 3 \times 10^3$ (۳)
(۳) $m = 2$, $c = 7$, $n = 3 \times 10^3$ (۴) |
| ۱۰ | روش LAL (Limulus Ameobacyt lysate) برای شناسایی میکروارگانیزم‌های باکتری‌های به کار می‌رود.
(۱) گرم مثبت دارای آگزوتوکسین
(۲) گرم منفی دارای اندوتوکسین
(۳) گرم منفی و گرم مثبت عفونت‌های غذایی |
| ۱۱ | کدام یک از باکتری‌های زیر عامل فساد سولفیدی در مواد غذایی دارای pH بالاتر از ۴/۶ می‌باشد؟
<i>Bacillus subtilis</i> (۲)
<i>Bacillus coagulans</i> (۱)
<i>Clostridium bifermentans</i> (۴)
<i>Clostridium botulinum</i> (۳) |
| ۱۲ | در نگهداری مواد غذایی با استفاده از اشعه، اصطلاح Radappertization معادل کدام مورد زیر است؟
(۱) پاستوریزاسیون
(۲) استریلیزاسیون تجاری
(۳) کاهش بار میکروبی
(۴) استریلیزاسیون |
| ۱۳ | در یک سیستم کلوبیدی همگن‌سازی که موجب شکسته شدن ذرات پروتئین می‌شود، ذرات به چه شکلی درمی‌آیند و قدرت امولسیون کنندگی پروتئین‌ها چگونه تغییر می‌کند؟
(۱) مسیل - افزایش
(۲) سطح ذرات افزایش می‌یابد - افزایش
(۳) واکنش دیلز - آlder (Diels-Alder) در ایجاد کدام واکنش نامطلوب روغن‌ها نقش دارد؟
(۴) تندی بیوشیمیایی |
| ۱۴ | (۱) برگشت طعم
(۲) فوتواسیداسیون
(۳) پلیمریزاسیون حرارتی
(۴) ترکیب ژل که در اثر حرارت مجدداً به سول تبدیل نمی‌شود، با کدام گزینه در ارتباط است؟
(۱) پراکنده غذایی
(۲) پیپتیزاسیون
(۳) کلونید حفاظت شده
(۴) کوآگولاسیون (انعقاد) |
| ۱۵ | کدام گزینه از خواص فیزیکی امولسیون‌ها محسوب می‌شود؟
(۱) پایداری - رنگ
(۲) نیروی برش - گرانولوی
(۳) پایداری - توازن آبدوستی و چربی دوستی (HLB)
(۴) ضریب شکست نور - توازن آبدوستی و چربی دوستی (HLB)
پروتئین از مواد است که تحت تأثیر گرانولوی آنها می‌یابد. |
| ۱۶ | (۱) شبه پلاستیک - نیروی برش - افزایش
(۲) پلاستیک - هیدرولیز - افزایش
(۳) شبه پلاستیک - نیروی برش - کاهش |
| ۱۷ | در طراحی کدام یک از خطوط تولید زیر نیازی به در نظر گرفتن دیگ بخار آب نمی‌باشد؟
(۱) خط تولید شیر پاستوریزه
(۲) خط تولید بیسکویت
(۳) خط تولید تن ماهی |
| ۱۸ | کدام یک از موارد زیر از اهداف طراحی کارخانه نیست?
(۱) کاهش هزینه استفاده از کارگر
(۲) پیشگیری از موانع و حوادث در حین تولید
(۳) کدام گزینه نادرست است؟ |
| ۱۹ | (۱) دیگ بخار لوله آتش (fire-tube) برای تولید بخار با حجم زیاد مناسب است.
(۲) تله بخار شناور به ثابت نگه داشتن نسبت بخار و کندانس در سیستم کمک می‌کند.
(۳) به دلیل فشار بالا در دیگ بخار برای ورود آب تقدیم به آن از پمپ ساتریفیوژ چند طبقه استفاده می‌شود.
(۴) فرایند زیر آب زدن دیگ بخار (blow down) برای زیاد نشدن غلظت آب داخل دیگ ضروری است. |

- ۱۶ بخار اشباع 15°C در لوله استیل به قطر $1/6\text{ in}$ در جریان است. اگر سرعت متوسط بخار $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ باشد، دبی جرمی آن را حساب کنید؟ (بر حسب $\frac{\text{kg}}{\text{s}}$) (حجم ویژه بخار برابر 4°C می باشد)
- ۱) $0/03$ ۲) $0/3$ ۳) $3/3$ ۴) $3/0$
- ۱۷ ویسکوزیته سینماتیک آب بر حسب $\frac{\text{kg}}{\text{s}}$ در دمای 20°C چقدر است؟ (دانسیته آب را 1000 kg/m^3 و ضریب هدایت حرارتی آن را $6 \text{ W/m}^{\circ}\text{C}$ در نظر بگیرید)
- ۱) 1×10^{-4} ۲) 2×10^{-6} ۳) 2×10^{-4} ۴) $1/4 \times 10^{-7}$
- ۱۸ تست قلیایی بهینه (Optimal) جهت تعیین استفاده می شود.
- ۱) pH مناسب اشباع I ۲) مقدار دقیق CO_2 مصرفی در اشباع I
۳) مقدار دقیق CO_2 مصرفی در اشباع II ۴) میزان مناسب شیر آهک در آهک فور I
در مدت تصفیه، واکنش های شیمیایی تبدیلی یا تخریبی در کدام مرحله رخ می دهد؟
- ۱) اشباع یک ۲) اشباع دو ۳) شوالز ۴) پرشولاژ
- ۱۹ کدام یک از انواع دیفوژیون زیر از نوع عمودی همراه با دیگ حرارتی هستند؟
- ۱) R.T ۲) D.D.S ۳) Desmeth ۴) B.M.A
- ۲۰ در فرمول مربوط به پلاریمتری و فعالیت نوری ساکاروز، فاکتور C نشان دهنده چیست؟
- ۱) درجه حرارت محلول مورد آزمایش بر حسب سانتی گراد
۲) غلظت ماده فعال نوری (ساکاروز) بر حسب گرم در 100 گرم محلول
۳) غلظت ماده فعال نوری (ساکاروز) بر حسب گرم در 100 سانتی متر مکعب محلول
۴) زاویه چرخش یا میزان انحراف نور پلاریزه توسط محلول مورد آزمایش بر حسب درجه در صورتی که آسیب نشاسته بیش از حد باشد، چه تغییری در رنگ بافت نان دیده خواهد شد؟
- ۱) اصولاً شدت آسیب نشاسته تأثیری بر رنگ ندارد.
۲) رنگ در مقایسه با حالت مناسب، قهوه ای تر خواهد بود.
۳) رنگ بافت نان بیش از حد روشن است.
۴) رنگ بافت نان حاصل از آرد با آسیب زیاد نشاسته روشن تر از نمونه با آسیب کم نشاسته است.
- ۲۱ با کدام یک از دستگاهها، حتی با داشتن چند میلی گرم آرد گندم، ویژگی های ژلاتینه شدن نشاسته آن را می توان بررسی کرد؟
- ۱) آمیلوگراف ۲) میکرو ویسکو آمیلوگراف
۳) ویسکو آنالایزر سریع (RVA) ۴) گرماسنچ روبشی افتراقی (DSC)
درجه نرم شدن خمیر با کدام یک از مشخصه های ذیل (حاصل از فارینو گرام) نسبت مستقیم دارد؟
- ۱) Dough Development Time ۲) Mixing Tolerance Index ۳) Dough Stability ۴) Arrival Time
- ۲۲ وجود پروتئین پیوروایندولین (puroindolin) در یک عامل مهم در نرمی بافت گندمهای نرم به شمار می رود.
- ۱) لایه تستا ۲) سلول های لایه آلورون ۳) دیواره سلول های اندوسپریم
- ۲۳ در روش عمومی (General Method) برای محاسبه زمان استریلیزاسیون، پس از مشخص کردن فاکتور Unit Sterility
- جهت تعیین زمان لازم برای استریلیزاسیون غذا، این فاکتور باید در چه فاکتور دیگری ضرب شود؟
- ۱) Fo value ۲) Thermal Death Time در دمای اتوکلاو
۳) D value مربوط به مقاوم ترین میکرو اگانیسم در غذا ۴) Z value اگر تغییرات دمای اتوکلاو و تغییرات دمای Cold Point قوطی کنسرو را ضمن فرآیند حرارتی بررسی کنیم، زمان استریلیزاسیون
۱) از شروع گرم کردن و بالا رفتن دمای اتوکلاو شروع شده و تا انتهای مرحله سرد کردن ادامه می یابد.
۲) از رسیدن دمای اتوکلاو به حد اکثر دمای تنظیم شده شروع شده و در زمان شروع عملیات سرد کردن، خاتمه می یابد.
۳) از رسیدن دمای مرکز حرارتی قوطی به حد اکثر دمای تنظیم شده شروع شده و در زمان شروع عملیات سرد کردن، خاتمه می یابد.
۴) از رسیدن دمای اتوکلاو و مرکز حرارتی قوطی به حد اکثر دمای تنظیم شده شروع شده و در زمان شروع سرد کردن هر دو، خاتمه می یابد.

-۲۸

جهت تهیه سرکه صنعتی در مرحله تبدیل الكل به اسید استیک از باکتری هایی که قابلیت اکسیداسیون شدید (Overoxydunts) دارند از جمله استفاده می شود.

(۱) *Acetobacter acidophylum*(۲) *Gluconobacter oxydans*(۳) *Acetobacter pasteurianus* و *Acetobacter peroxydans*(۴) *Acetobacter xylinum* و *Acetobacter aceti*

-۲۹

کلروفیلاز آنزیمی است که دمای بهینه فعالیت آن نسبتاً بالا بوده (حدود ۷۰ درجه سانتی گراد) و کلروفیل را تبدیل می کند.

(۱) به کلروفیلین

(۲) به ویتامین A

(۳) به فتوفیتین (فاقد منیزیم)

-۳۰

(۴) ابتدا به متیل کلروفیلاید (فاقد فیتول) و سپس فتوفوربید (فاقد فیتول و منیزیم) در انجماد مواد غذایی، نقطه یوتکتیک (Eutectic point) دمایی است که در آن:

(۱) مقداری آب غیر منجمد در سیستم وجود دارد.

(۲) کریستال های یخ درشت تری تشکیل می گردد.

(۳) کریستال های یخ ریز تری تشکیل می گردد.

-۳۱

(۴) یک ماده خاص که منجمد گردیده با لیکور اطراف خود به حالت تعادل درمی آید، در این دما ماده منجمد شده نه ذوب می شود و نه افزایش حجم می دهد.

کدام گزینه در مورد قوطی آلومینیومی صحیح است؟

(۱) مشکل لکه سولفیدی ندارد.

(۲) به طور کلی قوطی سه تکه است.

(۳) مواد غذایی بسته بندی شده را توسط مایکروویو می توان گرم کرد.

(۴) به دلیل لایه اکسید آلومینیوم نیاز به لاک اندود شدن ندارد.

-۳۲

این ویژگی ها مربوط به کدام روغن است؟

(از نظر ترکیب وضع غیرعادی دارد زیرا تنها دارای سه اسید چرب عمدۀ پالمیتیک، استاراریک و اولئیک است آن هم به اندازه های تقریباً مساوی و در منحنی ذوب آن در ناحیه ۳۶°C-۳۲°C شیب تندی مشاهده می شود.)

(۱) روغن کره (۲) روغن نارگیل (۳) کره کاکائو (۴) روغن نخل

فرایند مشروط کردن در کدام روش استخراج روغن و بین کدام مراحل انجام می شود؟

-۳۳

(۱) در روش پرس و بین پرکی کردن و پخت

(۲) در روش پرس و بین پخت و پرس کردن

(۳) در روش حلal و بین خرد کردن و پرکی کردن

(۴) افزودن اسید سیتریک به روغن بوبры شده در چه دمایی صورت می گیرد؟

-۳۴

(۱) ۱۶۰°C (۲) ۱۴۳°C (۳) ۳۰-۳۵°C (۴) ۲۰-۲۵°C

اتصال ناخالصی ها به نقطه های فعال خاک رنگبر با چه نیرویی صورت می گیرد؟

-۳۵

(۱) پل هیدروزئی (۲) وان دروالسی (۳) یونی (۴) کووالانسی

کدام یک از پنیر های زیر را می توان بلا فاصله پس از تولید در سردخانه زیر صفر نگهداری کرد؟

-۳۶

(۱) Camembert (۲) Cheddar (۳) Mozzarella (۴) Gouda

نقش کدام یک از عوامل زیر در رسیدن پنیر کمتر می باشد؟

-۳۷

(۱) کیموزین باقیمانده در پنیر

(۲) آنزیم های طبیعی شیر

(۳) فلور ثانوی

گاما کازئین حاصل از تجزیه بوده و بیشتر است.

-۳۸

(۱) بتا کازئین - آب دوست

(۲) کاپا کازئین بوده - آب دوست

(۳) کاپا کازئین بوده - آبگریز

چرا در تولید شیر خشک به روش خشک کردن پاششی (Spray drying)، درجه حرارت شیر در شروع تغییظ، زیاد افزایش نمی یابد؟

-۳۹

(۱) تبخیر از قطرات شیر و نزدیک بودن دمای آن به دمای ترمومتر مرتبط

(۲) جریان هوا موجب جلوگیری از گرم شدن قطرات شیر می شود.

(۳) چون قطرات شیر در مرحله خشک شدن نزولی هستند.

(۴) اصولاً دما با سرعتی ثابت افزایش می یابد.

فاکتور رسیدن پنیر چیست؟

-۴۰

(۱) نسبت ازت محلول به ازت کل

(۲) نسبت کلسیم یونی به کلسیم کل

(۳) نسبت اسید لاكتیک به لاکتوز کل

-۴۱

یک ماده غذایی به مدت ۱۰ ساعت در محیطی با رطوبت نسبی ۴۰ درصد و دمای ۲۰ درجه سانتی گراد نگهداری شده و تغییری در وزن آن به وجود نیامد، فعالیت آبی آن به طور تقریب چقدر است؟

(۱) ۰/۲ (۲) ۰/۴ (۳) ۰/۶ (۴) ۰/۸

-۴۲

هوای ۲۵ درجه سانتی گراد با رطوبت نسبی ۴۰ درصد را تا دمای ۹۰ درجه گرم کرده به داخل خشک کن می فرستیم، دمای هوای خروجی از خشک کن ۵ درجه است. خصوصیات هوای ورودی و خروجی از خشک کن به ترتیب و نسبت به مرحله قبلی چگونه تغییر کرده است؟

(۱) آنتالپی افزایش، رطوبت مطلق کاهش و دانسیته افزایش - رطوبت نسبی کاهش، حجم ویژه افزایش و نقطه شبنم کاهش یافته است.

(۲) رطوبت مطلق تغییر نکرده، آنتالپی کاهش و نقطه شبنم افزایش - رطوبت نسبی افزایش و دانسیته و آنتالپی کاهش یافته است.

(۳) آنتالپی افزایش، رطوبت نسبی کاهش و دانسیته کاهش - رطوبت مطلق افزایش، حجم ویژه کاهش و نقطه شبنم افزایش یافته است.

(۴) رطوبت مطلق تغییر نکرده، آنتالپی کاهش و رطوبت نسبی افزایش - رطوبت مطلق و نقطه شبنم و حجم ویژه افزایش یافته است.

-۴۳

یک خشک کن غلتکی از نوع Single – drum drier دارای قطر ۷/۰ متر و طول ۸۵/۰ متر است و در دمای ۱۵۰°C

محلول ژلاتینی ۲۰ درصد ماده جامد را خشک می کند تیغه جدا کننده ژلاتین پس از چرخش $\frac{3}{4}$ دور از روی آن جدا می شود. اگر ضخامت ژلاتین خشک شده $6/0$ میلی متر و دانسیته آن $10\text{--}20 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ باشد، مقدار وزن ژلاتین روی غلتک

چقدر است؟

(۱) ۱۸۶۰ گرم (۲) ۶۸۰ کیلوگرم (۳) ۶/۸ کیلوگرم (۴) ۸/۶ کیلوگرم

-۴۴

در روش اندازه گیری ضربی هدایت حرارت توسط line heat source probe اسامی اندازه گیری بر پایه کدام یک از موارد زیر است؟

(۱) سرعت افزایش دمای پروب نسبت به محیط اطراف نمونه

(۲) سرعت افزایش دما بین line heat source و نقطه اتصال دو سیم ترموموکوپل

(۳) سرعت انتقال حرارت از پروب به نقاط دیگر نمونه، بعد از خاموش شدن heater

(۴) سرعت کاهش دمای پروب نسبت به نقطه اتصال دو سیم ترموموکوپل

-۴۵

اگر شرایط سیستم اتو کلاو مورد استفاده برای فرآیند حرارتی به گونه ای باشد که نقطه سرد قوطی کنسرو به ترتیب دماهای زیر را در زمان های تعیین شده طی کرده باشد و شرایط حرارتی اتو کلاو ثابت بماند چه تغییری باید در مراحل اتو کلاو کردن بچه های مختلف ایجاد کنیم که بتوانیم Fvalue متفاوت (کمتر و بیشتر) برای قوطی های هم اندازه و هم شکل و یک نوع غذا ایجاد کنیم؟ (۹۰ درجه ۵ دقیقه، ۱۰۰ درجه ۶ دقیقه، ۱۱۰ درجه ۷ دقیقه، ۱۲۰ درجه ۵ دقیقه)

(۱) دمای بعد از رسیدن به دمای ماکزیمم را تغییر دهیم.

(۲) زمان های قبل از رسیدن به دمای ماکزیمم را کنترل کنیم.

(۳) زمان اتو کلاو در دمای ۱۲۰ درجه را افزایش دهیم.

(۴) مرحله شروع سرد کردن قوطی را کنترل کنیم.

-۴۶

چرا مدت زمان فراوری مواد غذایی با فشار بالا به اندازه قطعات و یا بسته های غذایی بستگی ندارد؟

(۱) زیرا حجم بسته ها به طور متوازن کاهش پیدا می کند.

(۲) زیرا گرمای ناشی از فشار به سرعت و به مقدار زیاد ایجاد می شود.

(۳) زیرا ملکول های دو قطبی در تمامی ماده غذایی پخش هستند.

(۴) زیرا فشار به صورت ایزوستاتیک و تقریباً آنی در سرتاسر غذا منتقل می شود.

کدام گزینه در مورد منحنی خشک شدن مواد غذایی صحیح است؟

(۱) در مرحله سرعت نزولی خشک شدن (Falling rate) دمای ماده غذایی به دمای حباب خشک نزدیک می شود.

(۲) رطوبت تعادلی میزان رطوبتی است که پس از آن خشک شدن با سرعت کمتری ادامه پیدا می کند.

(۳) هنگامی که رطوبت ماده غذایی به رطوبت بحرانی رسید با ادامه فرآیند، خشک شدن متوقف می شود.

(۴) در مرحله سرعت ثابت خشک شدن (Constant- rate) دمای سطح ماده غذایی تغییر می کند.

کدام گزینه در مورد خشک کن های انجمادی نادرست است؟

(۱) یکی از مزایای خشک کن های انجمادی، سرعت بالای خشک شدن مواد غذایی است.

(۲) معمولاً از یک المتن حرارتی جهت تأمین گرمای نهان تصعید استفاده می شود.

(۳) سیستم تحت خلاء زیاد کار می کند.

(۴) ماده غذایی خشک شده بافتی متخلخل دارد.

-۴۷

-۴۸

-۴۹

کدام گزینه در پیش‌بینی زمان یک فرایند حرارتی مواد غذایی کمتر اهمیت دارد؟

۱) خواص حرارتی ماده غذایی

۲) خواص فیزیکی ماده غذایی

۳) خواص شیمیایی محصول غذایی

۴) ویسکوزیته محیطی که ماده غذایی در داخل آن فراوری می‌شود.

-۵۰

اگر دمای حرارت دادن 111°C و $Z\text{value}$ برای مقاومت‌ترین میکرووارگانیزم برابر 10°C باشد، چند دقیقه حرارت دادن در این شرایط برابر $2/5$ دقیقه استاندارد می‌شود؟

۵۰) ۴

۲۵) ۳

۱۲/۵) ۲

۷/۵) ۱

-۵۱

از مهمترین باکتری‌های عامل فساد در ماهی که تولید H_2S را احیا می‌نماید کدام جنس زیر را می‌توان نام برد؟

Pseudomonas (۴)

Acinetobacter (۳)

Shewanella (۲)

Moraxella (۱)

-۵۲

کدام یک از پاتوژن‌های زیر از طریق میوه و سبزیجات به انسان منتقل نمی‌شود؟

Vibrio cholera (۲)

E. Coli (۱)

Streptococcus agalactiae (۴)

Cl. botulinum (۳)

-۵۳

کدام یک از گزینه‌های ذیل در مورد روش امپدانس صحیح است؟

۱) با رشد میکروبی هدایت الکتریکی کاهش می‌یابد.

۲) با رشد میکروبی در محیط، امپدانس کاهش می‌یابد.

۳) با رشد میکروبی مقاومت در برابر جریان الکتریکی افزایش می‌یابد.

۴) هدایت الکتریکی و امپدانس رابطه مستقیم با رشد میکروبی دارند.

کدام یک از انواع *E. coli* نقش مهمی در بیماری اسهال مسافرتی دارد؟

EHEC (۴)

ETEC (۳)

EIEC (۲)

EPEC (۱)

-۵۴

در یک فرآیند حرارتی در دمای 121°C در مدت زمان 20 دقیقه $99/999$ درصد از تعداد میکرووارگانیسم مورد نظر کاهش می‌یابد. اگر دمای فرآیند به 131°C افزایش یابد و Z ارگانیسم مورد نظر 5°C باشد، برای کاهش تعداد آن از 10^5 عدد به

4° عدد چه مدت زمان (دقیقه) حرارت دهی در این دمای جدید مورد نیاز است؟

۰/۰۲) ۴

۰/۰۴) ۳

۰/۰۳۶) ۲

۰/۰۲) ۱

-۵۵

در حال حاضر بررسی سریع حضور میکروارگانیسم‌ها در مواد غذایی بر چه پایه‌ای استوار است؟

۱) ایمونولوژیکی

۲) اندازه‌گیری مقدار ATP

۳) استفاده از مواد رادیو اکتیو

متداولترین روش ژنتیک مولکولی برای تشخیص و شناسایی باکتری‌ها و ویروس‌ها در مواد غذایی کدام مورد زیر می‌باشد؟

fluorescent antibody (۲)

ELISA (۱)

-۵۶

Polymerase chain Reaction (PCR) (۴)

Radio immunoassay (۳)

-۵۷

توصیه می‌شود که عسل به اطفال خورانده نشود. کدام مورد زیر از عوامل این توصیه نمی‌باشد؟

۱) نداشتن اینمنی کافی اطفال

۲) حساسیت اطفال به عسل‌ها

۳) وجود *Cl. botulinum* در عسل‌ها

-۵۸

۴) نبود ارگانیسم‌های رقیب با میکروب‌های بیماری‌زا در دستگاه گوارش اطفال

کدام یک از گزینه‌های زیر نادرست می‌باشد؟

-۵۹

۱) تولید مقدار کافی هیستامین توسط باکتری‌ها در ماهی که باعث مسمومیت در مصرف کننده گردد سبب می‌شود که ماهی از نظر ظاهر و حسی هم قابل قبول نباشد.

۲) Prions پروتئین‌های خاصی هستند که می‌توانند با ایجاد تغییر شکل در پروتئین‌های دیگر، آنها را به پروتئین‌های مخرب تبدیل کنند.

۳) Noroviruses بدون پوشش(unenveloped) و دارای SS RNA می‌باشند.

۴) Rotaviruses بدون پوشش بوده ولی حاوی ds RNA می‌باشند.

فساد ترش گوجه‌فرنگی توسط کدام میکروارگانیسم‌های زیر ایجاد می‌شود؟

Aspergillus niger (۲)

Alcaligenes viscolactis (۱)

-۶۰

Penicillium digitatum (۴)

Geotrichum candidum (۳)

-۶۱

کدام یک از جنس‌های میکروارگانیسم‌های زیر قادر به تجزیه سلولز می‌باشد؟

Pseudomonas (۴)

Trichoderma (۳)

candida (۲)

Torula (۱)

میزان پروتئین و اسید نوکلئیک در پروتئین تک یاخته (Single cell protein) حاصل از کدام میکروارگانیسم بیشترین است؟ <p>(۱) جلبکها لزج شدن کلم شور تخمیری (ساورکراوت) به علت رشد کدامیک از میکروارگانیسم های زیر است؟ Lactobacillus plantarum Lactobacillus cucumberis (۲) باکتریها مخمرها لزج شدن کلم شور تخمیری (ساورکراوت) به علت رشد کدامیک از میکروارگانیسم های زیر است؟ Lactococcus brevis Leuconostoc mesenteroides (۳) کدامیک از موارد زیر جزء مسیرهای تبدیل قندها به محصول واسطه پیرووات نمی باشد؟ Glycolysis Krebs cycle Pentose phosphate pathway Entner – Doudoroff pathway (۴) برای افزایش میزان بقاء (Survivale) سلول های میکروبی نگهداری شده به روش انجاماد، کدام گزینه صحیح تر است؟ (۱) انجاماد کند (۲) رفع انجاماد کند (۳) رفع انجاماد سریع (۴) انجاماد با هوای سرد کدامیک از موارد زیر روش اندازه گیری ATP در مواد غذایی می باشد؟ Radiometry DNA probes Polymerase chain reaction Firefly Luciferin-Luciferase system کدامیک از موارد زیر می تواند در محیط کشت میکروبی نقش القاء کننده (Inducer) داشته باشد؟ (۱) پکتین (۲) گلوكز (۳) لیزین (۴) فسفات کلسیم در تولید آنزیم Pectinase چه سوبسٹرایی بطور خاص نقش تعیین کننده دارد؟ (۱) آب پتیر (۲) ملاس چغندر قند (۳) ضایعات سبب (۴) ضایعات کشتارگاهها غلظت چه جزئی از محیط کشت، روی آسان یا سخت تر شدن جداسازی اسید آمینه تولید شده به روش تخمیر اثر دارد؟ (۱) تیامین (۲) نیاسین (۳) ریبوفلاوین (۴) بیوتین کدام عامل در تولید متابولیت ثانویه مؤثر تر است؟ (۱) سرعت رشد (۲) فاز رشد میکروب (۳) حالت فیزیکی محیط کشت (۴) وجود تحريك کننده (Inducer) کدام گزینه زیر در نتیجه ایجاد جهش (متواسیون) در پرموموتر (prpmoter) است? (۱) توقف ترجمه (۲) توقف رونویسی (۳) انجام رونویسی و توقف ترجمه (۴) بیان ژن مورد نظر به خوبی امکان پذیر است و جهش مذکور اثری ندارد. کدام روش زیر برای تعیین اندازه DNA به کار می رود؟ (۱) PAGE (۲) western blot (۳) Northern blot (۴) Southern blot چنانچه در آزمایشی که توسط واکنش زنجیره ای پلیمراز هدایت می شود، تعداد ۳ قطعه DNA هدف داشته باشیم و با استفاده از DNA پلیمراز و پرایمرهای مناسب ۴ سیکل کامل واکنش صورت گیرد، چند قطعه از DNA هدف در پایان خواهیم داشت؟ </p>	-۶۲ -۶۳ -۶۴ -۶۵ -۶۶ -۶۷ -۶۸ -۶۹ -۷۰ -۷۱ -۷۲ -۷۳ -۷۴ -۷۵ -۷۶ -۷۷
(۱) ۱۲۰ کدام گزینه در خصوص امکان وجود بیش از یک کدون برای یک اسید آمینه صحیح است؟ (۱) بعضی کدون ها هیچ اسید آمینه ای را کد نمی کنند. (۲) بعضی کدون ها دارای توالی نوکلئوتیدی مشابه هستند. (۳) به دلیل داشتن ۶۴ نوع نوکلئوتید به ازای فقط ۲۰ نوع اسید آمینه (۴) کدون AUG علاوه بر اینکه کد کننده اسید آمینه آرژنین است، به عنوان کدون آغاز در سنتز پروتئین عمل می کند. در پروکاریوت ها، آنزیم های مورد نیاز برای آنابولیسم معمولاً توسط ژن ها یا اوپرون های سنتز می شوند در صورتی که آنزیم های مورد نیاز برای کاتابولیسم توسط ژن های سنتز می شوند. (۱) مهار کننده - الفا کننده (۲) الفا کننده - مهار کننده (۳) کنترل مثبت - کنترل منفی کدام یک رایج ترین روش انتقال ژن در باکتری ها در فرآیند gene cloning می باشد؟ Transformation Protoplast fusion Conjugation Transduction چرا برخی از پلاسمیدها دارای copy number های زیادی هستند؟ (۱) چون تعداد ژن های روی این پلاسمیدها کم است. (۲) چون تعداد اوپرون های مورد بررسی این پلاسمیدها کم است. (۳) چون این پلاسمیدها ارزش حیاتی برای سلول میزبان خود ندارند. (۴) چون در ساختمان خود دارای چندین جایگاه origin of replication می باشند.	-۷۴ -۷۵ -۷۶ -۷۷

-۷۸

در **Electroporation** مستعد کردن دیواره سلولی باکتری به ورود قطعه DNA چگونه انجام می‌شود؟

- ۱) با نمک کلرور سدیم
 - ۲) با نمک کلرور پتاسیم
 - ۳) با استفاده از نمک کلرور کلسیم
 - ۴) با استفاده از مهندسی معکوس چگونه می‌توان یک آنزیم را به تولید صنعتی رساند؟
- ۱) شناسایی نوع آنزیم با استفاده ژل آکارز \rightarrow وارد کردن آنزیم در میزبان و تکثیر آن
- ۲) تعیین پروفیل اسیدهای آمینه سازنده آن آنزیم \rightarrow تعیین mRNA و سپس DNA کد کننده آنزیم \rightarrow کلون کردن DNA در میزبان و تکثیر و تولید آنزیم
- ۳) تعیین پروفیل اسیدهای آمینه سازنده آنزیم \rightarrow شناسایی منع آن اسیدهای آمینه \rightarrow قرار دادن آن اسیدهای آمینه کنار یکدیگر \rightarrow تولید آنزیم
- ۴) پیدا کردن میزبان اولیه آنزیم \rightarrow پیدا کردن ژن کد کننده آن آنزیم در میزبان مربوطه \rightarrow تکثیر میزبان \rightarrow تولید آنزیم

-۷۹

در فرآیند **Replication** سنتز کدام یک از رشته‌های DNA جدید، در جهت $5' \rightarrow 3'$ می‌باشد؟

- ۱) هر دو رشته DNA جدید سنتز شده
- ۲) هیچ کدام از DNA های جدید سنتز نشده
- ۳) رشته‌ای که بر روی رشته Lagging سنتز می‌شود.
- ۴) رشته‌ای که بر روی رشته Leading سنتز می‌شود.

-۸۰