

۲۲۱

F

نام:

نام خانوادگی:

محل امضا:



221F

صبح جمعه

۹۳/۱۲/۱۵

دفترچه شماره ۱۱ از ۲



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.
امام خمینی (ره)

آزمون ورودی دوره‌های دکتری (نیمه مرکز) داخل - سال ۱۳۹۴

اپیدمیولوژی
(کد ۲۷۱۳)

مدت پاسخگویی: ۱۲۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۹۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی (أصول اپیدمیولوژی، آمار حیاتی، بیماری‌های باکتریایی، ویروسی، انگلی و غیرواگیردار دام و طیور، بیماری‌های مشترک انسان و دام)	۹۰	۱	۹۰

این آزمون نمره منفی دارد.
استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

اسفند ماه - سال ۱۳۹۳

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و ...) پس از برگزاری آزمون، برای نماین اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با عجز این سازمان مجاز می‌باشد و با متخلفین برای مقررات رفتار می‌شود.

-۱- کدام گزینه در مورد مخدوشگر صحیح نمی‌باشد؟

۱) مخدوشگر با متغیر مستقل مطالعه رابطه دارد.

۲) مخدوشگر فاکتور خطر برای بیماری تحت بررسی نمی‌باشد.

۳) مخدوشگر ارتباط واقعی بین متغیرهای تحت بررسی را حذف یا کمزنگ می‌کند.

۴) مخدوشگر ارتباط غیر واقعی کامل یا ناقص بین متغیرهای تحت بررسی بوجود می‌آورد.

-۲- کدام جمله در مورد یک بیماری خاص که باعث مرگ حیوان می‌شود، صحیح است؟

۱) بسته به نوع بیماری مقدار این دو عدد متفاوت است.

۲) مقدار عددی کشنده‌گی (case fatality) معمولاً با مقدار مرگ‌ومیر (mortality) برابر است.

۳) مقدار عددی کشنده‌گی (case fatality) معمولاً از مقدار مرگ‌ومیر (mortality) کوچکتر است.

۴) مقدار عددی کشنده‌گی (case fatality) معمولاً از مقدار مرگ‌ومیر (mortality) بزرگتر است.

-۳- در یک گاوداری ۱۰۰۰ رأسی طی ماه فروردین ۳۰ رأس به تب برفکی مبتلا شدند و طی ماه اردیبهشت هم

۲۵ رأس دیگر به این بیماری مبتلا شدند. به شرط ثابت ماندن تعداد جمعیت، بروز تجمعی طی ماه

اردیبهشت چقدر است؟

$$\frac{55}{1000} \quad (4)$$

$$\frac{30}{970} \quad (3)$$

$$\frac{25}{1000} \quad (2)$$

$$\frac{25}{970} \quad (1)$$

-۴- کدام یک از موارد زیر با مفهوم suppressive vaccination مطابقت دارد؟

۱) واکسیناسیون در مناطق مرزی

۲) واکسیناسیون اطراف منطقه رخداد بیماری

۳) واکسیناسیون افراد بیمار در منطقه رخداد بیماری $\frac{4}{4}$ واکسیناسیون داخل و اطراف منطقه رخداد بیماری

-۵- در محاسبه بروز کولیک، پیگیری ۲۵ اسب برای ۲ سال شبیه به پیگیری ... می‌باشد.

۱) ۵ اسب برای ۱۰ سال

۲) ۱۰ اسب برای ۱۰ سال

۳) ۱۰ اسب برای ۱۵ سال

۴) ۵ اسب برای ۲۰ سال

-۶- دو آزمون تشخیصی با ویژگی ۹۰ و ۹۵ درصد به صورت متوالی (Serial) بکار برده می‌شوند ویژگی کل چند درصد است؟

۱) ۸۵/۵

۲) ۹۲/۵

۳) ۹۷/۵

۴) ۹۹/۵

-۷- در یک پژوهش، محققین نشان دادند که در مناطقی که مصرف فلوئوکینولون‌ها در مرغداریها بیشتر است، فراوانی

ایزوله‌های سالمونلا مقاوم به فلوئوکینولون‌ها از اسهال‌های انسانی هم بیشتر است. این پژوهش یک مطالعه:

۱) همگروهی است.

۲) مورد - شاهدی است.

۳) اکولوژیک است.

۴) مجموعه همه موارد است.

-۸- «بیماری تیلریوز گاوی در فصل تابستان بیشتر مشاهده می‌شود» این عبارت اشاره دارد به روند:

۱) تناوبی

۲) کوتاه مدت

۳) دراز مدت

۴) دیرپا

-۹ می خواهیم رابطه بین آلودگی سرمی به توکسولاسما و ضریب هوشی را بررسی کنیم. از گروهی از دانشجویان نمونه خون برای سرولوژی گرفتیم و با پرسشنامه استاندارد ضریب هوش آنها نیز به دست آمد.

نوع مطالعه چیست؟

- (۱) کارآزمایی (۲) مقطعی (۳) مورد - شاهدی (۴) همگروهی

-۱۰ تاکنون مطالعات اپیدمیولوژیک متعددی در نقاط مختلف دنیا، رابطه معنی داری بین سقط درگاوهای شیری و آلودگی به نئوسپورا کانینوم را نشان داده اند. این مطلب کدامیک از معیارهای علیتی را نشان می دهد؟

- (۱) Specificity (۲) Coherence (۳) Consistency (۴) Strenght

-۱۱ کدامیک از موارد زیر درباره مراقبت غیر فعال صحیح نیست؟

- (۱) به دست آوردن اطلاعات از طریق تماس با دامپزشکان
 (۲) ساده تر بودن اجرای آن نسبت به مراقبت فعال
 (۳) کمتر بودن هزینه آن نسبت به مراقبت فعال
 (۴) همه موارد

-۱۲ در جدول زیر حساسیت و ویژگی به ترتیب عبارت است از:

		نتیجه آزمون		
		+	-	
وضعیت واقعی بیماری	+	۲۴	۶	(۱)٪۹۶ و ٪۴۱
	-	۳۴	۱۳۶	(۲)٪۹۶ و ٪۴۱ (۳)٪۸۵ و ٪۸۰ (۴)٪۸۵ و ٪۸۰

-۱۳ در این نوع همه‌گیری، موارد به تدریج پیدا شده و در منحنی همه‌گیری قله واصحی دیده نمی‌شود؟

- (۱) همه‌گیری با منبع مشترک، لحظه‌ای
 (۲) همه‌گیری با منبع مشترک، مداوم
 (۳) همه‌گیری با منبع مشترک، متناوب
 (۴) همه‌گیری پیشرونده

-۱۴ همسان‌سازی فردی در کدام مطالعات بیشتر کاربرد دارد؟

- (۱) مورد شاهدی (۲) همگروهی (۳) مداخله‌ای (۴) مقطعی

-۱۵ کاهش انتقال بیماری در جامعه به سطح بسیار پایینی که از قبل تعیین شده باشد را چه می‌گویند؟

- (۱) مبارزه (۲) مهار (۳) ریشه‌کنی (۴) حذف

-۱۶ کدامیک از مراحل زیر در بررسی یک اپیدمی بر سایر موارد، تقدم دارد؟

- (۱) تدوین فرضیه (۲) تعیین علت یا علل اپیدمی

-۱۷ کدامیک از پایگاه‌های اطلاعاتی زیر برای جستجوی منابع علمی اپیدیولوژی داخل کشور مناسب‌تر می‌باشد؟

- (۱) CAB (۲) Elsevier (۳) Springer (۴) SID

-۱۸ ثبت پیامدهای مصرف دارو و واکنش‌های ناخواسته آن، مرحله چندم کارآزمایی‌های بالینی می‌باشد؟

- (۱) دوم (۲) سوم (۳) چهارم (۴) پنجم

-۱۹ در یک پژوهش رابطه بین نوشیدن قهوه و ابتلا به سرطان پانکراس مورد تأیید قرار می‌گیرد. از طرفی ارتباط

سیگار نیز با هر دو متغیر تأیید می‌شود. کدام گزینه صحیح‌تر است؟

- (۱) سیگار و قهوه متغیرهای مستقل هستند.
 (۲) سیگار یک متغیر مخدوش‌گر است.

- (۳) قهوه یک متغیر مخدوش‌گر است.
 (۴) سرطان پانکراس متغیر مستقل است.

- ۲۰ - قرنطینه، محدود نمودن فعالیت‌های تمامی افراد و حیواناتی که

- (۱) به بیماری واگیردار مبتلا یوده یا در دوره نقاوت آن هستند.
- (۲) در مرحله کمون یک بیماری عفونی می‌باشند.
- (۳) در مرحله واگیری یک بیماری عفونی می‌باشند.
- (۴) با یک مورد مبتلا به بیمار عفونی مواجهه داشته‌اند.

- ۲۱ - اگر بروز بیماری در یک گروه دارای مواجهه ۲۰ درصد و در افراد فاقد مواجهه معادل ۵ درصد باشد و بدانیم که بروز در کل جامعه ۷ درصد می‌باشد، خطر مناسب به مواجهه در جامعه چند درصد است؟

- (۱) ۲۸/۶ (۲) ۶۰ (۳) ۷۵ (۴)

- ۲۲ - در تحقیقی برای تأثیر یک جیره جدید در افزایش وزن، دو گروه گوسفند از ۳ نژاد مختلف که از نظر سن، جنس و وزن اولیه مشابه بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند، کدام گزینه یک متغیر مستقل نمی‌باشد؟

- (۱) جیره (۲) نژاد (۳) جنس (۴) افزایش وزن

- ۲۳ - قابلیت تعیین نتایج یک مطالعه معادل کدام گزینه است؟

- (۱) پایابی (۲) روانی (۳) اعتبار درونی (۴) اعتبار بیرونی

- ۲۴ - کدام گزینه در تعریف مراقبت در دامپزشکی صحیح‌تر است؟

- (۱) جمع‌آوری منظم داده‌ها، آنالیز آنها و انتشار به موقع نتایج بدست آمده

- (۲) جمع‌آوری داده‌ها آنالیز داده‌ها و پایش‌های سرمی برای ارزیابی وضعیت

- (۳) جمع‌آوری منظم اطلاعات از واحدهای مختلف سنتی و صنعتی با حداقل دقت و توان

- (۴) جمع‌آوری داده‌های مرتبط با سلامتی در جمیعت‌های دامی برای ارائه راهکارهای کنترل بیماری

- ۲۵ - در یک مطالعه مورد شاهدی برای تعیین عوامل خطر یک بیماری، مقدار نسبت شانس برای ۴ متغیر به شرح ذیل برآورد شده است کدام یک عامل خطر می‌باشد؟

$$\text{OR} = ۰/۴(۰/۳ - ۰/۵) \quad (۱)$$

$$\text{OR} = ۲/۲(۱/۷ - ۲/۷) \quad (۲)$$

$$\text{OR} = ۱/۵(۰/۹ - ۲/۱) \quad (۳)$$

$$\text{OR} = ۰/۸(۰/۵ - ۱/۱) \quad (۴)$$

- ۲۶ - در یک مطالعه همگروهی اگر از ۱۰۰۰ نفر مواجهه یافته ۴۰ نفر مبتلا به بیماری شده باشند و بروز بیماری در جمیعت شاهد برابر ۸۰ درصد هزار نفر باشد، مقدار خطر نسبی این مواجهه چقدر است؟

- (۱) ۲ (۲) ۵ (۳) ۲۰ (۴) ۵۰

- ۲۷ - در یک مطالعه مورد - شاهدی که در مجموع ۳۰۰ نفر در دو گروه مساوی مطالعه شدند، ۳۰ درصد بیماران و ۵۰ درصد گروه کنترل دارای مواجهه مورد نظر بودند. شاخص قدرت ارتباط بین مواجهه و بیماری چقدر است؟

- (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۳/۵ (۴) ۴

- ۲۸ - اگر بخواهیم اثر توأم دو رژیم داروئی را در درمان یک بیماری سنجش نمائیم، کدام طراحی را مناسب‌تر می‌دانید؟

- (۱) مطالعه تجربی دو سو کور (۲) طرح فاکتوریال (۳) طراحی متقاطع (۴) طراحی موازی

- ۲۹ - تنوع بین فردی در اندازه‌گیری‌های آزمایشگاهی روی کدام شاخص تأثیر بیشتری دارد؟

- (۱) ویژگی (۲) حساسیت (۳) تکرار پذیری (۴) ارزش اخباری مثبت و منفی

- ۳۰ - در صورت استفاده از آزمون های متوالی در برنامه های غربالگری، در چه صورت نمونه مثبت تلقی می شود؟
- تمام آزمون ها مثبت باشد.
 - آخرین آزمون مثبت باشد.
 - حداقل یکی از آزمون ها مثبت باشد.
 - بستگی به نوع بیماری و نقطه برش دارد.
- ۳۱ - اگر شیوع یک بیماری در یک زمان نسبت به گذشته زیادتر شده باشد، به کدام دلیل می تواند باشد؟
- بروز بیشتر بیماری
 - مرگومیر کمتر از آن بیماری
 - هر سه مورد
 - چه نسبتی از افراد جامعه ایمن باشند، ایمنی گروهی (Herd Immunity) می تواند عمل کند؟
- برای بیماری های مختلف، متفاوت است.
 - بین ۷۵ تا ۹۰ درصد
 - بالای ۹۰ درصد
 - حداقل ۸۰ درصد
- ۳۲ - کدام گزینه در زمرة اهداف اپیدمیولوژی نمی باشد؟
- مطالعه سیر طبیعی و پیش آگهی بیماری
 - آموزش مردم برای کنترل بیماری ها
 - تعیین سبب و یا علت ایجاد یک بیماری
 - تعیین عوامل خطر بیماری
- ۳۴ - در یک گله ۳۰۰۰ رأسی گاو شیری که در سال ۵۰ مورد تلفات اتفاق افتاده است، ۲۰ مورد از این تلفات ناشی از اسهال گوساله ها بوده است اگر تعداد کل گوساله ها ۱۲۰ رأس باشد، میزان مرگومیر اختصاصی ناشی از بیماری در گله چقدر می باشد؟
- ۶/۶ در هزار
 - ۱۶/۶ در هزار
 - ۱۶۶ در هزار
 - ۴۰۰ در هزار
- ۳۵ - در یک توزیع پواسن با احتمال موفقیت $p = 0.25$ و $n = 100$ واریانس و میانگین برآورد p چقدر است؟
- ۱۸/۷۵، ۲۵
 - ۲۵، ۲۵
 - ۲۵، ۱۸/۷۵
 - ۲۵، ۵
- ۳۶ - اگر در یک توزیع «نما > میانه > میانگین» باشد، آن چه توزیعی است؟
- نرمال
 - چوله به چپ
 - چوله به راست
 - چنین چیزی امکان ندارد
- ۳۷ - در یک مطالعه، یک نمونه ۱۰۰ رأسی از جمعیت گوسفندان یک منطقه به صورت تصادفی انتخاب و از نظر ابتلا به بیماری بروسلوز مورد ارزیابی قرار گرفتند. تعداد ۱۰ رأس از این دامها مبتلا به بروسلوز تشخیص داده شدند. فاصله اطمینان ۹۵٪ برای شیوع این بیماری کدام گزینه زیر است؟
- ۷.۳/۱ - ۷.۱۶/۹
 - ۷.۴/۱ - ۷.۱۵/۹
 - ۷.۵/۱ - ۷.۱۴/۹
 - ۷.۶/۱ - ۷.۱۳/۹
- ۳۸ - کدام نمودار برای نمایش رابطه ۲ متغیر کمی مناسب است؟
- خطی
 - دایره ای
 - پراکندگی
 - ستونی
- ۳۹ - در نمونه برداری از یک جمعیت ناهمگن، کدام یک از شیوه های نمونه گیری بهترین می باشد؟
- منظم
 - تصادفی ساده
 - خوشه ای
 - طبقه بندی شده
- ۴۰ - اگر وزن گوساله ها در زمان تولد توزیع نرمال و میانگین ۳۸ کیلوگرم داشته باشد، احتمال این که سه گوساله ای که به صورت تصادفی انتخاب شده اند، همگی وزن بیشتر از ۳۸ کیلوگرم داشته باشند چقدر است؟
- ۱/۴
 - ۱/۲
 - ۱/۳
 - ۱/۴
 - ۱/۸
- ۴۱ - در محاسبه حجم نمونه برای برآورد آلدگی مدفوعی گوساله ها به کریپتوسپوریدیوم تغییر خطای آلفا، چه اثری بر حجم نمونه دارد؟
- اثر مستقیم
 - اثر معکوس
 - به نوع متغیر بستگی دارد

- ۴۲- اگر انحراف معیار صفتی در جامعه برابر 10° باشد و مایل باشیم خطای برآورد با 95 درصد اعتماد از عدد 2 تجاوز نکند حداقل حجم نمونه برابر کدام یک است؟
- (۱) 68 (۲) 96 (۳) 142 (۴) 384
- ۴۳- احتمال تولد گوساله ناهنجار در یک گاوداری یک درصد است احتمال آنکه از سه زایمان متوالی در این گاوداری هیچ کدام از گوساله‌ها دچار ناهنجاری نباشند، برابر کدام یک است؟
- (۱) 0.01 (۲) 0.03 (۳) 0.95 (۴) 0.97
- ۴۴- اگر انحراف معیار یک توزیع نرمال 10° و \bar{X} میانگین یک نمونه 16 تایی از این جامعه باشد احتمال آنکه \bar{X} در فاصله 5 از میانگین واقعی قرار گیرد تقریباً چند درصد است؟
- (۱) 50 (۲) 68 (۳) 90 (۴) 95
- ۴۵- اگر احتمال وقوع لنگشی و LDA (جایه جایی شیردان به سمت چپ) در یک گاوداری به ترتیب $\frac{1}{3}$ و $\frac{2}{5}$ باشد احتمال آنکه به تصادف گاوی انتخاب شود و مبتلا به لنگش یا LDA باشد برابر کدام یک است؟
- (۱) $\frac{3}{5}$ (۲) $\frac{11}{15}$ (۳) $\frac{1}{5}$ (۴) $\frac{2}{15}$
- ۴۶- اگر جامعه‌ای به اندازه 200 راس گاو شیری را به دو زیرمجموعه مساوی تقسیم نمائیم و واریانس تولید شیر در دو زیر گروه به ترتیب برابر 49 و 64 کیلوگرم باشد می‌توان گفت واریانس برای کل جامعه:
- (۱) از هر دو بزرگتر است. (۲) از هر دو کوچکتر است.
- (۳) بستگی به اختلاف میانگین‌ها دارد. (۴) در فاصله دو واریانس قرار دارد.
- ۴۷- اگر واحد اندازه‌گیری وزن طیور پرورشی را از کیلوگرم به گرم تبدیل کنیم مقدار عددی:
- (۱) میانگین بر عدد هزار تقسیم می‌شود. (۲) انحراف معیار تغییر نمی‌کند.
- (۳) واریانس هزار برابر می‌شود. (۴) انحراف معیار هزار برابر می‌شود.
- ۴۸- اگر مقدار هموگلوبین خون در گروهی از گوسفندان اصلاح نزاد شده دارای میانگین $\frac{12.2}{\text{mg/dl}}$ و واریانس صفر باشد میانه و نما به ترتیب برابر کدام موارد خواهد بود؟
- (۱) 0 و 12.2 (۲) 12.2 و 0 (۳) 0 و 0 (۴) قابل تعیین نیست
- ۴۹- میانگین و ضریب تغییرات موارد مراجعه دامداران به اداره کل دامپزشکی در یک شهرستان به ترتیب برابر 4 و $25/10$ است. انحراف معیار آن برابر کدام یک است؟
- (۱) $0/25$ (۲) 1 (۳) $1/25$ (۴) 2
- ۵۰- وجود صفر قراردادی به کدام یک از متغیرهای زیر مربوط است؟
- (۱) اسمی (۲) رتبه‌ای (۳) فاصله‌ای (۴) نسبی
- ۵۱- کدام یک از گونه‌های زیر نسبت به آفتو ویروس‌ها (از جمله ویروس تب برفکی) مقاوم می‌باشد؟
- (۱) شتر (۲) گاو (۳) اسب (۴) گاومیش
- ۵۲- مهم‌ترین نوع آبله دام از نظر تلفات و خسارات اقتصادی کدام است؟
- (۱) آبله گوسفند و بز (۲) آبله گاوی (۳) آبله شتر (۴) آبله گاومیش
- ۵۳- در کدام بیماری ویروسی، حامل دوره نقاوت اهمیتی در گسترش بیماری ندارد؟
- (۱) رینوتراکئیت عفونی (۲) زبان آبی (۳) تب برفکی (۴) هاری

- ۵۴ - کدام یک از بیماری‌های زیر شیوع فصلی ندارد؟
- (۱) طاعون نشخوارکنندگان کوچک
 (۲) تورم دهان و زیکولی
 (۳) طاعون اسبی
 (۴) تب دره ریفت
- ۵۵ - کدام یک از بیماری‌های ویروسی زیر امکان انتقال از طریق تلقيق مصنوعی در گاو را ندارد؟
- Foot and mouth disease (۲)
 Leukosis (۴)
- Infectious bovine rhinotracheitis (۱)
 Bovine viral diarrhea (۳)
- ۵۶ - دوره کمون طولانی (حدود ۲ سال) از خصوصیات کدام یک از بیماری‌های ویروسی در گوسفند است؟
- Maedi-visna (۲)
 Peste des petits ruminant (۴)
- Sheep pox (۱)
 Contagious ecthyma (۳)
- ۵۷ - عامل ایجاد اسهال سفید باسیلی ماکیان کدام است؟
- (۱) سالمونلا هاوانا
 (۲) سالمونلا تیفی موریوم
 (۳) سالمونلا پولوروم
 (۴) سالمونلا گالیناروم
- ۵۸ - کدام یک از عوامل زیر در ایجاد سینوزیت عفونی بوقلمون نقش مهمتری دارد؟
- (۱) مایکوپلاسمما (آرژنینی)
 (۲) مایکوپلاسمما مایکوئیدس
 (۳) مایکوپلاسمما گالی سپتیکوم
 (۴) مایکوپلاسمما سینوویه
- ۵۹ - مهمترین تیپ کلستریدیوم پر فرنژانس در ایجاد آنتروتوکسیمی در گوسفند کدام است؟
- D (۴)
 C (۳)
 B (۲)
 A (۱)
- ۶۰ - کدام یک از موارد زیر از عوامل ایجاد کننده ورم پستان نمی‌باشد؟
- (۱) کورینه باکتریوم رناله
 (۲) استافیلوکوکوس ارئوس
 (۳) استرپتوکوکوس آگالاکتیه
 (۴) اکتینومایسیس پیوزن
- ۶۱ - کدام یک از موارد زیر جزء بیماری‌های ناشی از استافیلوکوکوس ارئوس به حساب نمی‌آید؟
- (۱) پنومونی آنزئوتیک گوسالله‌ها
 (۲) خون چرکی کنهای برده‌ها
 (۳) بوتربیومیکوزیس در اسب
 (۴) ورم پستان در گاو
- ۶۲ - حساس‌ترین حیوان به آگالاکسی کدام است؟
- (۱) بز
 (۲) گوسفند
 (۳) گاو
- ۶۳ - کشنده‌گی کدام بیماری در حیوان بیشتر است؟
- (۱) سل
 (۲) بروسلوز
 (۳) تب برگی
- ۶۴ - کدام گونه نسبت به بیماری مشتمله مقاوم است؟
- (۱) سگ
 (۲) خوک
 (۳) الاغ
 (۴) شیر
- ۶۵ - سیلوی کم کیفیت به عنوان منبع کدام یک از عفونت‌های باکتریایی زیر مطرح است؟
- (۱) یرسینیوز
 (۲) پاستورلوز
 (۳) لیستریوز
 (۴) لپتوسیپریوز
- ۶۶ - مهم‌ترین راه ورود کوکسیلا بورنی در انسان و دام‌های اهلی کدام است؟
- (۱) چشم
 (۲) تنفس
 (۳) گوارش
 (۴) پوست
- ۶۷ - میزان کدام یک از سستودهای زیر نشخوارکنندگان نمی‌باشد؟
- (۱) مونیزیا پالیدا
 (۲) مونیزیا اکسپانسا
 (۳) مونیزیا بنهدنی
 (۴) همه موارد
- ۶۸ - در ایران حلزون اوریکولار یا گدروزیانا میزان واسط کدام یک از ترماتودهای زیر است؟
- (۱) شیستوزوما اسپینداله
 (۲) شیستوزوما بوویس
 (۳) اورنیتوبیلارزیا بمفوردی
 (۴) اورنیتوبیلارزیا کستانیکم

- ۶۹- کدام یک از سستودهای زیر میزان واسط ندارد؟
- (۱) هیمنولپیس نانا
 (۲) هیمنولپیس دیمینوتا
 (۳) هیمنولپیس گراسیلیس
 (۴) همه موارد
- ۷۰- سقط جنین تک‌گیر (Sporadic abortion) در گاو مشخصه انتقال کدام انگل است؟
- (۱) Horizontal transmission of Toxoplasma
 (۲) Horizontal transmission of Neospora
 (۳) Vertical transmission of Neospora
 (۴) Vertical transmission of Toxoplasma
- ۷۱- نقش آب در انتقال کدام یک از بیماری‌های انگلی زیر بیشتر است؟
- (۱) Taeniasis
 (۲) Fascioliasis
 (۳) Hydatidosis
 (۴) Schistosomiasis
- ۷۲- کدام یک از گزینه‌های زیر در ارتباط با همه‌گیری شناسی بیماری استرتازیازیس (ostertagiasis) در گاوها صحیح نمی‌باشد؟
- (۱) تیپ I بیماری در بهار پس از چرا به طور معمول رخ نمی‌دهد.
 (۲) بلع تعداد کافی نوزاد انگل در تابستان، به ایجاد تیپ I بیماری منجر می‌شود.
 (۳) وجود خشکسالی در منطقه در فصول تابستان و پاییز، منجر به افزایش وقوع تیپ II بیماری در حیوان می‌شود.
 (۴) بلع تعداد زیادی نوزاد انگل در اوخر زمستان و ابتدای بهار توسط حیوان، به تیپ II بیماری می‌انجامد.
- ۷۳- سقط جنین در کدام بیماری شایع‌تر است؟
- (۱) آناپلاسموزیس
 (۲) تریکومونازیس
 (۳) تیلریوزیس
 (۴) بازیوزیس
- ۷۴- کدام یک از انگل‌های زیر تنها یک نسل در سال تولید می‌کنند؟
- (۱) مارشالازیا
 (۲) استرتازیا
 (۳) نماتودیروس
 (۴) تریکوسترونژیلوس
- ۷۵- هرپس ویروس II طیور عامل کدام یک از بیماری‌های زیر در طیور است؟
- (۱) مارک
 (۲) تورم نای و حنجره
 (۳) طاعون اردک
 (۴) هیچ‌کدام
- ۷۶- خطر ابتلا به کدام بیماری در ۴-۸ هفته پس از زایمان در بیشترین مقدار خود است؟
- (۱) لنگش
 (۲) ورم پستان
 (۳) تب شیر
 (۴) کتوز
- ۷۷- افزایش میزان مولیبدن در جیره سبب کاهش جذب و در نتیجه کمبود کدام یک از عناصر زیر می‌شود؟
- (۱) ویتامین E
 (۲) مس
 (۳) ویتامین A
 (۴) منیزیم
- ۷۸- کدام گزینه در مورد کولیک یا دل درد تک سمی‌ها صحیح نمی‌باشد؟
- (۱) افزایش مدت نگهداری روزانه اسب در اصطبل با افزایش خطر دل درد همراه است.
 (۲) اسب‌هایی که به صورت دائمی به آب‌خوری دسترسی ندارند بیشتر در معرض خطر بروز دل درد هستند.
 (۳) اسب‌هایی که در چراغ‌گاه هستند نسبت به اسب‌هایی که در اصطبل از رژیم کنستانتنره تغذیه می‌کنند بیشتر به دل درد مبتلا می‌شوند.
 (۴) اسب‌های نژاد عرب از جمله نژادهایی هستند که بیشتر از سایر نژادها به دل درد مبتلا می‌شوند.

- ۷۹ - کدام جمله در مورد اسیدوز لاکتیک شکمبه صحیح نمی‌باشد؟

- (۱) التهاب لایه مورق سم (لامیناتیس) و تورم قارچی شکمبه از عوارض بیماری هستند.
- (۲) در کلینیکال پاتولوژی این بیماری pH مایع شکمبه کمتر از ۵، افزایش لاکنات خون و کاهش کلسیم خون مشاهد می‌شود.

(۳) سوءهضم ساده، هیپوکلسیمی زایمانی، ورم پستان کلی فرمی فوق حاد و پریتونیت منتشر حاد ممکن است با این بیماری اشتباه شوند.

(۴) جلوگیری از دستررسی تصادفی به مواد دانه‌ای و دادن جیره‌های حاوی مواد دانه‌ای بالا به صورت تدریجی در پرواریندی‌ها علت اصلی رخداد این بیماری می‌باشد.

- ۸۰ - وقوع تورم ضربه‌ای نگاری - صفاق (TRP) در کدام یک از دامهای زیر متداول‌تر است؟

- (۱) گاوهای شیری بالغ
- (۲) گاوهای شیری یکساله
- (۳) گاوهای گوشتنی
- (۴) گوسفتند و بز

- ۸۱ - سیستم‌های تغذیه‌ای که به بردها اجازه خوردن مقدار زیادی از جایگزین شونده‌های شیر را با فواصل کم می‌دهند موجب کدام یک از بیماری‌های زیر می‌گردند؟

- (۱) زخم شیردان
- (۲) خونریزی از شیردان
- (۳) نفح (اتساع) شیردان
- (۴) هیچ کدام

- ۸۲ - معمول‌ترین و خطرناک‌ترین فرم بیماری شاربن در انسان به ترتیب کدام است؟

- (۱) چشمی - تنفسی
- (۲) پوستی - تنفسی
- (۳) پوستی - گوارشی
- (۴) گوارشی - پوستی

- ۸۳ - مهم‌ترین میزبان اصلی اکینوکوکوس مولتی لوکولاریس کدام است؟

- (۱) شغال
- (۲) روباه
- (۳) سگ
- (۴) گرگ

- ۸۴ - پاتوژن‌های نوپدید بیشتر جزء کدام یک از موارد زیر می‌باشند؟

- (۱) باکتری‌ها و تک یاخته‌ها
- (۲) ویروس‌ها و تک یاخته‌ها
- (۳) کرم‌ها و ویروس‌ها
- (۴) ویروس‌ها و باکتری‌ها

- ۸۵ - کدام یک از گزینه‌های زیر در ارتباط با نوع شهری لیشمانیوز جلدی نادرست است؟

- (۱) ضایعات آن مرطوب است.
- (۲) مخزن آن انسان است.
- (۳) عامل آن لیشمانیا تروپیکا است.
- (۴) دوره کمون آن از نوع روستایی طولانی‌تر است.

- ۸۶ - پتوسپیروز در کدام استان کشور بروز بالاتری دارد؟

- (۱) خوزستان
- (۲) کردستان
- (۳) گیلان
- (۴) سیستان و بلوچستان

- ۸۷ - بر اساس وضعیت فعلی کشور ما، حدوداً چند درصد از گاوهای کشور تحت پوشش مبارزه با سل گاوی می‌باشند؟

- (۱) ۱۰
- (۲) ۳۰
- (۳) ۵۰
- (۴) ۶۰

- ۸۸ - تعداد موارد واقعی بروسلوز در انسان را حداقل چند برابر آمار رسمی باید در نظر گرفت؟

- (۱) پنج
- (۲) شش
- (۳) هفت
- (۴) ده

- ۸۹ - کدام گروه شغلی از نظر تب همورازیک کربمه کنگو در معرض خطر بیشتری هستند؟

- (۱) دامداران
- (۲) قصابان
- (۳) زنان خانه‌دار
- (۴) کارگران واحدهای تولید لبنیات

- ۹۰ - کدام گزینه در مورد هاری در انسان صحیح نمی‌باشد؟

- (۱) ویروس هاری از پوست سالم عبور نمی‌کند.

(۲) در سنین زیر ۱۵ سال، بیماری بیشتر از سایر سنین است.

(۳) بروز بیماری در دو جنس تقریباً مشابه است.

- (۴) حدود ۲۰ درصد از موارد بیماری به شکل فلچی (خاموش) می‌باشد.





