

۲۷۲
F



نام:

نام خانوادگی:

محل اقامت:

صبح جمعه
۱۳۹۵/۱۲/۶
دفترچه شماره (۱)



«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.
امام خمینی (ره)»

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمترکز) داخل – سال ۱۳۹۶

رشته امتحانی زیست‌شناسی دریا (کد ۲۲۳۶)

مدت پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سوال: ۱۰۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی (فیزیولوژی جانوران آبزی – زیست‌شناسی دریا – جانورشناسی دریا – بوم‌شناسی پیشرفت‌های دریا)	۱۰۰	۱۰۰ ۱

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

اسقندمه – سال ۱۳۹۵

حق چاہ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با مختلفین برایر مقررات رفثار می‌شود.

فیزیولوژی جانوران آبزی:

- ۱ کدام بیون در ژله ماهی‌ها و شانه‌داران به صورت فعال تنظیم می‌شود؟
 ۱) سدیم ۲) کلر ۳) پتاسیم
 ۴) کلسیم
- ۲ کدام نوروترافسیمیتر پیش‌ساز متفاوتی نسبت به بقیه دارد؟
 ۱) آدرنالین ۲) دوبامین ۳) سروتونین
 ۴) نورآدرنالین
- ۳ در اثر تابش نور به شبکیه چشم کدام یک از عبارات زیر در خصوص قطعه خارجی رسپتورهای استوانه‌ای صحیح است؟
 ۱) باز شدن کانال‌های سدیمی و کاهش cAMP
 ۲) بسته شدن کانال‌های سدیمی و کاهش cGMP
 ۳) بسته شدن کانال‌های سدیمی و افزایش cGMP
 ۴) بسته شدن کانال‌های سدیمی و افزایش cAMP
- ۴ ترتیب لایه‌های قسمت قشری غده فوق‌کلیه، کدام است؟
 ۱) فاسیکولاتا - رتیکولارس - گرانولوزا
 ۲) گرانولوزا - رتیکولارس - فاسیکولاتا
 ۳) رتیکولارس - گرانولوزا - فاسیکولاتا
 ۴) گرانولوزا - فاسیکولاتا - رتیکولارس
- ۵ آنزیم‌های ALT و AST شاخص‌های استرس کدام اندام در جانوران آبزی هستند؟
 ۱) کبد ۲) آبشش ۳) پیوست
 ۴) ماهیچه
- ۶ در کدام قسمت از نفرون انتقال فعال ثانویه در باز جذب مواد رخ می‌دهد؟
 ۱) انحنای هنله ۲) لوله پیچیده دور ۳) لوله ضخیم صعودی ۴) لوله پیچیده نزدیک
- ۷ در بین مکانیسم‌های متوقف‌کننده پلی‌اسپرمی در ماهیان کدام یک از موارد زیر دیرتر اتفاق می‌افتد؟
 ۱) باقی ماندن اسپرم‌های اضافی در تاجیه دهلیز میکروپبل
 ۲) تغییر ساختار میکروپبل با رسیدن اولین اسپرم به آن
 ۳) تغییر پیوسته تخم از طریق محتویات آزاد شده از ذرات کناری و واکنش لایه زونا
 ۴) تشکیل مخروط لقاحی که از غشاء پلاسمایی اسپرم و تحکم به وجود آمده و منفذ داخلی میکروپبل را مسدود می‌کند.
- ۸ کلمات کدام گزینه به ترتیب جمله زیر را کامل می‌نماید؟
 «در دوره وینلوئن ماهیان، هورمون که از هیپوفیز به گناد می‌رسد باعث تحریک تولید هورمون در سلول‌های تکا شده و آن هم باعث تولید ۱۷-بتا استرادیول در می‌شود؟»
 ۱) GTH_۱ - تستوسترون - سلول‌های گرانولوزا ۲) GTH_۲ - تستوسترون - سلول‌های تکا
 ۳) FSH - استروژن - فولیکول ۴) LH - پروژسترون - سلول‌های سرتولی
- ۹ در بین آنزیم‌های گوارشی، آنزیم کلازنаз از کجا سنتز شده، در چه محیطی فعالیت داشته و محصول هیدرولیز آن به ترتیب کدام است؟
 ۱) معده - اسیدی - آمینواسیدها ۲) پیلوریک سکا - بازی - آمینواسیدها و پپتیدها
 ۳) روده و پانکراس - اسیدی - پپتیدها و آمینواسیدها ۴) پانکراس - خنثی - پپتیدها
- ۱۰ کدام عامل در خود تنظیمی GFR کلیوی بیشترین تأثیر را دارد؟
 ۱) ترشحات لکه متراکم ۲) میزان Na فیلترات
 ۳) میزان هورمون رنین ۴) میزان آنژیوتانسین I

- ۱۱ تحریک‌پذیری **Electrotonic** در کدام سلول دیده می‌شود؟
- (۱) سلول‌های عقده‌ای
 - (۲) سلول‌های پاچینی
 - (۳) سلول‌های پرز چشایی
 - (۴) سلول‌های حساس به نور
- ۱۲ در پستانداران ابتدایی بخش حرکتی اصلی مغز کدام است؟
- (۱) مخچه
 - (۲) قشر مغز
 - (۳) تalamوس
 - (۴) عقده‌های قاعده‌ای
- ۱۳ آلایندگان «برهم زننده اندوکرینی» کدام دستگاه جانداران آبزی را بیشتر تحت تأثیر قرار می‌دهد؟
- (۱) دستگاه گوارشی
 - (۲) دستگاه تولیدمثل
 - (۳) دستگاه تنفسی
 - (۴) دستگاه دفع مواد زائد نیتروژن دار
- ۱۴ همه موارد زیر جزئی از پاسخ استرس در سطح اولیه (**Primary response**) هستند، به جز:
- (۱) تغییر میزان قند خون
 - (۲) تحریک سیستم سمپاتیک
 - (۳) تحریک ترشح کتکول آمین‌ها
 - (۴) تحریک ترشح هورمون از بافت اینترنال
- ۱۵ مهم‌ترین مؤلفه سیستم ایمنی در ماهیان کدام است؟
- (۱) لیپاز
 - (۲) فسفاتان
 - (۳) لیزوژیم
 - (۴) پروتئاز
- ۱۶ در باره نقش تیروئید در تنظیم اسمزی ماهیان، کدام جمله صحیح است؟
- (۱) موجب افزایش تعداد یونوسمیت‌ها در آبشش ماهیان می‌شود.
 - (۲) با پشتیبانی فرایندگان انرژی خواه بر انتقال فعال یون‌ها مؤثر است.
 - (۳) غده تیروئید در ماهیان استخوانی نقش مستقیم و در ماهیان غضروفی نقش غیرمستقیم در تنظیم اسمزی دارد.
 - (۴) با افزایش نفوذپذیری بافت پوششی آبشش خروج یون‌ها را از بافت افزایش می‌دهد.
- ۱۷ تفاوت ساختاری سطح سلول‌های کلراید و سلول‌های سنگفرشی آبشش در سمت محیط خارجی چیست؟
- (۱) سطح سلول‌های کلراید وسیع‌تر از سلول‌های سنگفرشی است.
 - (۲) سطح سلول‌های کلراید کمی برآمدۀ‌تر از سطح سلول‌های سنگفرشی است.
 - (۳) در سطح سلول‌های کلراید ریزپرز و ریزلبه‌ها دیده می‌شود ولی سطح سلول‌های سنگفرشی دارای ریزلبه‌ها است.
 - (۴) سطح سلول‌های سنگفرشی در تماس مستقیم با آب محیط است اما سطح سلول‌های کلراید در تماس مستقیم با آب محیط نیست.
- ۱۸ گزینه درست در باره پمپ سدیم - پتانسیم کدام است؟
- (۱) این پمپ مختص سلول‌های تنظیم یونی بوده در تنظیم اسمزی نقش دارد.
 - (۲) این پمپ در تمام سلول‌های بدن وجود داشته و در اعمال حیاتی سلول‌های مثل تعذیه، دفع و تقسیم سلولی نقش دارد.
 - (۳) این پمپ در تمام سلول‌های بدن وجود داشته و در ازای سه اتم یون سدیم ورودی دو اتم پتانسیم از سلول خارج می‌کند.
 - (۴) این پمپ با داشتن آنزیم $\text{Na}^+ - \text{K}^+ - \text{ATPase}$ نقش مهمی در دفع یون‌های دوظرفیتی از طریق آبشش دارد.
- ۱۹ کتکولامین‌ها در انتهای اعصاب نور‌آدرنرژیک و سایر بافت‌ها توسط آنزیم شکسته می‌شوند.
- (۱) دکاربوكسیلاز
 - (۲) متیل ترانسفراز
 - (۳) کولین استراز
 - (۴) مونو‌آمین اکسیداز
- ۲۰ در میان مکانورسپتورهای ماهیان (گیرنده‌های مکانیکی)، به ترتیب مسئول دریافت کمترین و بیشترین فرگانس‌ها کدامند؟
- (۱) سبیلک‌ها - گیرنده‌های دستگاه شنوایی
 - (۲) خط جانبی - شنوایی
 - (۳) آمپول لورنزنی - خط جانبی
 - (۴) مجاری نیم‌دایره‌ای - آمپول لورنزنی

- ۲۱ - نقش پیاز بويایي در دستگاه گيرندگی شيميايی ماهيان کدام است؟
- (۱) درک فرمون هاي جنسی
 - (۲) تقويت سيگنال هاي حاصل از فرمون هاي جنسی
 - (۳) تفکيك و دسته‌بندی اعصاب بويایي به اعصاب تخصصی بويایي
 - (۴) تفکيك تحریکات دریافت شده سیستم چشایی از سیستم بويایي
- ۲۲ - در پستاندران غیرپریمات، سرنوشت پورین‌ها کدام است؟
- (۱) آلانتون
 - (۲) اسیداوریک
 - (۳) آمونیوم
 - (۴) اوره
- ۲۳ - شدت اثر يك هورمون خاص بر سلول‌های هدف در يك موجود به همه عوامل زير بستگی دارد، به جز:
- (۱) شرایط محیطی
 - (۲) غلظت هورمون
 - (۳) ساختار شيميايی هورمون
 - (۴) برهكمش بين هورمون‌ها
- ۲۴ - در چرخه تولید آمونیاک، به عنوان ماده دفعی نیتروژنی، حاصل هیدرولیز آسپارازین و AMP به ترتیب چه موادی می‌باشند؟
- (۱) آسپارتات - IMP
 - (۲) گلوتامات - GTP
 - (۳) آسپارتات - GDP+Pi
 - (۴) آسپارتات آمینو ترانسفراز - ADP
- ۲۵ - کدام گزینه درباره Calcitonin Gene –Related Peptide دریایی درست می‌باشد؟
- (۱) هورمون مشابه کلسی‌تونین بوده، از تیروئید ترشح و نقش تنظیم کلسیم خون را دارد.
 - (۲) هورمونی است که در سخت پوستان گزارش شده و معادل کلسی‌تونین مهره‌داران می‌باشد.
 - (۳) هورمونی است که توسط ژنوم هورمون کلسی‌تونین کد شده و همانند نوروتراسミترها عمل می‌کند.
 - (۴) نوروهورمونی است که توسط سلول‌های عصبی تولید شده و در تنظیم اعمال مغز و قلبی عروقی دخالت دارد.
- ۲۶ - آبشش آبزیان به سورفاکتانت نیاز ندارد، چون
- (۱) تیغه‌های آبشش برخلاف حبابچه‌های شش تغییر اندازه سطح ندارند.
 - (۲) آبشش به جریان مدیوم (آب) نیاز ندارد.
 - (۳) انتقال گازهای تنفسی نیاز به واسطه آب ندارد.
 - (۴) اکسیزن گیری بیشتر از طریق سطح بدن صورت می‌گیرد.
- ۲۷ - کمترین تعداد دندان در کدام یک از نمونه‌های پستاندار دریایی دیده می‌شود؟
- (۱) ماناتی‌ها
 - (۲) وال‌های منقاردار
 - (۳) وال‌گوزشت
 - (۴) فک پلنجی
- ۲۸ - با مهار کدام یک از یون‌های زیر آزاد شدن واسطه عصبی از پایانه پیش‌سیناپسی متوقف می‌شود؟
- (۱) ورود کلر
 - (۲) خروج پتانسیم
 - (۳) خروج سدیم
 - (۴) ورود کلسیم
- ۲۹ - در تماس بلندمدت بافت آبشش با عوامل نامساعد و محرك محیطی کدام عارضه قابل مشاهده است؟
- (۱) هیپرتروفی یونوسیت‌ها
 - (۲) هایپرپلازی اپتیلیوم
 - (۳) آنوریسم
 - (۴) پارگی اپتیلیوم آبشش
- ۳۰ - ماده رنگی پلاسمایی خون نرم‌تنان و ماهیان غضروفی به ترتیب کدام‌اند؟
- (۱) هموسیانین و ندرتاً هموگلوبین - هموگلوبین
 - (۲) هموگلوبین - هموگلوبین
 - (۳) هموسیانین - هموسیانین - کلرواورین
 - (۴) کلرواورین و ندرتاً هموسیانین - هموگلوبین

زیست‌شناسی دریا:

- ۳۱ همه موارد زیر، در فصل تابستان به شناوری پلانکتون‌ها کمک می‌کند، به جز:
- (۱) کاهش زوائد بدن
 - (۲) تحرک اندام‌های حرکتی
 - (۳) کاهش اندازه بدن
 - (۴) افزایش قطرات چربی در سلول‌ها
- ۳۲ در کدام یک، بیشترین حجم خون در گردش مشاهده می‌شود؟
- (۱) ماهیان خاویاری
 - (۲) گاو ماهیان
 - (۳) ماهیان دو تنفسی
 - (۴) کوسه ماهیان
- ۳۳ اندام **Pedicellaria** در کدام موجودات یافت می‌شود؟
- | | | | |
|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Sea cucumbers (۴) | Sea anemons (۳) | Sea rays (۲) | Sea urchins (۱) |
|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|
- ۳۴ در کدام ماهی لایه درمیس از اپیدرمیس نازک‌تر است؟
- (۱) کوسه ماهی
 - (۲) هاگ فیش
 - (۳) لامپری
 - (۴) ماهی خاویاری
- ۳۵ جلبک‌های مرجانی (*Coralline algae*) به کدام گروه از جلبک‌ها تعلق دارند؟
- (۱) سبز - آبی
 - (۲) قرمز
 - (۳) قهوه‌ای
 - (۴) سبز - آبی
- ۳۶ در کدام ساحل جزر و مدی، پدیده تکه‌ای بودن (*Patchiness*) پررنگ‌تر است؟
- (۱) گلی
 - (۲) صخره‌ای
 - (۳) شنی در معرض
 - (۴) شنی محافظت شده
- ۳۷ مرحله لاروی کرم‌های حلقوی کدام است؟
- | | |
|----------------|--------------|
| Bipinnaria (۲) | Veliger (۱) |
| Trochophor (۴) | Nauplius (۳) |
- ۳۸ جانداران مرو ابی‌پلازما هستند که خود را در منطقه ابی‌پلازما می‌گذرانند.
- (۱) پلانکتون‌هایی - بخشی از زندگی
 - (۲) نکتون‌هایی - تمام دوران زندگی
 - (۳) پلانکتون‌هایی - تمام دوران زندگی
 - (۴) نکتون‌هایی - بخشی از زندگی
- ۳۹ کدام جانوران به ترتیب اسکلت آهکی و سیلیسی دارند؟
- (۱) خاریوستان و شعاعیان
 - (۲) دیاتومه‌ها و شعاعیان
 - (۳) شعاعیان و روزندران
 - (۴) نرم‌تنان و روزندران
- ۴۰ تعیین جنسیت در لاکپشت‌های دریابی چگونه صورت می‌گیرد؟
- (۱) تعداد کروموزوم‌های جنسی X
 - (۲) در هنگام لقاح و به طور کاملاً تصادفی
 - (۳) تحت تأثیر دمای محیط
 - (۴) وجود یا عدم وجود کروموزوم جنسی Y
- ۴۱ کدام گروه در تشکیل رسوبات سیلیسی کف دریا نقش مهمی دارند؟
- (۱) مژه‌داران
 - (۲) فورامینیفرا
 - (۳) کوکولیتوفورا
 - (۴) رادیولاریا
- ۴۲ کدام یک به طور کامل تطبیق‌دهنده اسمزی (*Osmoconformer*) است؟
- (۱) کرم پرتار
 - (۲) خرچنگ
 - (۳) ماهی سالمون
 - (۴) مارماهی آب شیرین
- ۴۳ کدام نوع از انواع مصب‌ها حاصل عقب‌نشینی یخچال‌ها است؟
- | | |
|---------------------------|---------------|
| Tectonic (۲) | Fjord (۱) |
| Drowned river valleys (۴) | Bar-built (۳) |
- ۴۴ در پایین‌تر از عمق جبرانی (**Compensation depth**) ...
- (۱) تنفس انجام نمی‌شود.
 - (۲) فتوسنتر انجام نمی‌شود.
 - (۳) فتوسنتر انجام می‌شود.
 - (۴) تنفس با فتوسنتر برابر است.

- ۴۵- در کلپ وظیفه **Pneumatocyst** کدام است؟

- (۱) اتصال stipe به blade
- (۲) شناور کردن برگ گیاه روی سطح آب
- (۳) ذخیره مواد مغذی برای گیاه
- (۴) ذخیره اکسیژن برای گیاه در موقع کمبود اکسیژن

- ۴۶- لایه توموکلاین در کدام فصل به سطح آب نزدیک‌تر است؟

- (۱) بهار
- (۲) تابستان
- (۳) پاییز
- (۴) زمستان

- ۴۷- غذای اصلی فک دریای خزر کدام است؟

- (۱) ماهی آزاد دریای خزر
- (۲) کیلکای چشم درشت
- (۳) گونه‌های کیکا
- (۴) بچه ماهی سفید

- ۴۸- محل اصلی تبادل گازهای تنفسی در ماهیان کدام است؟

- (۱) کمان آبشی (Gill arch)
- (۲) رشته‌های آبشی (filaments)
- (۳) خارهای آبشی (Gill Rakers)
- (۴) تیغه‌های آبشی (Lemalla)

- ۴۹- عامل اصلی پراکنش جانداران در حد بالایی بین جزر و مدی کدام است؟

- (۱) رقابت
- (۲) شکارگری
- (۳) فاکتورهای فیزیکی
- (۴) استقرار لاروها

- ۵۰- پدیده **Schooling**، به کدام مورد اطلاق می‌شود؟

- (۱) مهاجرت عمودی آبزیان جهت تغذیه
- (۲) پراکنش افقی و توده‌ای منظم آبزیان

جانورشناسی دریا:

- ۵۱- در کدام رده از اسفنجهای شبکه **Trabecular** وجود دارد؟

- Demospongia (۲)
- Sclerospongia (۴)
- Hexactinellida (۱)
- Calcarea (۳)

- ۵۲- کدام مورد از رده **Hexactinellida** است؟

- Spongilla (۲)
- Leucosolenia (۴)
- Grantia (۱)
- Euplectella (۳)

- ۵۳- لارو **Cydippid**، مربوط به کدامیک از شاخه‌های جانوری است؟

- Cnidaria (۲)
- Ctenophora (۱)
- Platyhelminthes (۴)
- Porifera (۳)

- ۵۴- کدام ویژگی کپلک‌های خونی **Schistosoma** را از سایر کپلک‌ها جدا می‌کند؟

- (۱) جدا جنس و دارای روده تک شاخه
- (۲) هرمافروdit و دارای روده دو شاخه
- (۳) هرمافروdit و دارای روده سه شاخه
- (۴) جدا جنس و دارای روده دو شاخه

- ۵۵- کدام گزینه متمایزکننده کرم‌های حلقوی پر تار و کم تار از یکدیگر است؟

- (۱) ساختار بندبندی در کم تاران کاهش یافته است.
- (۲) کرم‌های حلقوی پر تار ساکن دریا و کرم‌های کم تار ساکن خشکی هستند.
- (۳) ساختار تولیدمثلی در پر تاران موقتی، ولی در کم تاران دائمی است.

- ۵۶- در بی‌مهرگان **Peristalsis** معرف کدام است؟

- (۱) نوعی آنزیم گوارشی
- (۲) شکلی از تولیدمثل
- (۳) مکانیزم تغذیه‌ای
- (۴) نوعی حرکت

-۵۷- کدام‌یک نام علمی نوعی گریل (krill) است؟

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Euphausia superba</i> (۲) | <i>Acartia tonsa</i> (۱) |
| <i>Calanus finmarchicus</i> (۴) | <i>Eucalanus ensis</i> (۳) |

-۵۸- کدام‌یک در مرحله لاروی به زرهداران شباهت ظاهری دارد؟

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| <i>Decapoda</i> (۲) | <i>Cirripedia</i> (۱) |
| <i>Stomatopoda</i> (۴) | <i>Copepoda</i> (۳) |

-۵۹- مغز در کدام گروه از دهان ثانویان از بین رفته است؟

- | | |
|--|--------------------------------------|
| (۲) میکرین‌ها (Myxine) | (۱) آب‌فشان‌های دریابی (Asciidiacea) |
| (۴) دوزیستان بی‌دست و پا (Gymnophiona) | (۳) خارپوستان (Echinodermata) |

-۶۰- در مورد **Siphuncle**، کدام‌یک صحیح است؟

- | |
|--|
| (۱) بخش کوچک باقی‌مانده از صدف سرپایان در اسکوئیدها است. |
| (۲) محفظه‌های گاز می‌پاشد که در بدن سرپایان دیده می‌شود. |
| (۳) ساختار لوله مانندی که در ناحیه شکمی سرپایان وجود دارد. |
| (۴) بافت‌های زنده رابط محفظه‌های صدف سرپایان است. |

-۶۱- کدام‌یک در مورد دستگاه گردش خون کیتون‌ها صحیح است؟

- | |
|--|
| (۱) قلب در ناحیه شکمی قرار گرفته و خون را به دو سمت بدن پمپ می‌کند. |
| (۲) قلب در قسمت خلفی بدن قرار دارد و خون را به سمت جلوی بدن پمپ می‌کند. |
| (۳) قلب در ناحیه قدامی بدن قرار دارد و خون را به سمت عقب بدن پمپ می‌کند. |
| (۴) قلب در ناحیه پشتی بدن قرار دارد و خون را به دو سمت بدن پمپ می‌کند. |

-۶۲- تکوین از تخم به نوزاد در کدام نرم‌تن به‌طور مستقیم (بدون مرحله لاروی) طی می‌شود؟

- (۱) Bivalvia

- (۲) Pulmonata

- (۳) Scaphopoda

- (۴) Opisthobranchia

-۶۳- خرگوش دریابی به کدام گروه تعلق دارد؟

- | |
|----------------------|
| (۱) سرپایان |
| (۲) شانه‌داران |
| (۳) برهنه آبششان |
| (۴) شفایق‌های دریابی |

-۶۴- پیشرفت‌های ترین گروه از بی‌مهرگان دریابی از نظر «سیستم عصبی» کدام است؟

- | | |
|-------------------|--------------|
| (۱) Cephalopoda | (۲) Annelida |
| (۳) Echinodermata | (۴) Nematoda |

-۶۵- در کدام گروه از خارپوستان پدیسلازیا و مخرج وجود ندارد و شیارهای آمبولاکرال بسته است؟

- | |
|-------------------|
| (۱) ستاره شکننده |
| (۲) توقیای دریابی |
| (۳) ستاره دریابی |
| (۴) دلار ماسه‌ای |

-۶۶- اسیدین بالغ دارای کدام خصوصیت طنابداران است؟

- | |
|---------------------------|
| (۱) دم پس مخرجی |
| (۲) ستون مهره‌ها |
| (۳) طناب عصبی توخالی پشتی |

- ۶۷- سلول‌های تشکیل‌دهنده دستگاه دفعی آمفيوكسوس چه نام دارد؟
- (۱) نفریدیوم
 (۲) کولنسیت
 (۳) پودوسيت
 (۴) سولنوسيت
- ۶۸- کدام خانواده از کوسه ماهیان بیشترین تنوع گونه‌ای را در خلیج فارس دارد؟
- Lamnidae (۲)
 Sphyraenidae (۴)
 Carcharhinidae (۱)
 Hemiscylliidae (۳)
- ۶۹- نوع حرکت پدالی (*Paddling*) در کدام گروه از موجودات دیده می‌شود؟
- (۱) اسکوئیدها
 (۲) پنگوئن‌ها
 (۳) نهنگ‌ها و دلفین‌ها
 (۴) فک‌ها
- ۷۰- کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد *Blubber*، صحیح است؟
- (۱) چربی موجود در کبد کوسه ماهیان جهت شناوری آن‌ها
 (۲) قطرات چربی موجود در فیتوپلانکتون‌ها به منظور شناوری آن‌ها
 (۳) کیسه‌های هوایی پرنده‌گان غواص دریایی به منظور غوص کردن و شناوری آن‌ها زیر آب
 (۴) لایه چربی دور بدن پستانداران دریایی جهت شناوری و حفاظت آن‌ها

بوم‌شناسی پیشرفت‌هه دریا:

- ۷۱- در کدام یک از مناطق دریا به ترتیب تولید اولیه و نوسانات شرایط محیطی بیشتر است؟ (از راست به چپ)
- Intertidal – Neritic (۲)
 Subtidal – Neritic (۴)
 Intertidal – Oceanic (۱)
 Subtidal – Oceanic (۳)
- ۷۲- در خلیج فارس جزر و مد است و در سواحل ایرانی آن نسبت به تنگه هرمز رخ می‌دهند.
- (۱) ترکیبی - با تأخیر (۲) روزانه - با تأخیر (۳) ترکیبی - زودتر (۴) روزانه - زودتر
- ۷۳- جنس *Balanus* متعلق به سواحل بوده و از نظر تغذیه‌ای هستند.
- (۱) سنگی - Deposit feeder (۲)
 (۳) ماسه‌ای - Deposit feeder
 Filter feeder (۱)
 Filter feeder (۳)
- ۷۴- در چرخش اکمن (*Ekman spiral*) کدام خصوصیت جریان آب با افزایش عمق تغییر می‌کند؟
- (۱) جهت جریان (۲) سرعت جریان (۳) جهت و سرعت جریان (۴) چگالی جریان
- ۷۵- در سواحل صخره‌ای (نسبت به سواحل ماسه‌ای)
- (۱) پایداری بستر کمتر است.
 (۲) جانوران حفار در تمامی لایه‌ها گسترش یافته‌اند.
 (۳) موجودات چسبنده (Sessile) دیده نمی‌شوند.
 (۴) خطر خشک‌شدنی موجودات وجود دارد.
- ۷۶- منطقه‌بندی (*Zonation*) در کدام یک کمتر قابل رویت است؟
- Muddy shores (۴) Sandy shores (۳) Sea walls (۲) Rocky shores (۱)
- ۷۷- ترکیبات اصلی رسوبات زیستی (*Ooze*) در دریاها سیلیکات و است که عمدتاً از گروه نشأت می‌گیرند.
- (۱) کربنات کلسیم - فورامینیفرها
 (۲) کربنات سدیم - فورامینیفرها
 (۳) کربنات کلسیم - دیاتومه‌ها
 (۴) کربنات سدیم - دیاتومه‌ها

- ۷۸- در مناطق مصبی که جریان‌های رودخانه‌ای نسبت به کشندها قوی باشد، به ترتیب چه نوع مصبی و با چه خصوصیتی دیده می‌شود؟
- (۱) Well - mixed، هالوکلاین قوی
 - (۲) Salt - wedge، هالوکلاین قوی
 - (۳) Well - mixed، هالوکلاین ضعیف
 - (۴) Salt - wedge، هالوکلاین ضعیف
- ۷۹- همه موارد زیر، تأثیر زیادی بر مهاجرت عمودی روزانه زئوبلانکتون‌ها دارند، به جز:
- (۱) ذخیره و حفظ انرژی
 - (۲) فرار از شکارچی
 - (۳) سرد و گرم شدن آب
 - (۴) تغابش معکوس به شدت نور و UV
- ۸۰- حداقل تولیدات اولیه در آب‌های اقیانوسی جهان در مناطق معتدله چه زمانی از سال اتفاق می‌افتد؟
- (۱) بهار
 - (۲) زمستان
 - (۳) تابستان
 - (۴) بهار و پاییز
- ۸۱- میزان اکسیژن در کدام یک از مناطق محدودتر است؟
- (۱) سواحل ماسه‌ای
 - (۲) سواحل گلی
 - (۳) سواحل صخره‌ای
 - (۴) سواحل قلوه‌سنگی
- ۸۲- پیچیدگی زیستگاه (**Habitat complexity**) در کدام بسترها بیشتر است؟
- (۱) گلی ماسه‌ای
 - (۲) ماسه‌ای
 - (۳) صخره‌ای
 - (۴) گلی
- ۸۳- چشم ماهیان در کدام منطقه درشت‌تر است؟
- (۱) Epipelagic
 - (۲) Mesopelagic
 - (۳) Bathypelagic
 - (۴) Abysopelagic
- ۸۴- کدام گروه در بخش‌های صخره‌ای جزر و مدی کمتر دیده می‌شود؟
- (۱) Grazers
 - (۲) Filter feeders
 - (۳) Deposit feeders
 - (۴) Predators
- ۸۵- جنگل‌های حرا عمدتاً در مناطق گسترش یافته‌اند و بیشترین وابستگی را به دارند.
- (۱) گرم و مرطوب - جریانات جزر و مدی و شوری آب
 - (۲) معتدله و مرطوب - جریانات جزر و مدی و شوری آب
 - (۳) گرم و مرطوب - اکسیژن محلول آب و امواج
 - (۴) معتدله و مرطوب - اکسیژن محلول آب و امواج
- ۸۶- کدام گزینه در مورد مرجان‌های هرماتیپیک (**Hermatypic**) صحیح می‌باشد؟
- (۱) بیشتر در اعماق یافت می‌شوند.
 - (۲) تنها در مناطق با دمای پایین دیده می‌شوند.
 - (۳) دارای اسکلت نرم و قابل انعطاف هستند.
 - (۴) عمدتاً دارای همزیست زوگزانتلا هستند.
- ۸۷- همه عبارت‌های زیر در مورد **Hydrothermal vent** اعمق اقیانوس‌ها صحیح‌اند، به جز:
- (۱) حیات در اطراف آنها موقتی است.
 - (۲) ماهیان، موجودات غالب این منطقه می‌باشند.
 - (۳) موجودات گرمادوست در اطراف آنها دیده می‌شوند.
 - (۴) منبع اصلی تأمین انرژی در آنها باکتری‌های شیمیوسنتزکننده هستند.
- ۸۸- جلبک‌های جایگاه‌دار (**Periphyton**)، جوامع ریزگیاهی هستند که
- (۱) گسترش عمقی آنها به نور مرتبط است.
 - (۲) دارای واکوئل‌های هوایی متعدد هستند.
 - (۳) به صورت آزاد در توده آب شناورند.
 - (۴) فشار هیدرواستاتیک آب، عامل محدودکننده گسترش عمقی آنهاست.

- ۸۹- برای نمونه‌برداری از موجودات بستر دریا همه موارد زیر مناسبند، به جز:
- | | | | |
|----------|---------|-----------|------------|
| Grab (۴) | CTD (۳) | Corer (۲) | Dredge (۱) |
|----------|---------|-----------|------------|
- ۹۰- کدام مورد باعث از بین رفتن مرجان‌ها نمی‌شود؟
- (۱) دهیدراته شدن (۲) امواج متوسط (۳) کدورت
- ۹۱- هدایت امواج صوتی در کدام محیط‌های آبی بیشتر است؟
- (۱) آب‌های شیرین (۲) آب‌های لب‌شور (۳) آب‌های شور
- ۹۲- ایزوتوب‌های پایدار عناصر نیتروژن ($\delta^{15}\text{N}$) و کربن ($\delta^{13}\text{C}$) به ترتیب چه کاربردهایی در مطالعات اکوسیستم‌های دریایی دارند؟
- (۱) تعیین سطوح غذایی آبیان یک چرخه غذایی - تعیین منابع اولیه غذایی در یک اکوسیستم
(۲) تعیین منابع اولیه غذایی در یک اکوسیستم - تعیین سطوح غذایی آبیان یک چرخه غذایی
(۳) تعیین سن آبیان - بازسازی شرایط اکولوژیکی گذشته (مانند دما و شوری)
(۴) بازسازی شرایط اکولوژیکی گذشته (مانند دما و شوری) - بررسی نقش آلاینده‌ها در یک اکوسیستم
- ۹۳- کدام گونه جزو گونه‌های مهاجم (Invasive species) به آب‌های خلیج فارس و دریای عمان در سال‌های اخیر محسوب می‌شود؟
- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| <i>Rastrelliger Kanagurta</i> (۲) | <i>Acartiella faoensis</i> (۱) |
| <i>Cochlodinium polykrikoides</i> (۴) | <i>Mnemiopsis leidyi</i> (۳) |
- ۹۴- تغییرات زمانی فسفر در دریاها بیشتر وابسته به کدام مورد است؟
- (۱) فراوانی بنتورها (۲) درجه قلیایی آب‌ها (۳) غلظت دی‌اکسید کربن (۴) فعالیت‌های بیولوژیک
- ۹۵- گونه‌های صیاد کلیدی (Keystone predators) گونه‌های هستند که
- (۱) فراوانی کم و اثر آنها بر جامعه زیاد است.
(۲) اثر آنها بر جامعه خیلی بیشتر از فراوانی نسبی آنهاست.
(۳) فراوانی نسبی آنها در یک جامعه بیشتر از اثر آنهاست.
(۴) هم فراوانی نسبی آنها و هم اثر آنها بر جامعه زیاد است.
- ۹۶- همه موارد زیر جزو استراتژی‌های گونه مانگرو *Avicenia marina* برای مقابله با استرس شوری بالا می‌باشد، به جز:
- (۱) ممانعت از ورود نمک از طریق ریشه‌ها (Exclusion)
(۲) تجمع نمک در برگ‌های قدیمی (Accumulation)
(۳) تبدیل کلرید سدیم به هیپوکلرید سدیم در برگ‌ها (Conversion)
(۴) ترشح نمک اضافه از طریق برگ‌ها به خارج (Secretion)
- ۹۷- مهم‌ترین عامل در ایجاد پدیده سفیدشدنگی مرجان‌ها (Coral bleaching) کدام است؟
- (۱) بیماری‌ها (۲) تغییرات شوری (۳) اسیدی شدن آب‌ها (۴) افزایش دما
- ۹۸- تعداد سطوح تغذیه‌ای (Trophic levels) در کدام یک کمتر است؟
- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| <i>Upwelling zone</i> (۲) | <i>Central gyres</i> (۱) |
| <i>Oligotrophic lakes</i> (۴) | <i>Open ocean</i> (۳) |

- ۹۹- کدام مورد ترتیب شکل‌گیری صخرهٔ مرجانی را به درستی بیان می‌کند؟
- (۱) آتول، حاشیه‌ای، سدی
(۲) سدی، حاشیه‌ای، آتول
(۳) حاشیه‌ای، سدی، آتول
(۴) سدی، آتول، حاشیه‌ای
- ۱۰۰- معمولاً بیشترین تنوع گونه‌ای در چه حالتی از میزان آشفتگی (**Disturbance**) رخ می‌دهد؟
- (۱) حالت متوسط آشفتگی
(۲) حالت شدید آشفتگی
(۳) حالت ضعیف آشفتگی
(۴) ابتدا حالت شدید آشفتگی و سپس حالت ضعیف آشفتگی

