

۱۷۸
F



نام:

نام خانوادگی:

محل امضا:

صبح جمعه
۱۳۹۵/۱۲/۶
دفترچه شماره (۱)



«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.»
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمترکز) داخل – سال ۱۳۹۶

رشته امتحانی علوم و مهندسی آب – هواسنایی کشاورزی (کد – ۲۴۳۰)

مدت پاسخگویی: ۱۲۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۸۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی (ریاضیات (۱,۲,۳) – آمار و احتمالات – اقتصادشناسی در کشاورزی – هیدرولیک و متئورولوژی)	۸۰	۱	۸۰

این آزمون نمره منفی دارد.
استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

اسفندماه – سال ۱۳۹۵

حل چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و ...) پس از برگزاری آزمون، برای تعلیمی اشخاص حلقه‌ی حقوقی تهبا با مجوز این سازمان مجاز نیاشد و با تنگلینین بایر مقررات رفتار می شود.

ریاضیات (۱،۲،۳)

- ۱- اگر تابع $f(x) = \frac{2x-1}{2-x}$ به صورت مجموع یک تابع فرد و یک تابع زوج نوشته شود، مقدار تابع فرد به ازای $x = 5$ ، کدام است؟
- (۱) $\frac{2}{3}$
 (۲) $\frac{4}{3}$
 (۳) $-\frac{4}{7}$
 (۴) $-\frac{5}{7}$
- ۲- حاصل حد تابع $\left(\sqrt[4]{\sin(x + \frac{\pi}{4})}\right)^{\cot x}$ وقتی $x \rightarrow 0$ کدام است؟
- (۱) ۱
 (۲) e
 (۳) $\frac{1}{e}$
 (۴) $\sqrt{2}e$
- ۳- میزان تغییرات $\frac{x}{1-x}$ نسبت به تغییر $\sqrt{x^2 + 16}$ در نقطه $x = 3$ ، کدام است؟
- (۱) $\frac{1}{2}$
 (۲) $\frac{1}{6}$
 (۳) $\frac{1}{8}$
 (۴) $\frac{2}{3}$
- ۴- یکی از ریشه‌های سوم عدد مختلط $z = \frac{8+4i}{1+3i}$ به صورت $r(\cos\theta + i\sin\theta)$ است. دوتایی مرتب (r, θ) کدام است؟
- (۱) $(2, \frac{5\pi}{6})$
 (۲) $(2, \frac{23\pi}{12})$
 (۳) $(\sqrt{2}, \frac{7\pi}{12})$
 (۴) $(\sqrt{2}, \frac{5\pi}{12})$

- ۵ برای مقادیر $2 < x < \infty$ در بسط تیلور تابع $f(x) = \ln x$ بر حسب توان‌های صعودی $(x-1)$ ، ضریب x^5 کدام است؟

$$\frac{1}{5} \quad (1)$$

$$\frac{1}{6} \quad (2)$$

$$-\frac{1}{5} \quad (3)$$

$$-\frac{1}{6} \quad (4)$$

- ۶ حاصل $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x \sin x - x - x^2}{x^2}$ کدام است؟

$$\frac{1}{2} \quad (1)$$

$$\frac{1}{3} \quad (2)$$

$$\frac{1}{6} \quad (3)$$

$$\frac{5}{6} \quad (4)$$

- ۷ مشتق تابع $y = \tan h x = \frac{1}{2} \ln 2$ به ازای $x = 1$ برابر کدام است؟

$$\frac{2}{3} \quad (1)$$

$$\frac{4}{3} \quad (2)$$

$$\frac{5}{9} \quad (3)$$

$$\frac{8}{9} \quad (4)$$

- ۸ مساحت ناحیه محدود به منحنی $y = \frac{1}{(x+2)\sqrt{x+1}}$ محور x ها و خطوط قائم $x = 0$ و $x = 2$ کدام است؟

$$\frac{\pi}{3} \quad (1)$$

$$\frac{\pi}{4} \quad (2)$$

$$\frac{\pi}{6} \quad (3)$$

$$\frac{\pi}{12} \quad (4)$$

-۹ طول قوس منحنی C با معادلات پارامتری $x = \sqrt{3}t^2$ و $y = t - t^3$ بین دو نقطه نظیر $t = -1$ و $t = 1$ کدام است؟

- (۱) ۴
- (۲) ۳
- (۳) $2\sqrt{3}$
- (۴) ۲

-۱۰ مساحت ناحیه محدود به منحنی $x = 4y^2$ و خط قائم $x = 1$ را حول محور $y = -2$ دوران می‌دهیم. حجم جسم حاصل کدام است؟

- (۱) $\frac{14\pi}{3}$
- (۲) $\frac{16\pi}{3}$
- (۳) $\frac{28\pi}{3}$
- (۴) $\frac{32\pi}{3}$

-۱۱ اگر $P = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ و $A = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$ باشند، ماتریس PAP^t کدام است؟

$$\begin{bmatrix} -4 & 1 \\ -2 & 5 \end{bmatrix} \quad (۱)$$

$$\begin{bmatrix} -5 & -1 \\ 3 & 3 \end{bmatrix} \quad (۲)$$

$$\begin{bmatrix} -5 & -2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \quad (۳)$$

$$\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ -1 & -5 \end{bmatrix} \quad (۴)$$

-۱۲ اگر نقطه $A(4, 3, 5)$ رأس یک مکعبی باشد که یک وجه آن بر صفحه به معادله $3x - 2y + 6z = 1$ منطبق است. آنگاه حجم این مکعب کدام است؟

- (۱) ۲۷
- (۲) ۶۴
- (۳) ۱۲۵
- (۴) ۱۴۴

- ۱۳ مشتق سویی (جهتی) تابع $f(x,y,z) = x^2y^2z^2$ در نقطه $(1,1,-1)$ در امتداد خط مماس بر منحنی $(x = e^t, y = 2\sin t + 1, z = 2t - \cos t)$ در نقطه نظری $t = 0$ کدام است؟

۱ (۱)
۲ (۲)
 $\frac{2}{3}$ (۳)
 $\frac{4}{3}$ (۴)

- ۱۴ اگر $x = uv$ و $y = \frac{u+v}{u-v}$ باشند، حاصل $\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}$ کدام است؟

$\frac{(u-v)^2}{4uv}$ (۱)
 $\frac{(u+v)^2}{4uv}$ (۲)
 $\frac{4uv}{(u-v)^2}$ (۳)
 $\frac{4uv}{(u+v)^2}$ (۴)

- ۱۵ اگر $R = |\vec{r}|$ و $\vec{r} = xi + yj + zk$ آنگاه دیورژانس $\frac{\vec{r}}{R}$ کدام است؟

$-2R^{-1}$ (۱)
 R^{-1} (۲)
صفر (۳)
 $2R^{-1}$ (۴)

- ۱۶ معادله خط مماس بر منحنی C فصل مشترک رویه $z = x^2 + y^2 - 5$ و صفحه $2x + y - z = 0$ در نقطه $(1,3,5)$ کدام است؟

$z = 5$ و $y = x + 2$ (۱)
 $z = 2x + 3$ و $y = 3$ (۲)
 $z = x + 4 = y + 1$ (۳)
 $x = 1$ و $z = 2y - 1$ (۴)

- ۱۷ سطح قسمتی از سهمنی گون $z = x^2 + y^2$ واقع در زیر صفحه $z = 1$ کدام است؟

$\frac{\pi}{3}(3\sqrt{5} - 2)$ (۱)
 $\frac{\pi}{3}(5\sqrt{5} - 2)$ (۲)
 $\frac{\pi}{6}(3\sqrt{5} - 1)$ (۳)
 $\frac{\pi}{6}(5\sqrt{5} - 1)$ (۴)

-۱۸- فاصله مرکز ثقل جسم همگن محدود به رویه $z = 4 - x^2 - y^2$ و صفحه $z = 0$ از صفحه xoy ، کدام است؟

- $\frac{3}{2}$ (۱)
 $\frac{4}{3}$ (۲)
 $\frac{2}{3}$ (۳)
 $\frac{3}{4}$ (۴)

-۱۹- عامل انتگرال‌ساز معادله دیفرانسیل $(y - 2x^3)dx - x(1 - xy)dy = 0$ ، کدام است؟

- $\frac{1}{x^2}$ (۱)
 $\frac{1}{x}$ (۲)
 $\frac{1}{y}$ (۳)
 $\frac{1}{xy}$ (۴)

-۲۰- یکی از منحنی‌های جواب معادله دیفرانسیل $x^2y'' - 2y = 0$ از دو نقطه $(1, 0)$ و $(-1, 0)$ می‌گذرد، این منحنی خط $x = 2$ را با کدام عرض قطع می‌کند؟

- $\frac{4}{3}$ (۱)
 $\frac{7}{2}$ (۲)
 3 (۳)
 $\frac{5}{2}$ (۴)

آمار و احتمالات:

-۲۱- اگر $x_1 = -2$ ، $x_2 = 1$ ، $x_3 = 3$ باشد، مقدار عددی رابطه $\sum(x_i)(x_i^2 - 3)$ برابر کدام است؟

- ۱۰ (۱)
۱۲ (۲)
۱۴ (۳)
۱۸ (۴)

- ۲۲- در یک منطقه 6° درصد روزها دمای هوا بالای صفر درجه سانتی‌گراد است و برای چنین روزهایی احتمال بارندگی $3/0^{\circ}$ است، اما اگر دمای هوا زیر صفر درجه سانتی‌گراد باشد، احتمال بارندگی به $5/0^{\circ}$ افزایش می‌یابد، در یک روز بارانی در این منطقه، احتمال زیر صفر درجه سانتی‌گراد بودن دمای هوا چقدر است؟

- (۱) $0/4^{\circ}$
- (۲) $0/09^{\circ}$
- (۳) $10/19^{\circ}$
- (۴) $28/46^{\circ}$

- ۲۳- قانون کمترین توان‌های دوم کدام است؟

- (۱) مجموع مربعات خطأ از هر وضعیت دیگری بیشتر است.
- (۲) مجموع خطأ از هر وضعیت دیگری کمتر است.
- (۳) مربع مجموع خطأ از هر وضعیت دیگری کمتر است.
- (۴) مجموع مربعات خطأ از هر وضعیت دیگری کمتر است.

- ۲۴- نسبت بذور آلوده به قارچ در یک گیاه دارویی 2° درصد ادعا شده است. طی آزمایش روی 10° بذر از این گیاه 3° بذر آلوده بود. آیا می‌توان گفت که درصد بذور آلوده بیش از میزان ادعا شده است؟ ($Z = 1/64 = 0.05$)

- (۱) خیر - چون میزان α کمتر از 5° است.
- (۲) بله - چون $|Z|$ محاسبه شده بزرگ‌تر از Z بحرانی است.
- (۳) بله - چون $|Z|$ محاسبه شده کوچک‌تر از Z بحرانی است.
- (۴) خیر - چون $|Z|$ محاسبه شده بزرگ‌تر از Z بحرانی است.

- ۲۵- اگر احتمال پسر در جامعه‌ای $5/0^{\circ}$ باشد. احتمال اینکه از ۴ تولد زنده، ۳ تا پسر باشد، برابر کدام است؟

- (۱) $0/18^{\circ}$
- (۲) $0/25^{\circ}$
- (۳) $0/50^{\circ}$
- (۴) $0/75^{\circ}$

- ۲۶- اگر $y - z = x - z$ باشد، واریانس z کدام است؟

- (۱) مجموع واریانس‌های x و y لا منهای دو برابر کواریانس آنها
- (۲) تفاوت واریانس‌های x و y بهاضافه دو برابر کواریانس آنها
- (۳) تفاوت واریانس‌های x و y لا منهای دو برابر کواریانس آنها
- (۴) مجموع واریانس‌های x و y بهاضافه دو برابر کواریانس آنها

- ۲۷- متغیر تصادفی X دارای توزیع احتمالی به شکل زیر است:

x	۰	۱	۲	۳
$P(X=x)$	۰/۱۵	۰/۲۵	۰/۳۵	۰/۲۵

مقدار مد یا نما کدام است؟

- (۱) ۰
- (۲) ۱
- (۳) ۲
- (۴) ۳

- ۲۸- متغیر تصادفی سود سیب‌کاران دارای میانگین 35° ، میانه 25° و مد 40° میلیون ریال می‌باشد. در آن صورت توزیع سود سیب‌کاران چگونه است؟

- (۱) دارای کشیدگی زیاد
- (۲) دارای کشیدگی کم
- (۳) دارای خمیدگی (چولگی) به سمت راست
- (۴) دارای خمیدگی (چولگی) به سمت چپ

- ۲۹- در تجزیه واریانسی که برای آزمون معنی دار بودن انجام می‌گیرد، یکی از فرض‌های اساسی کدام مورد است؟

- (۱) آثار محیطی و تیمار، افزایشی هستند.
- (۲) آثار محیطی و تیمار، ضرب‌پذیر هستند.
- (۳) اشتباها آزمایشی غیرتصادفی هستند.
- (۴) اشتباها آزمایشی تصادفی هستند که به طور مستقل و نرمال پیرامون میانگین صفر با واریانس غیرمشترک توزیع شده‌اند.

- ۳۰- اگرتابع خطی $f(x) = 2x_1 - 5x_2 + 9x_3$ مفروض باشد، امید ریاضی ($E(x)$) برابر کدام است؟

- (۱) ۵۴
- (۲) ۶۴
- (۳) ۱۱۴
- (۴) ۱۶۴

- ۳۱- در کیسه‌ای ۵ مهره قرمز، ۴ مهره سفید و ۶ مهره سیاه وجود دارد. اگر ۳ مهره به طور تصادفی و بدون جایگذاری از این کیسه انتخاب کنیم، احتمال اینکه یک مهره از هر رنگ انتخاب شده باشد کدام است؟

- (۱) $\frac{3}{14}$
- (۲) $\frac{24}{91}$
- (۳) $\frac{36}{91}$
- (۴) $\frac{120}{182}$

- ۳۲- تعداد ترکیبات ۲ تایی از n مورد برابر ۳۶ است، مقدار n کدام است؟

- ۱۰ (۱)
- ۹ (۲)
- ۸ (۳)
- ۶ (۴)

- ۳۳- سه زوج (زن و مرد) به چند طریق می‌توانند کنار هم روی یک نیمکت بشینند، به شرطی که هر زوج کنار هم باشند؟

- ۶ (۱)
- ۱۲ (۲)
- ۱۵ (۳)
- ۴۸ (۴)

- ۳۴- گزارشی آماری نسبت دانشجویان پذیرفته شده در کنکور دانشکده کشاورزی شیراز را به ترتیب 30 درصد از استان فارس، 20 درصد از استان‌های هم‌جوار و 5 درصد از سایر استان‌ها اعلام نموده است. برای بررسی صحبت گزارش 40 نفر از دانشجویان به حکم قرعه انتخاب شده‌اند و تعداد دانشجویان در گروه‌های فوق به ترتیب 10 ، 10 و 18 نفر بوده است، آیا بر اساس این بررسی می‌توانیم گزارش داده شده را تائید کنیم؟

$$\left(\chi^2_{1,0/05} = 3/84, \chi^2_{2,0/05} = 5/99 \right)$$

- (۱) گزارش با اطمینان 99% رد می‌شود.
- (۲) گزارش داده شده را تأیید می‌کنیم.
- (۳) گزارش داده شده را با 99% اطمینان تأیید می‌کنیم.
- (۴) گزارش را تائید نمی‌کنیم و 95% به قضاوت خود اطمینان داریم.

- ۳۵- از جامعه‌ای نرمال، نمونه‌ای با 12 عضو انتخاب و $\bar{x} = 15$ و $S^2 = 7$ برآورده شده است. برای آزمون فرض $H_0: \sigma^2 = 65$ ، مقدار آماره آزمون با تقریب یک دهم برابر کدام است؟

- ۲۱ (۱)
- ۹ (۲)
- ۱۲ (۳)
- ۱۳ (۴)

- ۳۶- بین مقادیر جدول t و جدول F کدام رابطه موجود است؟

$$\begin{aligned} F_{1-\alpha}(1, df_\gamma) &= t_{\gamma\alpha}^\gamma(df_\gamma) & (1) \\ F_\alpha(df_1, df_\gamma) &= t_{\alpha}^\gamma(df_1) & (2) \\ F_{\gamma\alpha}(1, df_\gamma) &= t_{\alpha}^\gamma(df_\gamma) & (3) \\ F_{1-\alpha}(df_1, 1) &= t_{\alpha}^\gamma(df_\gamma) & (4) \end{aligned}$$

- ۳۷- اگر متوسط درصد روغن و واریانس کلزا براساس ۳۶ نمونه تصادفی به ترتیب برابر ۳۵ و ۹ باشد، حدود اعتماد ۹۹

($Z_{0.01} = 2/33$, $Z_{0.005} = 2/57$) درصد میانگین درصد روغن با تقریب یک هزارم برابر کدام است؟

- (۱) ۳۷/۱۲ تا ۳۲/۱۴
- (۲) ۳۶/۲۹ تا ۳۳/۷۱
- (۳) ۳۶/۱۶ تا ۳۳/۸۳
- (۴) ۳۷/۱۲ تا ۳۴/۶۵

- ۳۸- فرض کنیمتابع چگالی احتمال مشترک دو متغیر X و Y نرمال باشد، در این صورت اگر کواریانس X و Y صفر باشد، کدام مورد درست است؟

- (۱) X و Y مستقل از هم هستند.
- (۲) X و Y می‌توانند مستقل نباشند.
- (۳) ضریب همبستگی X و Y مثبت است.
- (۴) ضریب همبستگی X و Y منفی است.

- ۳۹- در مطالعات همبستگی دو متغیر، سن بوته‌های گلنگ (x) و ارتفاع آنها (y)، اطلاعات زیر به دست آمده است.
ضریب رگرسیون و عرض از مبدأ کدام است؟

$$(n = 5, \sum xy = 448, \sum x^2 = 55, \bar{y} = 24, \bar{x} = 3)$$

- $b = 8/8, a = 2/4$ (۱)
- $b = 9/6, a = 7/2$ (۲)
- $b = 8/8, a = -2/4$ (۳)
- $b = 9/6, a = -7/2$ (۴)

- ۴۰- در روابط رگرسیونی زیر، کدام مورد درست است؟

- (۱) $y + 1/5x = 6$
- (۲) $1/5y = 8 - 2/25x$

- (۱) هم شیب هستند.
- (۲) دو خط هم‌جهت نیستند.
- (۳) شیب ۱ کندر از ۲ است.
- (۴) شیب ۱ تندر از ۲ است.

اقلیم‌شناسی در کشاورزی:

- ۴۱- براساس طبقه‌بندی اقلیمی کوپن (Koppen)، بیشتر مساحت کشور تحت پوشش کدام زوج اقلیمی قرار می‌گیرد؟

CS , CW (۲)

BS , CW (۱)

BS , BW (۴)

CS , DF (۳)

- ۴۲- کدام مورد درباره فرایند فتوستنتز و عوامل خرد اقلیمی مؤثر بر آن درست است؟

- (۱) تلاطم (Turbulence) و سرعت باد تأثیری بر شدت فتوستنتز ندارند.
- (۲) راندمان (کارابی) فرایند فتوستنتز در شدت تابش کم، بیشتر است.
- (۳) با افزایش شدت تابش، فتوستنتز هم متناظر آغازیش می‌باید.
- (۴) معمولاً در اواسط روز بهدلیل اثر دما فتوستنتز به سرعت افزایش می‌باید.

- ۴۳- اگر یک گیاه روز بلند را به عرض‌های جغرافیایی بالاتر منتقل کنیم، کدام مورد درست است؟

- (۱) نمود آن تسريع شده و عملکرد آن افزایش می‌باید.
- (۲) نمود گیاه و عملکرد آن به دلیل کاهش دما، افزایش می‌باید.
- (۳) نمود گیاه بهدلیل تغییر ساعت آفتابی کاهش یافته و عملکرد بیشتر می‌شود.
- (۴) نمود آن بهدلیل تأثیر فوتوریود دچار تأخیر و عملکرد آن افزایش می‌باید.

- ۴۴- معادله هارمونیک برآش یافته بر سری اقلیمی متوسط ماهانه دمای هوا به صورت $y = 15 + 12,5 \cos(6\pi t - 2)$

به دست آمده است. متوسط دما، نیم‌دامنه فراوانی و زاویه جایی به ترتیب از راست به چپ کدام مورد می‌باشد؟

- (۱) ۱۲,۵-۱۵-۲
- (۲) ۲-۱۲,۵-۱۵
- (۳) ۱۲,۵-۲-۱۵
- (۴) ۲-۱۵-۱۲,۵

- ۴۵- مقدار تبخیر - تعرق پتانسیل و بارش یک ماه معین به ترتیب ۲۵ و ۶۳ میلی‌متر است. اگر ظرفیت نگهداشت آب خاک ۱۵۰ میلی‌متر و رطوبت خاک ماه قبل ۱۲ میلی‌متر باشد، رطوبت خاک و رواناب ماه فعلی به ترتیب چند میلی‌متر است؟

- (۲) ۳۷ - صفر
- (۳) ۷۸ - ۱۲
- (۴) ۵۱ - ۷۵
- (۵) ۵۰ - صفر

- ۴۶- کدام مورد جزء کاربردهای شاخص هلیوترومال در اقلیم‌شناسی کشاورزی نیست؟

- (۱) تعیین نیاز نوری محصول
- (۲) تعیین فنولوزی محصول
- (۳) تعیین ترخ نمو محصول
- (۴) ارزیابی کیفیت محصول

- ۴۷- مقایسه میانگین بخشی از یک سری اقلیمی با میانگین کل سری با هدف ارزیابی کدام ویژگی سری اقلیمی انجام می‌شود؟

- (۱) تناوب
- (۲) روند
- (۳) همگنی
- (۴) تصادفی بودن

- ۴۸- کدام روش درون‌بابی، وابستگی مکانی داده‌های اقلیمی را در نظر می‌گیرد؟

- (۱) وزنی عکس اضافه
- (۲) کرجینگ
- (۳) رگرسیون
- (۴) اسپلاین

- ۴۹- در اقلیم‌های خشک کدام مورد عموماً درست است؟

- (۱) سرعت باد کمتر - وجود فرارفت رطوبت
- (۲) سرعت باد بیشتر - وجود فرارفت رطوبت
- (۳) کوچک بودن شاخص اقلیمی دمارتن - سرعت باد کمتر
- (۴) عدم وجود فرارفت رطوبت - بزرگ بودن شاخص اقلیمی دمارتن

- ۵۰- در یک ایستگاه هواشناسی، میانگین دمای سالانه 12°C و نرمال بارش 220 mm میلی‌متر است. اگر گرادیان قائم دما و بارندگی به ترتیب $\frac{5}{\text{km}}$ و $\frac{-5^{\circ}\text{C}}{\text{km}}$ باشد، اقلیم ایستگاه فعلی و ایستگاهی به ارتفاع 1000 m بالاتر به ترتیب طبق شاخص دمارتن کدام است؟
- (۱) نیمه خشک - نیمه خشک
 (۲) نیمه خشک - مدیترانه‌ای
 (۳) خشک - نیمه مرطوب
 (۴) خشک - مدیترانه‌ای
- ۵۱- ضریب تغییرات بارندگی سالانه در مناطق ساحلی خزر و مناطق کویر مرکزی حدوداً به ترتیب از راست به چپ کدام مورد می‌باشد؟
- (۱) $125-10$
 (۲) $60-20$
 (۳) $117-35$
 (۴) $90-60$
- ۵۲- متوسط تعداد سیستم‌های کم فشار باران‌زاibi که در طی سال کشور ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهند، حدوداً چقدر است؟
- (۱) 30
 (۲) 42
 (۳) 55
 (۴) 72
- ۵۳- در طبقه‌بندی سیلیانینوف (selianinov) چه عواملی دخالت دارند؟
- (۱) میانگین بارش سالانه، جمع درجه روزهای بیشتر از 10°C سانتی‌گراد
 (۲) میانگین بارش سالانه، جمع درجه روزهای بیشتر از صفر درجه سانتی‌گراد
 (۳) میانگین بارش فصل رشد، جمع درجه روزهای بیشتر از 5°C صفر درجه سانتی‌گراد فصل رشد
 (۴) میانگین بارش فصل رشد، جمع درجه روزهای بیشتر از 10°C درجه سانتی‌گراد فصل رشد
- ۵۴- در یک ایستگاه که رژیم بارش آن زمستانه است، متوسط بارش 250 mm میلی‌متر و نرمال دمای سالانه 14°C درجه سانتی‌گراد است. کدام مورد اقلیم این ایستگاه در سیستم کوین است؟
- (۱) BW
 (۲) BS
 (۳) Cw
 (۴) Cs
- ۵۵- ضریب کسر ترمیک (Xerothermic) یا Xerothermique ماهانه به چه عواملی بستگی دارد؟
- (۱) مقدار بارندگی، حداکثر رطوبت نسبی، تعداد روزهای خشک
 (۲) مقدار بارندگی در ماه، متوسط رطوبت نسبی، تعداد روزهای خشک
 (۳) مقدار بارش ماهانه، حداقل رطوبت نسبی ماهانه، تعداد روزهای خشک
 (۴) تعداد روزهای بارانی، متوسط رطوبت نسبی، تعداد روزهای همراه با شبیم
- ۵۶- در فرمول شاخص طبقه‌بندی دمارتن گسترش یافته (Extended) چه اصلاحی نسبت به شاخص دمارتن انجام شده است؟
- (۱) لحاظ شدن متوسط دمای سردترین ماه سال
 (۲) استفاده از میانگین دمای حداقل مطلق سرزمین ماه سال
 (۳) استفاده از میانگین دمای ماههای فصل زمستان به جای نرمال سالانه
 (۴) استفاده از دمای متوسط سردترین ماه سال به جای نرمال سالانه دما

-۵۷- ارتباط پدیده مهاجرت گیاهان (Plant Migration) با تغییر اقلیم در کدام مورد بهتر بیان می‌شود؟

(۱) تغییر اقلیم موجب کندشدن پدیده مهاجرت گیاهان می‌شود.

(۲) تغییر اقلیم موجب گسترش چنگل‌ها در مناطق کم ارتفاع تر می‌شود.

(۳) تغییر اقلیم موجب افزایش گسترش مکانی گونه‌های غیرچنگلی می‌شود.

(۴) گونه‌های چنگلی با گرمابی‌شدن جهانی در عرض‌های جغرافیایی بالاتری گسترش می‌یابد.

-۵۸- کدام مورد معرف نیاز سرمایی (Chilling Requirement) گیاهان زراعی و باغی است؟

(۱) مجموع واحدهای سرمایی که گیاه در روزهای دوره رکود کامل دریافت می‌کند.

(۲) تعداد ساعتی که گیاه در معرض دمایی معین و کمتر از آن (بالاتر از صفر) باشد.

(۳) تعداد روزهایی که گیاه در آن حداقل یک ساعت دمای کمتر از 6°C دریافت کرده است.

(۴) تعداد روزهایی که گیاه در آن حداقل یک ساعت دمای $7/20^{\circ}\text{C}$ و کمتر دریافت کرده است.

-۵۹- رقم خاصی از یک گیاه در دو منطقه اقلیمی با فتوپریود متفاوت ولی دمای متوسط مشابه کشت شده است. از دیدگاه اقلیم‌شناسی کشاورزی کدام مورد درست است؟

(۱) در منطقه‌ای با فتوپریود کمتر، دمای پایه بیشتر است.

(۲) در منطقه‌ای با فتوپریود کمتر، دمای پایه کمتر است.

(۳) در منطقه با فتوپریود بیشتر، زمان تقویمی طولانی‌تری برای تأمین درجه رشد لازم است.

(۴) در منطقه‌ای با فتوپریود کمتر، زمان تقویمی طولانی‌تری برای تأمین درجه رشد لازم است.

-۶۰- کدام مورد درباره شدت اشباع نوری گیاهان (Saturation Light Intensity) یا SLI درست است؟

(۱) مقدار SLI گیاهان C_3 بیشتر از گیاهان C_4 است.

(۲) مقدار SLI برای تمام گیاه کمتر از تک برگ‌های منفرد است.

(۳) شدت نوری است که در آن فتوسنتز و تنفس با هم برابر می‌شوند.

(۴) سطحی از شدت نور است که در آن میزان فتوسنتز از شدت نور مستقل می‌گردد.

هیدرومیکتونولوژی:

-۶۱- تفاصل بین مقادیر واقعی سری زمانی و مقادیر پیش‌بینی شده یک سری هیدرومیکتونولوژیک چه نامیده می‌شود؟

(۱) باقی مانده

(۲) ضریب تغییرات

(۳) مجموع تغییرات

(۴) مجموع مربعات باقی مانده‌ها

-۶۲- کدام مورد مهم‌ترین عامل هواشناسی در تعیین عامل بیشینه سازی رطوبت رگبار طرح است؟

(۱) دمای هوا

(۲) رطوبت نسبی

(۳) سمت و سرعت باد

(۴) آب قابل بارش

-۶۳- در مدل‌های بارندگی - رواناب حاصل از اصولتابع انتقال (Transfer function) تأخیر زمانی رواناب نسبت به بارندگی در چه حوضه‌هایی دخالت داده می‌شود و این امر باعث چه تغییری بر اساس تعداد نسبت تأخیر زمانی به

انتروال مدل در پیش‌بینی بارندگی می‌شود؟

(۱) بزرگ - کاهش

(۲) بزرگ - افزایش

(۳) کوچک - کاهش

(۴) کوچک - افزایش

- ۶۴- مشخصات رگبارهای شدید بهتر ترتیب از نظر مدت و دوره بازگشت کدام است؟
- (۱) مدت کوتاه - دوره بازگشت کوتاه
 - (۲) مدت طولانی - دوره بازگشت طولانی
 - (۳) مدت طولانی - دوره بازگشت کوتاه
 - (۴) مدت طولانی - دوره بازگشت کوتاه
- ۶۵- در منطقه A متوسط درازمدت حداقل بارش ۲۴ ساعته و انحراف معیار سالانه داده‌های بارش بهتر ترتیب برابر ۱۹ و ۸/۵ میلی‌متر است. این مقادیر در منطقه B به ترتیب ۱۰۰ و ۲۰ میلی‌متر است. کدام مورد درباره عامل فراوانی هرشفليد (km) درست است؟
- (۱) $(km)_A > (km)_B$
 - (۲) $(km)_A = (km)_B$
 - (۳) $(km)_A < (km)_B$
 - (۴) اطلاعات مسأله کافی نیست.
- ۶۶- کدام مورد، معرف هرگونه تغییر کاھشی یا افزایشی در میانگین سری زمانی بارندگی است؟
- (۱) پرش
 - (۲) تناوب
 - (۳) روند
 - (۴) روند و پرش
- ۶۷- کدام شاخص برای پایش خشکسالی‌های هواشناسی در دنیا معتبرتر است؟
- (۱) شاخص دهکها
 - (۲) شاخص درصد نرمال
 - (۳) شاخص بارندگی استاندارد
 - (۴) شاخص بارندگی استاندارد
- ۶۸- عرض Beam را در تابع چه عواملی می‌باشد؟
- (۱) دامنه عمل رادار، شعاع زمین
 - (۲) دامنة عمل رادار، شعاع زمین، زاویه تابش
 - (۳) دامنة عمل رادار، شعاع زمین، فاکتور بازگشت
 - (۴) دامنة عمل رادار، شعاع زمین، زاویه تابش، فاکتور بازگشت
- ۶۹- برمبنای الگوی زمانی توزیع بارش در روش Huff برنامه‌ریزی به موقع برای مقابله با کدام دسته از رگبارها دشوارتر است؟
- (۱) رگبار چارک اول
 - (۲) رگبار چارک دوم
 - (۳) رگبار چارک سوم
 - (۴) رگبار چارک چهارم
- ۷۰- جهت سنجش کدام ویژگی‌های سری زمانی از آزمون‌های Hurst، نقطه بازگشت (Turning point) و ضریب چولگی استفاده می‌شود؟
- (۱) استقلال زمانی، روند زمانی، نرمال بودن
 - (۲) روند زمانی، استقلال زمانی، نرمال بودن
 - (۳) استقلال زمانی، کفايت طول دوره آماری، نرمال بودن
 - (۴) کفايت طول دوره آماری، استقلال زمانی، نرمال بودن
- ۷۱- گرمای ورودی بهمیزان ۸۰۰ کالری بر سانتی‌مترمربع به یک توده برف، ۱۰ سانتی‌متر برف ذوب شده ایجاد کرده است. کیفیت حرارتی برف چند درصد است؟
- (۱) ۸۰
 - (۲) ۹۰
 - (۳) ۹۵
 - (۴) ۱۰۰
- ۷۲- کدام منبع خطای راداری، ناشی از خصوصیات رادار نیست؟
- (۱) دامنه درستی عمل
 - (۲) باند درخشنان
 - (۳) طول موج
 - (۴) عرض بیم

- ۷۳- حداقل بارش محتمل (PMP) از معادله زیر قابل محاسبه است. کدام مورد تکمیل‌کننده معادله و معرف ضریب A است؟

$$PMP = R_c \times A$$

- (۱) نسبت آب قابل بارش رگبار طرح به آب قابل بارش مکان رگبار
- (۲) نسبت آب قابل بارش در مکان انتقال به آب قابل بارش رگبار طرح
- (۳) نسبت آب قابل بارش در مکان رگبار به آب قابل بارش رگبار طرح
- (۴) نسبت آب قابل بارش رگبار طرح به آب قابل بارش در مکان انتقال

- ۷۴- کدام مورد درباره مفهوم منحنی‌های عمق - پهنی - تداوم درست است؟

- (۱) در یک تداوم معین با افزایش مساحت حوضه عمق باران تغییر نمی‌کند.
- (۲) در یک تداوم معین با افزایش مساحت حوضه عمق باران افزایش می‌یابد.
- (۳) در یک تداوم معین با افزایش مساحت حوضه عمق باران کاهش می‌یابد.
- (۴) در یک تداوم معین با افزایش مساحت حوضه عمق باران بسته به وضعیت منحنی، کاهش یا افزایش می‌یابد.

- ۷۵- گرمایش جهانی به طور قطع سبب افزایش و کاهش کدام مؤلفه‌های چرخه هیدرولوژی (به ترتیب) گردیده است؟

- (۱) تبخیر و تعرق پتانسیل - پوشش برفی
- (۲) پوشش برفی - جریان رودخانه
- (۳) تبخیر و تعرق پتانسیل - بارش
- (۴) بارش - پوشش برفی

- ۷۶- فرم و مرتبه معادله سری زمانی $z_t = \phi_1 z_{t-1} + \phi_2 z_{t-2} + \dots + \varepsilon_t$ به ترتیب کدام است؟

- (۱) ۱-MA
- (۲) ۲-AR
- (۳) ۱-AR
- (۴) ۲-MA

- ۷۷- ضریب خودهمبستگی در گام تأخیر یک مدل رواناب $z_t = \phi_1 z_{t-1} + \dots + \phi_{10} z_{t-10} + \varepsilon_t$ چقدر است؟

- (۱) ۰/۳۸
- (۲) ۰/۴۹
- (۳) ۰/۶۲
- (۴) ۰/۷۹

- ۷۸- با افزایش کدام عامل مقدار ذوب برف کاهش می‌یابد؟

- (۱) کیفیت حرارتی برف
- (۲) آلبیدوی برف
- (۳) سن برف
- (۴) هر سه مورد

- ۷۹- پدیده غالب در ایجاد بارندگی یک منطقه کدام است؟

- (۱) برزرون
- (۲) پخش بخار آب
- (۳) رشد استوکاستیک
- (۴) برخورد و ادغام قطرات

- ۸۰- خط برف کوهستان در ارتفاع ۱۴۰۰ متری از سطح دریا واقع شده است. دمای ایستگاه مینا که در ارتفاع ۱۶۰۰ متری از سطح دریا واقع شده است، ۱۰ درجه سانتی گراد است. اگر آهنگ تغییرات دمای هوا ۱۰ درجه سانتی گراد و در هر کیلومتر باشد و ضریب ذوب برف ۴٪ میلی‌متر بر درجه روز باشد، ذوب برف در چه ارتفاعی متوقف می‌شود و مقدار روزانه ذوب برف چقدر خواهد بود؟

- (۱) ۴۸ - ۲۶۰۰
- (۲) ۲۴ - ۲۶۰۰
- (۳) ۸ - ۱۲۰۰
- (۴) ۱۲ - ۱۲۰۰

