

۲۰۴
F



نام:

نام خانوادگی:

محل امضا:



«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.»
امام خمینی (ره)

صبح جمعه
۱۳۹۵/۱۲/۶
دفترچه شماره (۱)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمتری) داخل - سال ۱۳۹۶

رشته امتحانی جراحی دامپزشکی (کد ۲۷۰۱)

مدت پاسخگویی: ۱۲۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۹۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی (اصول جراحی و هوشبری - جراحی عمومی دام‌های بزرگ - جراحی عمومی دام‌های کوچک - بیماری‌های اندام‌های حرکتی - رادیولوژی و سونوگرافی)	۹۰	۹۰	۱

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

اسفندماه - سال ۱۳۹۵

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تعاملی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان معاز می‌نالند و با متخلفین برابر مقررات رفتار می‌شود.

اصول جراحی و هوشبری:

- ۱- جهت استریل‌سازی اورژانسی ابزارهای جراحی از کدام روش استفاده می‌شود؟
 (۱) اتیلن اکساید
 (۲) پلاسمای
 (۳) حرارت خشک
 (۴) حرارت مرتبط
- ۲- کدام دسته از سلول‌های التهابی زودتر از سایر سلول‌ها در مرحله پاکسازی التیام زخم در موضع جراحت حضور پیدا می‌کنند?
 (۱) لنفوسيت‌ها
 (۲) ماکروفازها
 (۳) نوتروفیل‌ها
- ۳- کدام محلول، علاوه بر انر گندزدایی، خاصیت استریل‌کنندگی نیز دارد?
 (۱) الکل
 (۲) بتادین
 (۳) کلرهگزیدین
 (۴) گلوتار آلدھید
- ۴- در کدام گونه بروز جوانه گوشتی بیش از حد، شایع تر است?
 (۱) اسب
 (۲) سگ
 (۳) گاو
 (۴) گوسفند
- ۵- بخیه پارکرکر (Parker -ker) از کدام الگوهای بخیه تشکیل شده است?
 (۱) ساده سرتاسری و قفلی (Simple Continuous + Lock stitch)
 (۲) کوشینگ و لمبرت (Cushing + Lembert)
 (۳) لمبرت و تشكی (Lembert + Mattress)
 (۴) لمبرت و هالستد (Lembert + Halsted)
- ۶- در استریلیزاسیون به روش پلاسمای (Plasma sterilization)، از کدام ماده استفاده می‌شود?
 (۱) اتیلن اکساید
 (۲) اشعه ماوراء بنسن
 (۳) کیالت ۶۰
 (۴) هیدروژن پراکساید
- ۷- نخ‌های بخیه قابل جذب صناعی (ستنتیک) در بافت به کدام یک تبدیل می‌شوند?
 (۱) آب و اکسید نیتروژن
 (۲) آب و دی‌اکسید کربن
 (۳) آب و اسیدهای آمینه
 (۴) آب و لطف
- ۸- کدام آنتی‌بیوتیک موضعی در بافت‌های نکروزه نفوذ نموده و اپی‌تلیزاسیون را تسريع می‌نماید?
 (۱) باسیتراسین
 (۲) جنتامایسین
 (۳) سیلور سولفادیازین
 (۴) نیتروفورازون
- ۹- اولین واکنش بدن در هنگام وقوع خونریزی کدام است?
 (۱) انقباض عروقی (Vasoconstriction)
 (۲) انعقاد یا تشکیل لخته فیبرینی (Coagulation)
 (۳) تجمع پلاکت‌ها (Platelet Aggregation)
 (۴) فیبرینولیزیس (Fibrinolysis)
- ۱۰- در کدام گونه، برای انجام لوله‌گذاری نای باید بیهوشی عمیق‌تر باشد?
 (۱) اسب
 (۲) سگ
 (۳) گربه
 (۴) گوسفند

- ۱۱ در صورت کاهش تعداد تنفس و کاهش تهویه ریوی کدام اختلال اسید و باز روی می‌دهد؟
- (۱) اسیدوز تنفسی
 - (۲) آلkaloz تنفسی
 - (۳) آلkaloz متابولیک
 - (۴) اسیدوز متابولیک
- ۱۲ برای مایع درمانی در یک سگ ۲۰ کیلوگرمی با سرعت تزریق ۱۰ میلی‌لیتر به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن در هر ساعت، تعداد قطره‌ها به طور تقریب در دقیقه کدام است؟ (هر میلی‌لیتر معادل ۲۰ قطره در نظر گرفته شود)
- (۱) ۴۵
 - (۲) ۵۵
 - (۳) ۶۵
 - (۴) ۷۵
- ۱۳ بی‌حسی اپیدورال در ناحیه کمری - خاجی (Lumbosacral) در کدام حیوان توصیه می‌شود؟
- (۱) اسب
 - (۲) گوسفند
 - (۳) گاو
 - (۴) گامیش
- ۱۴ علت عدم کارایی داروی بی‌حسی لیدوکائین در بافت‌های ملتهب و عفونی، افزایش شکل دارو به دلیل بودن محیط می‌باشد.
- (۱) یونیزه - قلیابی
 - (۲) غیریونیزه - قلیابی
 - (۳) غیریونیزه - اسیدی
 - (۴) یونیزه - اسیدی
- ۱۵ در یک بز نر مبتلا به انسداد مجرای پیشاپراه، کدام داروی پیش بی‌هوشی منع مصرف دارد؟
- (۱) آسپرومازین
 - (۲) پروپوفول
 - (۳) زایلازین
 - (۴) میدازولام
- ۱۶ در مورد خون‌بندی با استفاده از الکتروکوتور کدام یک از موارد زیر صحیح است؟
- (۱) بهترین وسیله خون‌بندی در خونریزی‌های دیواره روده‌هاست.
 - (۲) استفاده از کوتور باعث کاهش طول مدت جراحی می‌شود.
 - (۳) استفاده از کوتور احتمال بروز عفونت در بافت را کاهش می‌دهد.
 - (۴) استفاده از کوتور می‌تواند باعث تسریع روند التیام شود.
- ۱۷ کدام داروی آنتاگونیست، با بقیه متفاوت است؟
- (۱) آتیپامازول (Atipamezole)
 - (۲) تولازولین (Tolazoline)
 - (۳) فلومازنیل (Flumazenil)
 - (۴) یوهمبین (Yohimbine)
- ۱۸ موقع اسکولیوزیس (Scoliosis) از معایب کدام تکنیک بی‌حسی در گاو است؟
- (۱) اپیدورال (Epidural)
 - (۲) انتشاری (Infiltration)
 - (۳) پاراورتبرال دیستال (Distal Para vertebral)
 - (۴) پاراورتبرال پروگزیمال (Proximal Para vertebral)
- ۱۹ اساسی ترین دارو در درمان شوک آنافیلاکتیک کدام است؟
- (۱) آتروپین
 - (۲) آپی‌نفرین
 - (۳) آنتی‌هیستامین
 - (۴) کورتیکواسترونید
- ۲۰ زخم عفونی، زخمی است که حداقل بیش از باکتری در هر گرم از بافت زخم داشته باشد.
- (۱) 10^2
 - (۲) 10^4
 - (۳) 10^5
 - (۴) 10^6

جراحی عمومی دام‌های بزرگ:

- ۲۱- در صورتی که احتمال چسبندگی دیواره شیردان در جابجایی شیردان به سمت چپ وجود داشته باشد، رهیافت انتخابی کدام است؟
- (۲) تهیگاه چپ
 - (۳) پارامدین راست
 - (۴) پارامدین چپ
- ۲۲- کدام آنتی‌بیوتیک‌ها در دام‌های مزرعه منع مصرف دارند؟
- (۱) اریترومایسین - تتراسایکلین
 - (۲) پنی‌سیلین - انوفلوکساسین
 - (۳) جنتامایسین - انوفلوکساسین
- ۲۳- در عفونت ناف گوساله پیش آگهی کدام مورد بدتر است؟
- (۱) آفسه نافی (umbilical abcess)
 - (۲) عفونت اوراکوس (urachal infection)
 - (۳) عفونت شریان نافی (omphaloarteritis)
 - (۴) عفونت ورید نافی (omphalophlebitis)
- ۲۴- در قوچ، معمول ترین محل انسداد در اثر سنگ ادراری کدام قسمت میزراه می‌باشد؟
- (۱) ابتدای میزراه در ناحیه گردان مثانه
 - (۲) خم سیگموئید (Sigmoid flexure)
 - (۳) زانده کرمینه (Urethral process)
 - (۴) قوس ایسکیوم (Ischial arch)
- ۲۵- در اختنه اسب به روش باز همه لایه‌های زبر برش داده می‌شوند، به جز:
- (۱) اسکروتون (Scrotum)
 - (۲) تونیکا آلبوزتا (Tunica Albuginea)
 - (۳) تونیکا واژینالیس (Tunica Vaginalis)
 - (۴) دارتوس (Dartus)
- ۲۶- بخیه رحم در سزارین گاو با چه نخی توصیه شده است؟
- (۱) پلی گلاکتین ۹۱۰
 - (۲) پلی دیاکسانون
 - (۳) نایلون
- ۲۷- به توپی‌های مویی روده چه اطلاق می‌شود؟
- (۱) Fecolith
 - (۲) Phytobezoar
 - (۳) Trichobezoar
- ۲۸- معمول ترین محل تجمع سنگ‌های ادراری در اسب، کدام بخش دستگاه ادراری می‌باشد؟
- (۱) کلیه
 - (۲) میزنای
 - (۳) میزراه
 - (۴) مثانه
- ۲۹- برای جلوگیری از باز شدن پوستی که تحت فشار بخیه می‌شود، کدام الگوی بخیه توصیه می‌شود؟
- (۱) تشكی افقی (Horizontal mattress)
 - (۲) تک ساده (Simple interrupted)
 - (۳) کوشینگ (Cushing)
- ۳۰- در جراحی کولیک اسب معمولاً برش در کدام ناحیه انجام می‌شود؟
- (۱) تهیگاهی (Flank)
 - (۲) خط میانی شکمی (Ventral midline)
 - (۳) مجاور دندن‌های (Paracostal)

- ۳۱- در عمل رومینوتومی گاو از کدام الگوهای بخیه برای دوختن شکمبه استفاده می‌شود؟
 (۱) تشكی - لمبرت (Lembert - Connell) (۲) لمبرت - کونل (Mattress - Lembert)
 (Cushing - Mattress) (۳) کوشینگ - تشكی (Lembert - Cushing)
 (۴) لمبرت - کوشینگ
- ۳۲- در سزارین گاو اگر جنین عفونی و آمفیزی می‌شده باشد از چه رهیافتی جهت جراحی استفاده شود؟
 (۱) ترانس واژنال (Transvaginal) (۲) مجاور دندنه‌ها (Para costal)
 (۳) تهیگاه چپ (Left Flank) (۴) ونترولترال (Ventrolateral)
- ۳۳- در برش فلانک راست در گاو، اولین ساختاری که دیده می‌شود چه نام دارد؟
 (۱) دوازدهه نزولی (Descending duodenum)
 (۲) شیردان (Stomach)
 (۳) کبد (Liver)
 (۴) کولون
- ۳۴- شایع‌ترین محل انسداد در اثر سنگ‌های روده‌ای در روده‌های بزرگ اسب کدام ناحیه آناتومیکی است؟
 (۱) خم جناغی (Sternal flexure)
 (۲) منفذ ایلوسکال (Ileocecal orifice)
 (۳) خم لگنی (Pelvic flexure)
 (Diaphragmatic flexure) (۴) خم دیافراگمی (Diaphragmatic flexure)
- ۳۵- عمل جراحی **Typhlotomy** مربوط به کدام ساختار می‌باشد؟
 (۱) سکوم (Sigmoid colon)
 (۲) زُزِنوم (Sigmoid flexure)
 (۳) کولون (Colon)
 (۴) دوازدهه (Duodenum)
- ۳۶- کدام مورد برای فیبروبلاست‌های زخم در حین ترمیم در اسب بسیار توکسیک می‌باشد؟
 (۱) آب لوله‌کشی (Tap water)
 (۲) رینگر لاکتان (Lactate Ringer's)
 (۳) مایعات پلی‌بونیک (Polyionic Fluids)
 (۴) نرمال سالین (Normal saline)
- ۳۷- برای درمان جراحی تلسکوپی شدن (Intussusception) روده کوچک در گاو مناسب‌ترین رهیافت جراحی کدام است؟
 (۱) پارامدیان راست (Right paramedian)
 (۲) تهیگاه چپ (Left Flank)
 (۳) خط میانی شکمی (Ventral midline)
 (۴) تهیگاه راست (Right Flank)
- ۳۸- مهم‌ترین عارضه درازمدت متعاقب جراحی مری در نشخوار کنندگان کدام است؟
 (۱) تنگی مجرأ (Stricture)
 (۲) عفونت (Infection)
 (۳) کیسه‌ای شدن (Diverticulum)
 (۴) نشت محتویات (Leakage)
- ۳۹- در چه سنی جوانه شاخی گوساله به جمجمه متصل می‌شود؟
 (۱) از بدو تولد
 (۲) یک سالگی
 (۳) دو ماهگی
 (۴) شش ماهگی
- ۴۰- در همه موارد صدای زنگی از سمت چپ محوطه بطنی گاو قابل شنیدن است، به جز:
 (۱) پنوموپریتونوم (Pneumoperitoneum)
 (Rumen Tympany) (۲) تجمع گاز در شکمبه (Pneumoperitoneum)
 (Physometra) (۳) جابه‌جایی شیردان به سمت چپ (LDA)
- ۴۱- کدام یک از زخم‌های سر پستانک برای ترمیم سریع‌تر، پیش آگهی بهتری دارد؟
 (۱) طولی (Longitudinal)
 (۲) عرضی (Transverse)
 (۳) مورب (Oblique)

- ۴۲- رایج‌ترین رهیافت در عمل سزارین اسب کدام است؟
- (۱) تهیگاه چپ (Left Flank)
 - (۲) تهیگاه راست (Right Flank)
 - (۳) خط میانی شکمی (Ventral midline)
 - (۴) مجاور خط میانی راست (Right paramedian)
- ۴۳- کدام رهیافت جراحی برای سزارین گوسفند در شرایط مزروعه توصیه می‌شود؟
- (۱) خط میانی شکمی (Ventral midline)
 - (۲) موازی خط میانی شکمی (Ventral paramedian)
 - (۳) مجاور دندای (Paracostal)
 - (۴) تهیگاه چپ (Left flank)
- ۴۴- کدام مورد از شایع‌ترین عوارض استفاده از **Toggle pin** برای تشییت شیردان در اصلاح جابه‌جاوی شیردان به سمت چپ می‌باشد؟
- (۱) اتساع شیردان
 - (۲) فیستول شیردان
 - (۳) پارگی شیردان
 - (۴) برگشت عارضه و جابه‌جاوی مجدد شیردان
- ۴۵- کدام مورد امکان آبودگی حفره بطنی را در حین لایارومینوتومی در گاو به حداقل ممکن کاهش می‌دهد؟
- (۱) استفاده از تخته رومینوتومی
 - (۲) استفاده از پنس شان گیر
 - (۳) استفاده از سیت وینگارت
 - (۴) بخیه شکمبه به پوست

جراحی عمومی دام‌های کوچک:

- ۴۶- کدام گزینه تعریف درست تکنیک جراحی **Billroth II** است؟
- (۱) برداشتن پیلور به روش جراحی و آناستوموز معده به دئودنوم
 - (۲) برش تمام ضخامت در چیلور و دوختن مجدد آن به روشی که باعث افزایش قطر خروجی معده شود.
 - (۳) برداشتن قسمتی از معده از جمله پیلور به روش جراحی و آناستوموز معده به ژرزنوم
 - (۴) برش بر روی لایه سروزی و عضلانی پیلور
- ۴۷- کدام مورد در خصوص انجام درمان جراحی پیومتر در سگ صحیح می‌باشد؟
- (۱) ایجاد برش لایاراتومی برای خارج نمودن رحم مبتلا به پیومتر در حدفاصل زیفوئید تا ناف می‌باشد.
 - (۲) اگر شاخهای رحم دچار چرخش شده باشد، باید قبل از خارج نمودن رحم از محوطه بطنی، چرخش‌ها اصلاح شوند.
 - (۳) انجام سیستوستنتز (Cystocentesis) و جمع آوری نمونه ادرار بعد از برش دیواره شکم به هیچ وجه توصیه نمی‌شود.
 - (۴) برای بیرون کشیدن رحم از محوطه بطنی نباید از قلاب عمل عقیمسازی (spay hock) استفاده نمود.
- ۴۸- کدام گزینه می‌تواند متعاقب استفراغ‌های مداوم در اثر استنتوز پیلور ایجاد شود؟
- (۱) هیپو کالمی و آلالالوز
 - (۲) هایپر کالمی و آلالالوز
 - (۳) هیپو کالمی و اسیدوز
 - (۴) هایپر کالمی و اسیدوز
- ۴۹- اگر در زمان انجام عمل **Perineal urethrostomy** در گربه تصمیم به انجام عمل اختنه گرفته شود، استفاده از چه روشی توصیه می‌شود؟
- (۱) Scrotal ablation
 - (۲) Overhand technique
 - (۳) Prescrotal technique
 - (۴) Serotal open technique
- ۵۰- تجویز قبل از عمل کدام دسته از آنتی‌بیوتیک‌ها برای بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی بلامانع است؟
- (۱) آمینوگلیکوزیدها
 - (۲) تتراسایکلین‌ها
 - (۳) سفالوسپورین‌ها
 - (۴) سولفانامیدها

- ۵۱- شایع‌ترین تومور در سگ‌های ماده کدام است؟
- (۱) تومور پستان
 - (۲) تومور رحم
 - (۳) تومور مثانه
 - (۴) تومور میزراه
- ۵۲- کدام رهیافت لایه‌atomی در دام‌های کوچک با لیگامان فالسی فورم (Falciform lig.) (مواجه می‌شود؟)
- (۱) تهیگاهی (Paralumbar fossa)
 - (۲) خط میانی شکمی (Ventral midline)
 - (۳) مجاور خط میانی (Paramedian)
 - (۴) مجاور دندنهای (Paracotal)
- ۵۳- برای انجام عمل جراحی بر روی دوازدهه و پانکراس، بهترین رهیافت در سگ و گربه کدام است؟
- (۱) خط میانی شکم (Ventral midline)
 - (۲) فلانک راست (Right flank)
 - (۳) فلانک چپ (Left flank)
 - (۴) موازی دندنهای در چپ (Left paracostal)
- ۵۴- همه موارد زیر از دلایل التیام سریع برش روی دیواره معده است، به جز:
- (۱) خون‌رسانی زیاد
 - (۲) بار میکروبی کم (اسید معده)
 - (۳) وجود لایه عضلانی ضخیم در دیواره
 - (۴) مکانیسم‌های دفاعی چادرینه
- ۵۵- در مورد فتق دیافراگمی کدام مورد صحیح است؟
- (۱) ارگان‌های شکمی در داخل کیسه فتقی قرار دارد.
 - (۲) ریه‌ها به سمت محوطه شکمی جایه‌جا می‌شوند.
 - (۳) حالت پنوموتوراکس (Pneumothorax) بروز می‌کند.
 - (۴) حالت کولاپس ریه‌ها روی می‌دهد.
- ۵۶- کدام یک از روش‌های گاستروپیکسی با ثبات‌ترین روش تثبیت معده می‌باشد؟
- (۱) Belt-loop
 - (۲) Circumcostal
 - (۳) Tube
 - (۴) Muscular flap (incisional)
- ۵۷- عمل جراحی Zepp معادل کدام عمل جراحی (مربوط به کانال‌های گوش در دام‌های کوچک) می‌باشد؟
- (۱) برداشت کامل کanal عمودی گوش
 - (۲) برداشت کامل کanal افقی و عمودی گوش
 - (۳) برداشت دیواره خارجی کanal عمودی گوش
 - (۴) برداشت کامل کanal افقی و عمودی گوش به همراه برداشت استخوان حفره صماخی
- ۵۸- شایع‌ترین اختلال پروسات در سگ سانان کدام است؟
- (۱) نشوپلاسم
 - (۲) آبسه پروسات
 - (۳) کیست پروسات
 - (۴) هایپرپلازی خوش‌خیم پروسات
- ۵۹- تکنیک معمول برای درمان اکتروپیون سکاتریسی (Cicatricial Ectropion) کدام است؟
- (۱) Y-to-V correction
 - (۲) V-to-Y correction
 - (۳) wedge resection
 - (۴) Lateral tarsorrhaphy
- ۶۰- درمان جراحی برای همه تومورهای پستانی سگ انجام می‌گیرد، به جز:
- (۱) آدنوما
 - (۲) آدنوکارسینوما
 - (۳) فیبروآدنوما
 - (۴) کارسینومای التهابی
- ۶۱- محل شایع بروز تومور روده آدنوکارسینوم در گربه‌ها چه بخشی از آن می‌باشد؟
- (۱) دوازدهه و کولون
 - (۲) دوازدهه و ژئنوم
 - (۳) ژئنوم و ایلنوم
 - (۴) کولون و ایلنوم

- ۶۲- در عمل گاستروتومی، برش روی کدام قسمت معده انجام می‌شود؟
 (۱) بدن (Body)
 (۲) پیلور (Pylorus)
 (۳) خم بزرگ (Greater curvature)
 (۴) فاندوس (Fundus)
- ۶۳- معمولترین سنگ‌های ادراری در سگ‌ها کدامند؟
 (۱) اورات - سیلیکات
 (۲) استروویت - اگزالت کلسیم
 (۳) سفالوپیت - اگزالت کلسیم
- ۶۴- کدام آنتی بیوتیک هپاتوتوكسیک نبوده و بعد از جراحی کبد و دستگاه پورتال، می‌توان آن را تجویز نمود؟
 (۱) اریتروماسین
 (۲) اکسی تراسیکلین
 (۳) سفازولین
 (۴) کلرامفینیکل
- ۶۵- پارگی مثانه در دام‌های کوچک، در کدام قسمت آن بیشتر رخ می‌دهد؟
 (۱) رأس (Apex)
 (۲) گردن (Neck)
 (۳) سطح پشتی (Dorsal)
 (۴) سطح شکمی (Ventral)
- ۶۶- شکستگی پایدار کدام استخوان را نمی‌توان با گچ‌گیری درمان کرد؟
 (۱) بازو
 (۲) درشتانی
 (۳) زند زبرین
 (۴) زند زبرین
- ۶۷- در یک سگ ۲۰ کیلوگرمی در وسط استخوان رادیوس یک شکستگی عرضی ساده رخ داده است. برای درمان آن گچ‌گیری پیشنهاد می‌شود. محدوده گچ بر روی اندام باید چگونه باشد؟
 (۱) از مفصل کارپ تا پایین مفصل آرنج
 (۲) از مفصل کارپ تا بالای مفصل آرنج
 (۳) از انتهای اندام تا پایین مفصل آرنج
 (۴) از انتهای اندام تا بالای مفصل آرنج
- ۶۸- متداولترین تومور استخوان در دام‌های کوچک کدام مورد می‌باشد؟
 (۱) لیومیوسارکوم
 (۲) کندروسارکوم
 (۳) فیبروسارکوم
 (۴) استئوسارکوم
- ۶۹- از کدام روش جراحی می‌توان هم برای اصلاح اکتروپیون و هم آنترورپیون استفاده کرد؟
 (۱) Hotz - Celsus
 (۲) Punch
 (۳) Y-to-V correction
 (۴) Wedge Resection
- ۷۰- در کدام نوع از شکستگی‌ها معمولاً سه قطعه شکستگی وجود دارد؟
 (۱) شکستگی‌های عرضی
 (۲) شکستگی‌های مارپیچ
 (۳) شکستگی‌های Unicondylar
 (۴) شکستگی‌های Bicondylar
- بیماری‌های اندام‌های حرکتی:
- ۷۱- شایع‌ترین اندیکاسیون عمل قطع عصب کف‌دستی انگشتی (Palmar Digital Neurectomy) کدام است؟
 (۱) استخوانی شدن غضروف‌های جانبی بند سوم
 (۲) سندروم ناویکولار
 (۳) شکستگی‌های استخوان ناویکولار
 (۴) شکستگی‌های استخوان بند سوم

- ۷۲- تورم لیگامان کف پایی را اصطلاحاً چه می‌نامند؟
- Capped hock (۲)
Check lig. desmitis (۴)
- Curb (۱)
Thoroughpin (۳)
- ۷۳- سندروم ناویکولار به عنوان علت لگش مزمن، در کدام گروه از اسب‌ها کمتر دیده می‌شود؟
- (۱) اسب‌های نژاد استاندار برد
(۲) اسب‌های نژاد تروبرد
(۳) اسب‌های نژاد کوارتر
(۴) یونی‌ها و اسب‌های نژاد عرب
- ۷۴- وضعیت دُزرتاتیو جسم قورباغه حاوی ترشحات اکسودایی سیاه رنگ و بدبو در برگیرنده شیار مرکزی و شیارهای جانبی، مشخصه کدام بیماری است؟
- Gravel (۲)
Thrush (۴)
- Canker (۱)
Quitter (۳)
- ۷۵- کدام تکنیک جراحی در درمان لامینایتیس مزمن در اسب کاربرد درمانی دارد؟
- (۱) قطع تاندون کونشن
(۲) قطع تاندون خم کننده سطحی انگشتی
(۳) قطع تاندون خم کننده عمقی انگشتی
(۴) قطع تاندون باز کننده طویل انگشتی
- ۷۶- اوفه (Bone Spavin) در کدام مفصل اسب رخ می‌دهد؟
- (۱) بخلق
(۲) تارس
(۳) کارپ
(۴) قلمی بندانگشتی
- ۷۷- کدام مورد از علائم بالینی سندروم ناویکولار در اسب می‌باشد؟
- (۱) سائیدگی پنجه سم و انقباض پاشنه‌ها
(۲) سائیدگی پاشنه سم و رشد بیش از حد پنجه سم
(۳) سائیدگی لبه داخلی سم و انقباض پاشنه‌ها
(۴) سائیدگی لبه جانبی سم و انقباض پاشنه‌ها
- ۷۸- خوردن کدام ماده دانه‌ای، کمترین میزان خطر برای وقوع بیماری لامینایتیس را در اسب دارد؟
- (۱) ذرت
(۲) گندم
(۳) جو
(۴) جوی دوسر (بولاف)
- ۷۹- در یک گاوداری بزرگ محل مناسب برای ساختن حمام سم (Foot bath) کدام است؟
- (۱) خروجی سالن شیردوشی
(۲) ورودی سالن شیردوشی
(۳) در محل نگهداری گاوهای خشک
(۴) در هر قسمی از گاوداری ساخته شود مناسب است.
- ۸۰- نحوه صحیح استفاده از بلوک چوبی (Wooden Block) روی انگشت یکی از اندام‌های حرکتی گاوی که دچار عارضه شده کدام است؟
- (۱) کارگذاری روی هر دو انگشت
(۲) کارگذاری روی انگشت در گیر اندام
(۳) کارگذاری روی انگشت سالم اندام
(۴) کارگذاری ابتدا روی انگشت سالم و پس از مدتی روی انگشت در گیر

رادیولوژی و سونوگرافی:

- ۸۱- بهترین روش تصویربرداری تشخیصی برای بررسی حالبها در سگ کدام است؟

(۱) IVP

(۲) اولتراسونوگرافی

(۳) رادیوگرافی ساده

(۴) سیستوگرافی با ماده حاجب منفی

- ۸۲- بهترین روش تصویرگیری از عوارض نخاع کدام است؟

(۱) CT Scan

(۲) MRI

(۳) Radiography

(۴) Ultrasonography

- ۸۳- همه موارد زیر از نشانه‌های رادیوگرافی استثنوآرتروز می‌باشند. به جز:

(۱) کاهش فضای مفصلی

(۲) اسکلروتیک شدن استخوان زیر غضروف

(۳) لبه‌دار شدن (lipping) جوانب مفصلی

(۴) New bone formation در سطح مفصلی

- ۸۴- در تشخیص رادیوگرافی بیماری ناویکولار (Navicular disease). کدام مورد اهمیت تشخیصی بیشتری دارد؟

(۱) تغییر در اندازه Synovial fossa

(۲) تغییر در تعداد Synovial fossa

(۳) تغییر در شکل Synovial fossa

(۴) تشکیل انتزیوفیت بر جوانب استخوان ناویکولار

- ۸۵- اصطلاح wear&tear دال بر کدام است؟

Secondary DJD (۲)

Primary DJD (۱)

Non-infective Arthritis (۴)

Infective Arthritis (۳)

- ۸۶- در رادیوگرافی از محوطه شکمی یک قلاده سگ، از نمای جانبی توده‌ای در قسمت میانی محوطه شکمی مشاهده

می‌شود که روده‌ها را به سمت ونترال جایه‌جا کرده است به کدام یک از موارد زیر بیشتر مشکوک می‌شود؟

(۱) توده‌های رحمی

(۲) توده‌های طحالی

(۳) توده‌های کبدی

(۴) توده‌های کلیوی

- ۸۷- کدام عبارت صحیح است؟

(۱) استتوپلیز در اثر تحریک سلول‌های استئوسیت انجام می‌گیرد و معمولاً به دنبال استئوزنز اتفاق می‌افتد.

(۲) استتوپلیز کانونی در قسمتی از یک استخوان همواره نشان‌دهنده ضایعه خوش‌خیم است.

(۳) استتوسارکوم در قسمت پروکسیمال استخوان بازو و پروکسیمال استخوان تیبیا بیشتر مشاهده می‌شود.

(۴) در استتوسارکوم، همواره تهاجم به یافت نرم اطراف ضایعه به صورت نواحی استئوزنز مشاهده می‌شود.

- ۸۸- در رادیوگرافی ساده از محوطه شکمی سگ بالغی، غیرطبیعی بودن روده‌های بزرگ مشاهده می‌شود. کدام روش را

برای تشخیص تغییقی انتخاب می‌کنید؟

(۱) اولتراسونوگرافی

(۲) تغییق ماده حاجب

(۳) خوراندن سولفات باریوم

-۸۹ در **Hypertrophic pulmonary osteopathy**، کدام نشانه‌ها در رادیوگرافی مشاهده می‌شود؟

۱) اسپندیلوز در مهره‌های سینه‌ای و کمری

۲) استخوان سازی حاصل از پرده ضریع در استخوان‌های دراز، بخصوص متارکارپ‌ها و متاتارس‌ها

۳) نواحی استئولیز روی دندنه‌ها

۴) نواحی استئولیز در بدن مهره‌های سینه‌ای و کمری

-۹۰ کدام یک از سنگ‌های مثانه، رادیولوست است؟

Carbonate (۲)

Cysteine (۱)

Phosphate (۴)

Oxalate (۳)

ایسی‌پاپر.org