

نام :

نام خانوادگی :

محل امضاء :



187F

صبح جمعه
۹۲/۱۲/۱۶
دفترچه شماره (۱)



اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی دوره‌های دکتری (نیمه مرکز) داخل سال ۱۳۹۳

مهندسی محیط زیست (۲) آب و فاضلاب (کد ۲۳۴۴)

مدت پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۴۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی (ریاضیات عمومی ۱ و ۲ و معادلات دیفرانسیل - آب و فاضلاب)	۴۵	۱	۴۵

اسفندماه سال ۱۳۹۲

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد.

فرض کنید $z = 2e^{\frac{\pi i}{6}}$. مساحت مستطیل محصور بین نقاط z , \bar{z} , $-z$ و $-\bar{z}$ - کدام است؟

- ۱) $\sqrt{2}$
۲) 2
۳) $4\sqrt{3}$
۴) 4

..... به ترتیب و سریهای $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$, $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[n]{n}-1)^n$ می باشند.

- ۱) همگرا- همگرا
۲) همگرا- واگرا
۳) واگرا- همگرا
۴) واگرا- واگرا

مقدار $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_x^{x+\Delta x} (1+\frac{1}{t})^t dt}{x}$ برابر است با:

- ۱) e
۲) Δe
۳) e
۴) Δe

مقدار انتگرال $\int_1^e (\ln x)^3 dx$ کدام است؟

- ۱) $e - 3$
۲) $e - 6$
۳) $2e - 3$
۴) $2e - 6$

مقدار $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sum_{k=1}^n \sqrt{(n+k)(n+k+1)}}{n^2}$ کدام است؟

- ۱) $\frac{1}{2}$
۲) $\frac{3}{2}$
۳) $\frac{1}{2}$
۴) $\frac{3}{2}$

کدام گزینه در مورد $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^3+y^3)}{x^3+y^3}$ صحیح است؟

- ۱) وجود ندارد
۲) $\frac{1}{2}$
۳) $\frac{1}{2}$
۴) \circ

فرض کنید $r(t) = ((1+t^2)^t, \cosh(t-t))$ که در آن $t > 0$. احناء این منحنی در $t=1$ برابر است با:

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| $\frac{1}{t(1+\ln t)^2}$ (۱) | $\frac{1}{t(1+\ln t)^2}$ (۲) |
| $\frac{1}{t(1+\ln t)^3}$ (۳) | $\frac{1}{t(1+\ln t)^3}$ (۴) |

معادله صفحه مماس بر رویه $\sin(xyz) - \sin(x+y+z) = 1$ در نقطه -۸

$$\frac{\pi}{2}, 2\pi \text{ کدام است؟}$$

$$y = 0 \quad (2)$$

$$x = 0 \quad (1)$$

$$x + y + z = -\frac{3\pi}{2} \quad (4)$$

$$x = \frac{2}{\pi} \quad (3)$$

کدام گزینه در مورد انتگرال دو گانه -۹

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dxdy}{\sqrt{(1+x^2+y^2)^3}}$$

صحیح است؟

$$(2) \text{ همگرا به } \frac{\pi}{2} \text{ است.}$$

(1) واگرا به $+\infty$ است.

$$(4) \text{ همگرا به } 2\pi \text{ است.}$$

(3) همگرا به π است.

فرض کنید C منحنی $x^4 + y^4 = 1$ و $y \geq 0$ باشد که در جهت مثلثاتی در نظر -۱۰

گرفته شده است. مقدار $\int_C (e^x \cos y)dx - (e^x \sin y)dy$ کدام است؟

$$\frac{1}{e} - e \quad (2) \quad (1)$$

$$e + \frac{1}{e} \quad (4) \quad 2\pi \quad (3)$$

جواب عمومی معادله دیفرانسیل $(xy^r - y^r - x^r e^x)dx + 3y^r x dy = 0$ کدام است؟ -۱۱

$$y^r = \frac{x}{r} e^x + c x e^{-x} \quad (2) \quad xy^r = \frac{1}{r} e^x + c e^{-x} \quad (1)$$

$$y^r = \frac{1}{r} e^x + c e^{-x} \quad (4) \quad y^r = x e^x + c x e^{-x} \quad (3)$$

جواب عمومی معادله دیفرانسیل $(x+2)^r \frac{dy}{dx} - (x+2) \frac{dy}{dx} + y = 4$ کدام -۱۲

است؟

$$y = c_1(x+2) + c_2(x+2)^r + 4 \quad (1)$$

$$y = c_1(x+2) + c_2(x+2) \ln(x+2) \quad (2)$$

$$y = c_1(x+2)^r + c_2(x+2)^r \ln(x+2) + 4 \quad (3)$$

$$y = c_1(x+2) + c_2(x+2) \ln(x+2) + 4 \quad (4)$$

جواب عمومی معادله دیفرانسیل -۱۳

$$x \frac{d^r y}{dx^r} - (2x+1) \frac{dy}{dx} + (x+1)y = (x^r + x - 1)e^{rx} \text{ کدام است؟}$$

$$y = c_1 x e^{rx} + c_2 e^{rx} + x e^{rx} \quad (2) \quad y = c_1 x e^{rx} + c_2 e^x + x^r e^{rx} \quad (1)$$

$$y = c_1 x^r e^x + c_2 e^x + x^r e^{rx} \quad (4) \quad y = c_1 x^r e^x + c_2 e^x + x e^{rx} \quad (3)$$

-۱۴ جواب معادله انتگرالی $y(t) + 2y(t) + \int_0^t y(x)dx = 0$, $y(0) = 1$ کدام است؟

(۱) $e^{-t}(2+t)$

(۲) $e^t(2+t)$

(۳) $e^{-t}(1-t)$

-۱۵ در مسئله مقدار اولیه $\begin{cases} y'' = 16y_2, y''_2 = 16y_1 \\ y_1(0) = 2, y'_1(0) = 12, y_2(0) = 6, y'_2(0) = 4 \end{cases}$ مقدار $y_1(t)$ کذا است؟

(۱) $\frac{3}{2}\cosh(4t) + 2\sinh(4t) + \frac{1}{2}\cos(4t) + \sin(4t)$

(۲) $\frac{5}{2}\cosh(4t) + 2\sinh(4t) - \frac{1}{2}\cos(4t) + \sin(4t)$

(۳) $4\cosh(4t) + 2\sinh(4t) - 2\cos(4t) + \sin(4t)$

(۴) $6\cosh(4t) + 2\sinh(4t) - 4\cos(4t) + \sin(4t)$

-۱۶ اکثر قارچ‌ها هستند و قادرند در pH و نیتروژن محیط رشد نمایند.

(۱) بی‌هوایی - زیاد - کم - زیاد

(۲) هوایی - کم - کم - زیاد

(۳) هوایی - کم - کم

-۱۷ شرایط مناسب برای رشد و تکثیر باکتری‌های احیا کننده سولفات چیست؟

(۱) باکتری‌های احیا کننده سولفات در دمای بیش از ۱۵ درجه سانتی‌گراد و عدم حضور اکسیژن و نیترات رشد می‌کنند.

(۲) باکتری‌های احیا کننده سولفات در دمای کمتر از ۱۵ درجه سانتی‌گراد و حضور اکسیژن و نیترات رشد می‌کنند.

(۳) باکتری‌های احیا کننده سولفات در دمای کمتر از ۱۵ درجه سانتی‌گراد و حضور اکسیژن و عدم حضور نیترات رشد می‌کنند.

(۴) باکتری‌های احیا کننده سولفات در دمای بیشتر از ۱۵ درجه سانتی‌گراد و حضور نیترات و عدم حضور اکسیژن رشد می‌کنند.

-۱۸ شرایط مناسب برای رشد باکتری‌های تولید کننده متان چیست و چه نوع باکتری‌هایی هستند؟

(۱) باکتری‌های تولید کننده متان مزووفیلیک هستند و در pH اسیدی فعال می‌باشند.

(۲) باکتری‌های تولید کننده متان ترموفیلیک هستند و در pH بازی فعال می‌باشند.

(۳) باکتری‌های تولید کننده متان هم ترموفیلیک و هم مزووفیلیک هستند و در pH خنثی فعال می‌باشند.

(۴) اغلب باکتری‌های تولید کننده متان هم ترموفیلیک و هم مزووفیلیک بوده و در pH اسیدی و بازی فعالیت دارند.

-۱۹ چربی در تصفیه خانه فاضلاب شهری چه نوع لجنی درست کرده و چگونه حذف می‌شود؟

۱) لجن اولیه توسط میکروارگانیزم‌های میکروتریکس و آکتنومیست تشکیل شده و با هوادهی در دانه‌گیرها حذف می‌شود.

۲) لجن شناور توسط میکروارگانیزم‌های آکتنومیست و روتیفر تشکیل شده و با هوادهی در حوض تهشینی اولیه حذف می‌شود.

۳) لجن ثانویه توسط میکروارگانیزم‌های میکروتریکس و آکتنومیست تشکیل شده و با هوادهی در حوض هوادهی کاهش می‌یابد.

۴) لجن حجیم توسط میکروارگانیزم‌های میکروتریکس و آکتنومیست تشکیل شده و با هوادهی در دانه‌گیرها کاهش می‌یابد.

-۲۰ در راکتور بستر لجن

۱) در بخش رویی و تجمع بیومس در بخش زیرین توسط باکتری‌های استات سازو میکروارگانیزم‌های تولید کننده متان صورت می‌گیرد.

۲) در صورت وجود کلسیم کمتر از $\frac{mg}{L} 70^0$ به دلیل تشکیل رسوب کربنات کلسیم میکروارگانیزم‌های تولید کننده متان بدون نیاز به مصالح بستر به صورت دانه‌های متراکم یا فلوک رشد می‌کنند.

۳) تجمع بیومس در بخش رویی جایی که بستر لجن وجود دارد توسط باکتری‌های استات ساز و میکروارگانیزم‌های تولید کننده متان صورت می‌گیرد.

۴) در صورت وجود کلسیم کمتر از $\frac{mg}{L} 70^0$ با مصرف دی اکسید کربن توسط باکتری‌های تولید کننده مtan به دلیل تشکیل رسوب کربنات کلسیم تجمع بیومس در لوله‌ها انجام شده و منجر به گرفتگی می‌شود.

-۲۱ رنگ قرمز و سفید شیری به ترتیب در رنگ سطح بستر مصالح صافی چکنده در تصفیه خانه فاضلاب نشانه چیست و منجر به چه مسائلهای خواهد شد؟

۱) رشد باکتری گوگردی و کمبود اکسیژن

۲) رشد دیاتومه و قارچ فوساریوم، خطر گرفتگی بستر

۳) رشد قارچ آسپرژیلوس، قارچ پنی سیلیوم، خطر گرفتگی بستر

۴) رشد باکتری گوگردی و قارچ فوساریوم، کمبود اکسیژن و خطر گرفتگی بستر روش هارדי کراس در آنالیز شبکه آبرسانی بر مبنای کدام یک از موارد زیر استوار است؟

-۲۲ ۱) سعی‌های متوالی

۲) سعی‌های متوالی و شرایط اقتصادی

۳) سعی‌های متوالی و صرف زمان زیاد

۴) سعی‌های متوالی، شرایط اقتصادی و صرف زمان زیاد کدام یک مناسب‌ترین روش برای آنالیز سیستم شبکه آبرسانی با لوله‌های باریک و بلند هستند؟

-۲۳ ۱) روش دایره‌ای

۲) روش اکتریکال

۳) روش لوله جایگزین

-۲۴ با داده‌های زیر حجم حوضچه هوادهی و بار نهایی BOD_5 در فرآیند لجن فعال

به ترتیب از راست به چپ چند متر مکعب و $\frac{kgBOD}{m^3 \cdot d}$ می‌باشند؟

$$Q = 0.3 \frac{m^3}{sec}$$

$$BOD_5 = 7000 \frac{kg}{d}$$

$$BOD_5 \text{ loading rate} = 1/2 \frac{kgBOD_5}{m^3 \cdot d}$$

ساعت ۷ = زمان هوادهی

۲/۲ ، ۶۰۳۰ (۲)

۱/۲ ، ۵۸۳۳ (۱)

۱/۲ ، ۷۸۰۰ (۴)

۰/۹۲ ، ۷۵۶۰ (۳)

-۲۵ براساس نتایج به دست آمده از یک پایلوت مقدار k_s ، k ، y ، k_d محاسبه

شده است، لذا مقدار μ_{max} چند d^{-1} است؟

$$k_d = 0.04 d^{-1}$$

$$y = 0.62$$

$$k = 4.2 d^{-1}$$

$$k_s = 28 \frac{mg}{L}$$

۲/۶ (۲) ۱۷/۳۶ (۱)

۰/۰۲۴ (۴) ۱/۷ (۳)

-۲۶ در کدام یک از فرآیندهای تصفیه زیر کنده شدن توده بیولوژیک صورت

نمی‌گیرد؟

(۲) فیلتر چکنده

RBC (۱)

(۳) فیلتر غیر هوازی جریان رو به پایین (۴) فیلتر غیر هوازی جریان رو به بالا

-۲۷ کدام یک از فرآیندهای تصفیه فاضلاب لجن بیشتری تولید می‌کند؟

(۲) نیزار

UASB (۱)

(۳) فیلتر چکنده (۴) لجن فعال نهرگونه

-۲۸ کدام نحوه تشخیص راکتور بی‌هوازی که به مرحله راهاندازی رسیده است صحیح

می‌باشد؟

(۱) تولید گاز متان

(۳) تولید بیومس و H_2S

(۴) تولید قلیائیت و NH_3

-۲۹ در عملکرد صافی تند کدام یک از فرآیندهای زیر تأثیر کمتری دارد؟

(۱) عملکرد متابولیسم بیولوژیکی

(۲) عملکرد تغییرات الکترولیتی

(۳) عملکرد مکانیکی، عملکرد ته نشینی

(۴) عملکرد ته نشینی، عملکرد الکترولیتی

-۳۰ بار بر روی لوله فاضلابرویی که عرض ترانشه آن $1/5$ متر، عمق خاک روی آن $2/75$ متر و جنس مصالح ماسه نمدار باشد، کدام است؟ (با فرض اینکه وزن ماسه نمدار برابر 25 کیلوگرم بر متر مکعب و C برابر با $1/5$ است).

$$\frac{4556}{m^2} \quad (2) \quad \frac{kg}{m} \quad (1)$$

$$\frac{6834}{m^2} \quad (4) \quad \frac{kg}{m} \quad (3)$$

-۳۱ در فاضلابرو تخم مرغی با ضریب مانینگ $13^{\circ}/0$ ، قطر یک متر، شیب Q_{full}

$$\frac{m^3}{sec} \quad (1/12^{\circ}) \quad \frac{m^3}{s} \quad \text{فاضلابرو } 2^{\circ} \text{ و دبی عبوری}$$

$$0/59 \quad (2) \quad 0/41 \quad (1)$$

$$3/44 \quad (4) \quad 1/2 \quad (3)$$

-۳۲ در صورتی که سطح آب زیر زمینی بالاتر از کف فاضلابرو باشد مقدار نشتآب در شبانه روز برای هر کیلومتر از طول لوله چند متر مکعب است؟

$$15-85 \quad (2) \quad 15-30 \quad (1)$$

$$30-120 \quad (4) \quad 40-150 \quad (3)$$

-۳۳ صفحات فرضی (theoretical plates) در ستون‌های کروماتوگرافی نشانگر چه چیزی هستند؟

۱) توانایی ستون در جداسازی اجزاء نمونه

۲) سرعت فرضی عبور گاز حامل در ستون

۳) بالا بودن حد تشخیص ستون در دستگاه کروماتوگرافی

۴) پایین بودن حد تشخیص ستون در دستگاه کروماتوگرافی

-۳۴ تیتراسیون 100mL نمونه آب به 10 mL اسید هیدروکلریک (HCL) با غلظت $2^{\circ}/0$ مولار برای رسیدن به $pH = 8/3$ نیاز دارد. تیتراسیون 100mL دیگر از همان نمونه آب به L . 20 mL , $2^{\circ}/0$ مولار برای رسیدن به $pH = 4/5$ نیاز دارد. منابع قلیائیت و غلظت آن‌ها بر حسب ppm، کدام است؟

$$M_W(CO_3^{2-}) = 60 \frac{g}{mol}$$

$$M_W(HCO_3^{-}) = 61 \frac{g}{mol}$$

$$120\text{ ppm : } CO_3^{2-} \quad (1)$$

$$122\text{ ppm : } HCO_3^{-} \quad (2)$$

$$122\text{ ppm : } HCO_3^{-} \text{ و } 120\text{ ppm : } CO_3^{2-} \quad (3)$$

$$122\text{ ppm : } HCO_3^{-} \text{ و } 240\text{ ppm : } CO_3^{2-} \quad (4)$$

-۳۵ در اثر هوادهی آب چاهی، Fe^{2+} به Fe^{3+} تبدیل می‌گردد. بنابراین با گذشت زمان غلظت Fe^{2+} کاهش می‌یابد. اگر $\ln \frac{[\text{Fe}^{2+}]}{[\text{Fe}^{2+}]_0}$ را بر حسب دقیقه رسم کنیم، خطی با شیب $11/0^\circ$ - به دست می‌آید. مرتبه واکنش است و بعد از دقیقه غلظت Fe^{2+} به نصف کاهش می‌یابد.

$$1) \text{ شبے مرتبه اول} - \frac{\ln 2}{11/0^\circ}$$

$$2) \text{ مرتبه دوم} - \frac{\ln 2}{11/0^\circ}$$

$$3) \text{ مرتبه دوم} - \frac{\ln 2}{11/0^\circ}$$

-۳۶ علت استفاده از سلکتور (selector) در فرایندهای لجن فعال چیست؟

۱) کاهش F/M

۲) کاهش مواد معلق

۳) کاهش بار آلی ورودی

۴) توازن میکروگانیزم‌های لخته‌ای و رشتهدی

-۳۷ برای کاهش COD کل خروجی برکه‌های ثبیت معمولأً چه اقدامی انجام می‌دهند؟

۱) استفاده از فیلترهای ثقلی با بستر درشت دانه

۲) استفاده از فیلترهای کربن اکتیو

۳) بالا بردن زمان ماند برکه

۴) کلرزنی پساب خروجی

-۳۸ مزایای کلروفیریک در مقایسه با سولفات آلومینیوم عبارتست از:

۱) انحلال بیشتر در آب

۲) کارائی در دامنه محدود pH

۳) کارائی در دوز مصرفی کم

۴) تشکیل فلوک درشت و سنگین و کارائی در دامنه وسیع pH

-۳۹ آبی دارای مواد آلی طبیعی، برم و ترکیبات فنلی و مقدار زیادی پاتوژن می‌باشد.

برای ضد عفونی این آب کدام یک از روش‌های ضد عفونی مناسب می‌باشد؟

۱) استفاده از دی اکسید کلر

۲) کلر زنی

۳) اوزن زنی

-۴۰ در فرایند سختی‌زدایی آب عمل ری کربناسیون در چه محلی انجام می‌شود؟

۱) بعد از فیلتراسیون

۲) بعد از لخته سازی

۳) قبل از فیلتراسیون

۴) بعد از اختلاط سریع

-۴۱ ذرات معلق در آبی دارای سرعت تهشیینی معادل $1,0/01,0/01$ سانتیمتر بر

ثانیه می‌باشد. چنانچه دبی آب معادل ۱ متر مکعب بر ثانیه باشد، سطح حوض

تهشیینی جهت خارج سازی تمام ذرات معلق آب فوق چند متر مربع می‌باشد؟

۱) 1000

۲) 100000

۳) 10000

۴) 1000000

-۴۲

کدام یک از گزینه‌های زیر نادرست است؟

- ۱) هر چقدر قابلیت فشردگی لجن بیشتر باشد، آبگیری آن سخت‌تر می‌شود.
- ۲) قابلیت آبگیری لجن با کاهش درصد جامدات معدنی آن افزایش می‌یابد.
- ۳) بخش آلی لجن در انتخاب نوع منعقد کننده‌های پلیمری موثر است.
- ۴) ارزش حرارتی لجندی که آمایش حرارتی شده بیشتر از لجن خام است.

-۴۳

کدام یک از گزینه‌های زیر درست است؟

- ۱) برای لجن اولیه، آبگیری لجن هضم شده بی هوازی از لجن هضم شده هوازی سخت‌تر است.

۲) مصرف اکسیژن در هضم هوازی خودگرمایی (ATAD) لجن از هضم هوازی متداول کمتر و pH آن بیشتر است.

- ۳) به ازای تجزیه یک کیلوگرم COD در هاضم بی هوازی لجن حدوداً ۳۵۰ لیتر بیوگاز تولید می‌شود.

۴) در هضم بی هوازی دو فازی لجن، زمان ماند هاضم فاز اول به مراتب از زمان ماند هاضم فاز دوم بیشتر است.

-۴۴

در نظر است برای تثبیت قلیایی لجن مازاد تصفیه‌خانه فاضلابی از آهک استفاده شود. اطلاعات زیر وجود است.

حجم لجن مازاد تثبیت شده به ازاء هر سیکل کاری 100 m^3

$$\text{دانسیته لجن مازاد } \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = 1000$$

درصد جامدات خشک لجن مازاد ۴

آهک آب دیده مورد نیاز به ازاء هر کیلوگرم جامدات خشک لجن مازاد ۲۵۰ گرم

$$\text{دانسیته آهک زنده } \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = 630$$

حجم تانک ذخیره آهک زنده برای سه سیکل کاری در روز و ذخیره حداقل ۲۱

روز برابر چند متر مکعب است؟

- | | |
|------------|-----------|
| ۱) ۵۰ (۲) | ۳۷/۸۴ |
| ۲) ۱۰۰ (۴) | ۷۵/۶۸ (۳) |

- ۴۵ حجم گاز متان تولید شده روزانه در یک هاضم بی هوایی لجن مازاد به کدام گزینه نزدیک‌تر است؟ اطلاعات زیر موجود است.

$$\text{دبی لجن مازاد} = ۴۰۰ \frac{\text{m}^3}{\text{d}}$$

$$\text{COD}_{\text{in}} = ۵۰۰۰ \frac{\text{gr}}{\text{m}^3}$$

راندمان حذف COD در هاضم = ۹۵٪

$$Y = ۰,۰۵ \frac{\text{grVSS}}{\text{grCOD}}$$

$$\text{COD}_{\text{vss}} = ۱/۰,۹۵ \frac{\text{gr}}{\text{grVSS}}$$

$$۶۵۳\text{m}^3 (۲)$$

$$۶۱۸\text{m}^3 (۱)$$

$$۷۰۰\text{m}^3 (۴)$$

$$۶۶۵\text{m}^3 (۳)$$